





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
561/A



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
561/A

561/A
L62

3

82. 1. 30.

82. 1. 30.

16/2

65.A.57
DE

29935

PVERORVM

MORBIS, ET SYMPTO-
matistum dignoscendis, tum
curandis Liber,

Ex Graecorum, Latinorum & Arabum pla-
cilis excerptus à SEBASTIANO AV-
STRIO Rubeaquensi apud Argentua-
riorum Colmariam medico.

ADIECTI sunt Hippoc. Aph. aliquot de
nouiter natorum adfectibus, alii item
Aphoristici sensus ex variis
authoribus,

De eorundem bona valetudine tuenda.

IN
VIR-
TUTE



ET
FOR-
TUNA.

IUGDVNI,

Apud Guliel. Rouil. sub scuto Veneto.

1549

Payne
m/17/14

AD LECTOREM.

*A primo vitæ diuersos stamine morbos,
Perpetimur, diris afficimurq; malis.
Donec in occasum redeat, qui vixit ab
oriu:*

*Antea quàm discat viuere, vita ca-
dat.*

*Sed iuuat, artificem rerum, monstrasse
malorum*

*Pharmaca: tum medicas arte creasse
Scholas.*

*In quibus edocti, duros propellere casus,
Reddere vel saltem mitius, acre ma-
lum.*



SERENISSIMO,

AC INVICTISSIMO

PRINCIPI, ET DOMINO, D.

Ferdinando Romanorum, Vngariae, &

Bohemiae Regi, Archiduci Austriae, In-

fanti Hispaniae, Duci Burgundiae, Carin-

thiae, &c. Domino suo gratiosissimo,

atque clementissimo, Seba-

stianus Austrius Me-

dicus, salutem &

incolumitatem

optat.



INCLYTISSE

rex, invictissime Prin-

ceps, quum nihil à prin-

cipio ita simul inuen-

tum sit, traditumq; ut

non multa posteriores tam addide-

rint, quàm etiam in melius immuta-

A 2

EPISTOLA

rint. Quod equidem & in ipsa philo-
sophia, tum in aliis, & præcipue in iis
artibus, quas appellant liberales, cōti-
gisse, palam dignoscitur, quum omnes
additamēto quodam, & quælibet suo,
ad summum fastigium (teste Poggio
Florentino) peruenerint. Quod qui-
dem & in re Medica cōtingere posse,
quis inficiabitur? in qua quidem ha-
ctenus à maiori Philiatrorum parte,
ita hallucinatum est, vt Auicēnæ cum
omnibus Arabibus id vitium fuerit
cōmune, vt sicubi vnus impeggerit, re-
liqui omnes absque omni iudicio, vt
Manardus noster ait, more balantum
sequuti sint. Quare inter tot multa
quæ hodie extant monimēta, hoc vni-
cum testimonio nobis sit opusculum.
De infantium ægritudinibus inscri-
ptum, olim inclyto, & inuictissimo
Principi, ac Domino, D. Philippo,
Hispanorum Regi, Archiduci Au-
striæ,

IN VNCUPATORI A.

strix, & M. T. augustissimæ memor-
riæ patri, à quodam Cornelio nomi-
ne, Achiatro Mechelingensi dedica-
tum, satis profectò studiosum, iustoq;
ordine cōpactum: nisi Auicennæ tan-
tum, & Razis admodum plus satis au-
toritatibus fuisset refertum: tot men-
dis etiam, aliisq; tot vitiosis erratis in-
farctum, inusitataq; demū tam mor-
borum, quàm medicamentorum no-
menclatura, significatione, idioma-
teq; incerto cōspersum, (in vera Bar-
barie natum esse quispiam deieraret)
vt nemo, nisi naris satis emunctæ, ex
hoc quidpiam salutis, adiumenti, au-
xiliiq; certi, indeploratis infantium
morbis, deportaturus esset. Prætereo,
quòd Principis animū, præcipuè do-
cti, eiusmodi opusculi lectio, potius
à rei Medicæ studio amoliretur, quàm
illic aliquantisper detineret: quum
nihil aliud præter Arabicam effutiat

EPISTOLA

linguam, Græcæ verò tanquàm totius negotij, veri fontis, & scaturiginis, nunquàm non immemor. Quare non abs re factum, toties in morborum nominibus, eorumq; causis, notis, tum curationibus dignoscendis, tenebri- cosa quadam caligine cœcutitū fuif- se, non sine paruo quidem decumben- tium incōmodo, detrimento, pericu- lo, interdūq; internecone ipsa. Quas ob causas Rex inclytissime, motus, huiuscemodi opusculum proculdu- bio in infantium, siue puerorum ma- lis propulsandis salutare, atq; salubre præ se ferens institutū, quondam verò illustrissimo, ac heroico sanguini Au- striaco, regiæ scilicet aulæ deuotum: nunc, vt denuo sub *A. M. T.* tam nu- merosa prole, videlicet regia adaucta, illustrataq;, nonnihil terlius, locuple- tius, adornatiusq;, & quasi recens na- tum, ex barbara gente, in suam veluti
nati

NUNCUPATORIA.

natiuam patriam relegatum, & tan-
quàm postliminio à *M. T.* receptum,
restituo, in publicū produco, in sinu,
medius fidius nil nisi vera, tam Hip-
pocratis, quàm Galeni secum scita,
dogmataq; reportaturū. Quibus me
hercle præter hoc, quòd regiam *M. T.*
progeniem non mediocriter, delecta-
bit, iuuabitq;, ad hoc etiam indocti,
rudisq; popelli stultam opinionē re-
fellet, autumantis, infantibus, siue pue-
rulis, morbo aliquo correptis, ob æta-
tis teneritudinem, nulla auxilij ope
succurrendum esse. Nescium profectò
hoc genus hominum tam stupidum,
naturam, non tam in stirpis humanæ
propagandæ, quàm conseruandæ ge-
nus, adeò propensam fuisse, tot inde
media, tot medicamenta excogitasse,
vt nō tantum generandarum prolium
defectus, quos sterilitatem vocamus,
certis auxiliis, (si diis placeat) emēdet,

EPISTOLA

imò & conceptos in vtero foetus ad legitimū parturiendi tempus foueat: dein ex vtero contumaciter prodeuntes in lucem proferat: enixas verò matres decentibus eduliis ad certos dies edulcet: natos autem lauet, lactet, demū innumeris malis obnoxios, à venturis præseruet, inflicta profliget, vt in præfenti ex ordine docebitur opusculo. Quamobrem nō admodum admiratione dignum, Hippocratem naturam cognominibus honestasse, eamq; iustam appellando, quā etiam Aristoteles veluti *δικονομον* ait *αγαθόν* esse, hoc est, Oeconomū bonum, patrem-familiāsq;. Hoc itaque ab aliis retrò autoribus, vt Auicenna, & Raze, eorumq; affleclis succinctè licet attentatum, & Corneliana demum opera, vt dictum est, in iustum librum excerptum, ob barbariem fortè suā hactenus squalore quodam obsitum, vt ferme

Natura iusta ab Hippocrate: oeconomus verò bonus ab Aristotele dicitur

IN VINCULATORIA.

mè obliteratum, emortuumq; nullam
fui ampliùs post se memoriã relique-
rit: nunc tamen reciduum, & quasi
bis natum, non nihil plausibilius, ma-
gis diuturnũ, & viuidum, veritatisq;
ipsius amantius, sub *A. M. T.* & re-
giæ sobolis auspicio augustissimo,
cum gratia haud dubiè fauorabili, in
pristinam, & meliorem quidem fa-
cem redire curavi. Quò etiam iuxta
incolumitatem regionum corporum
perpetuam, & in longos annos auspi-
catissimè perdurantem, ac regnorum
diuturnam seriem precatus. Hoc faxit
D. O. M. omnium vnicus languorum
ἄριστον, & inclytissimus imperio-
rum *Βασιλεὺς*. Data ex Ar-
gentuariorum Col-
maria, ciuitate
Imperiali.

HIPPOCRATIS APHO-
rismi nouiter natorum mor-
bos enarrantes.

IN etatibus autem talia cōtingunt, paruis, &
nuper natis puerulis, oris vlcera (quæ Aphthæ
vocantur) vomitus, tusses, vigilie, pauores,
vmbilici inflammationes, aurium humiditates.

In progressu verò cum iam dentire incipiunt,
gingiuarum prurigines, febres, cōuulsiones alui
profluvia: & maximè cum caninos edūt dentes,
& ys præsertim pueris qui crassissimi sunt, &
aluos duras habent.

Cum verò iam magis adoleuerint, tonsillæ, &
vertebræ quæ in occipitio, ad interiora luxatio-
nes, crebri anhelitus, quos Graci asthmata vo-
cant, calculi, lumbrici rotundi, ascarides, verrucæ,
quas Graci acrochordonas vocant, satyriæ, stru-
mæ, & alia tubercula, sed præcipue ante dicta.

Grandioribus autem, & iam accedentibus ad
pubertatem, plurima ex his, & febres diurnæ
magis, & ex naribus profluvia sanguinis.

Plurimæ autem passiones puerulis indicantur:
nonnullæ quidem in quadraginta diebus: non-
nullæ in septem mensibus, nonnullæ verò in annis
septem, quedam verò iam ad pubem accedenti-
bus. Quæ verò permanserint, nec in pubertate
finierint, puerulis, aut fœminis, cum menstrua
erumpunt, consenescere consueuerunt.

DE



DE INFAN- TIVM, SIVE PVE-

RORVM MORBORVM, ET

Symptomatum dignotione, tum

curatione Liber, Sebastiano

Austrio Rubeaquensi

medico, autore.

Morbus primus infantium, siue
puerorum Syriasis, quem Las-
tini capitis ardores vocant.



INFANTIVM Morbi de-
Syriasis à P. Aegi- scriptio Sy-
riasis.

neta lib. 1. de tuenda
valetudine descri-
bitur, quod inflam-
matio quaedam sit

partium circa cerebrum, eiusque pannicu-
los, quos meningas vocent, hoc est, mem-
branas duas cerebrum amplectentes: qua-
rum interior rubentior, exterior autem soli-
dior,

dior, pia, duraq; matres haecenus à scho-
la nostra vocitata. Ostendimus in Aegi-
netæ cōmentarijs, eiusmodi mali appella-
tione Latinos carere, nisi quòd Plinius li-
bro 20. cap. 3. *Ardores capitis* appellet.

Ardores ca-
pitis.

Apostema.
sitibundū.

Auicennæ verò interpretres quidam apo-
stema sitibundum vocat: fortè quòd vel sibi
humores attrahat, veluti cucurbita: vel
quòd febris ardentissima ipsum concomi-
tetur, & exiccatio vehemens gutturis, at-
que linguæ, tum oris stomachi, quibus sitis
intensissima incitetur, potissimum verò
quādo à bili flava ortum sit. Vnde liqueat,
curationem eius maximè refrigeratā hu-
meētantiāq; postulare, vt in processu ad-
parebit. Idem porro Auicenna lib. 3. Fen.
1. Tract. 3. capite 5. Istiusmodi inflamma-
tionem circa cerebrum provenientem E-
rysipelaten nominat. Cui equidem &
alij astipulantur autores, forsā Galeni
autoritate persuasi adferentis, Commu-
nem in omnibus immoderatam calidita-
tem,

tem, et veluti quandam efferuescentiam inflammationis nomen sortiri: quæ ubi ex sanguine, & flava bile, calidioribus quam oporteat mista fuerit fluxio, Ery- Erysipelas. sipelaten tunc iusto quasi nomine vocari, multo inflammatione calidiorem, magisque coloris flavi notam referentem. Quem P. Phlogosis. Ardores. Inflammationes. Collectiones. Aegineta morem sectatus, lib. 4. de Arte Medæ. cap. 17. huiusmodi inflammationes, quas Græci Phlegmonas adpellat, communiter calentes cum dolore, & inflammatione, quæ Phlogosis græcè dicitur, tumores esse scribit: quos Latini nunc inflammationes, nunc ardores quandoque collectiones vocitent. Præterea pro diversitate materiæ ipsas efficientis harum quoque differentiam commutari.

Hinc fortè gentilis ille Avicenna ex- Causæ. planator, huius mali causam esse bilis flavæ materiam insinuavit: attamen mitiorè, intensæque exassationis expertè, aliasque gravius mali, hanc delinquentem materiam,

riam, fore incitamentū. Quæ quidē etiā facilius ex Gal. ad Glauconē verbis innotescunt, recitatis: sanguine optimo, ac mediocrem crassitudine obtinēte ad particulam aliquā in vniuersum fluere, atque ob multitudinē conculcato, vehemētē dolorē hominē arripere, nisi mēbrū omnino difficilem habuerit sensum, pulsūq; in profundo molestū efficere, mēbrūq; ad parere omnino frangi, & vehementē calorē persentire, adeo vt cōburi videatur, quare & refrigerari desideret. Quarū sententiarum autores pleriq; haud immemores, tam in notis, quā in curationibus istiusmodi malis obseruandis extitisse, in sequentibus declarabitur.

Notæ. Expedita igitur præsentis morbi descriptione, cū certis eiusmodi causis, ad notas eius præsentiissimas diuertēdū, quod eodē modo, & in alijs subsequētibus obseruabitur adfectionibus. Sunt autē earū, quæ hinc inde ab autoribus potissimæ cō-

geruntur, Syncipitis cōcauitas: itidem & oculi, cū pallore: interdumq; rubore. Quorum omnium sigillatim ab autoribus productarum rationes in hunc inuestigabimus modū. Concaui in Syria si sit caput, inquit Aegineta: Concaui itē & cū pallore oculi: Accedit autē etiā totius corporis ariditas, ob sortem sine dubio calorem, quo capitis, oculorū, & totius corporis exiccatio cōtingit. Oculi praterēā adficiuntur ex peculiari nervorū cū oculis cōmunionē per nervos maximos, sibiq; dispares, opticos dictos. Pallescunt oculi, & facies, & maxime quidem vbi eiusmodi inflammatio biliosa fuerit. Rubescunt verò vbi sanguinolenta extiterit. Razis autoritate, nono ad Almanzorem capite 3. in-
 quientis, Quando aliquem febris conclusa invaserit, cum forti capitis, & oculorum grauedine, & in facie, atque in oculis vehemens fuerit rubedo, & capitis dolor, & luminis horror, & in pulsu
 velo

Nervi
 ptici.

Phreniti-
dis signa
evidentis-
sima.

Velocitas, & frequentia superfluitas in-
ueniantur, signa phrenitidis certissima
iudicabuntur. Quod verò dolor gutturis
etiam pertingat, hoc ex nervis conuersi-
uis à cerebro ad guttur, imò & ad os sto-
machi pergentibus accidit, ita ut &
istius dolore, huius quoque obledatur os,
iuxta autoritatem Galeni in libris loco-
rum adfectorum inuentis. Ventriculum
ex capitis adfectione obledi, atque è di-
uerso itidem fieri, ex nervo à capite ad os
ventriculi prorumpente, eoq; id magis
sensile ceteris omnibus membris reddi.
Huiusmodi licet Symptomata omni
etati ingruant, grauius tamen puerili in-
cumbunt etati, quòd illa scilicet citius cõ-
tabescat ob caliditatem & humiditatẽ:
que corpora faciunt facilius defluere, atque
extenuari, iuxta Galen. in Hippocrat.
Aphoris. lib. 2. Aphor. 28.

Notæ pro
gnosticæ.

Hoc malum plurimum in triduo de-
cumbentem interficere Auiçena tradit,
quod

quod temporis intervallū si aeger supera-
rit, salutis tunc spē dedisse: proculdubio ex
autoritate D. Hippocrat. Aphoris. lib. 7.
Aphoris. 51. Vbi recitat, quibus cerebrū
sphacelatum, id est, corruptū est, in tribus
pereunt diebus: si verò hos evaserint, sani
fiunt. Velox enim, inquit Galenus, in ipso
cerebro fit mors, propter passionem partis
principalissimæ gravissimā existentem.
Quæ si in tribus primis diebus non anti-
cipauerit, sed ad diē vsque quartū protra-
hatur, super morbi declinatione tunc spe-
randum esse: quia vires sint adeò fortes
quòd ipsum omnino pervincant morbum.

Succurrere huic malo potissimū refri-
gerantia, humectantiaq; autores decer-
nunt: quemadmodū Paulus docet syncipi-
ti cum rosaceo luteum oui pigmenti modo
imponere, quod nostri hætenus vitellum
oui, siue rubrum appellauere. Hoc enim do-
lorem cōpescere, materiā cōcoquere, non-
nihilq; discutere. Sic Dioscor. lib. 2. Cap.

Curatio.

B

44. Oui luteum tostum, additis rosaceo,
 & croco, oculorum doloribus admouet.
 Præterea eidem loco, caluaria scilicet puero-
 rum Paulus cōuenire docet herbā, quam
 Græci Heliotropium, Latini solarē nomi-
 nent: de qua in Scholijs super lib. 1. Aegi-
 netæ copiosam fecimus mentionē. Item &
 cucurbitæ ramenta, quasi refrigerantia,
 & humectantia, materiā biliosam Phle-
 gmonis cōcoquentia, & ab ardore repri-
 mentia, somnū cōciliantia, febrē cōpescē-
 tia. Similes & cucumeri, peponem vulgò
 dicti, facultates adscribit. Iridem Solani
 hortensis cū rosaceo imponere cremorem,
 præcipit, quod Schola nostra Solatrū vo-
 cat. Cuius quatuor à Dioscor. in lib. 7. ex-
 ponuntur genera, quare omnium ad refri-
 gerandum observatur vsus, sed quod hoc
 hortense præsentī maxime cōpetat casui.
 Eodem enim, inquit Dioscor. inspergun-
 tur, addito rosaceo infantes in capitis ar-
 dore, quem Syriāsim dicunt.

Heliotro-
 pium sola-
 ris.

Cucumis
 pepo. Sola-
 trum. Sola-
 trum.

Quot

Quotquot illorū medicaminū huic malo adponantur, semper hoc meminisse hīc iuuabit, ut adſidua mutatione renouētur, ne ex longa adpoſitura mora caleſcāt, exindeq; calefaciāt, quod tamen omnino eſſet contra praeſentis curationis inſtitutū.

Nos verò ex recentīū Medicorū vſu <sup>Canon ne
tatu di-
gnus.</sup> herbis, ſiue ſuccis frigidis, & humidis, in praeſenti caſu vſurpamus, veluti melonis, citrulli, cucurbitae. Hinc nonnulli cucumeris accipiunt partē dimidiatam, & capiti ſuperponunt, quòd inſrigidet, & humectet. Atqui in morbi principio adhibent, quòd materiam cū frigiditate protrudant. Aut oui album cū aqua, & oleo roſarum accipiunt, quae cū molliore lana, ſiue lineo panno conficiunt, capitiq; imponunt. Vel ſolani & cucurbitae, & citrulli ſuccos, & oleum roſarum cōmiſcent, eodēq; pacto, & quaſi tepidè adminiſtrāt. Quibus iam dictis & portulacae liquorem aliqui adiungunt.

Morbus secundus, Phlegmon
cerebri.

Morbi de-
scriptio.
Tumorum
omniū ori-
go.

Erisipelas.
Ignis fa-
cer Oēde-
ma. Scir-
rhus.
Duricies.
Sephirus.

Accidunt interdum in Velaminibus,
inquit Auic. lib. 3. Capi. 11. Tract. 3.
Fen. 1. quæ sunt extra caput aperta cali-
da, & frigida. Perspicuum nō est, tumore
omnem aut ab humoribus, aut à flatuoso
fieri spiritu. Si ab humoribus aut calidū,
aut frigidum, aut mistū fieri. Calidū au-
tē à sanguine bono esse, & φλὺμὴν, à
Græcis, à Latinis Inflammationem dici.
Aut à bile, & feruenti, vel tenui san-
guine: Vel sanguine, & bili calidioribus,
quæ illi, ἐρυσίπτελας, hi ignem sacrum vo-
cent. Frigidum verò à tenui pituita, quæ
illi, αἰσχυρὰ nostri laxum tumore, Auicē-
na Vndimiam nominant. Vel ab atra bi-
lis humore, siue à crassa, & tenaci pitui-
ta, illi σκίρρῶν, Latini duriciem, Arabes
Sephirus nuncupant. Istius modi adfectū
sub caluaria velamentis, siue membranis
extraneis fieri Auic. intelligit, diuerso
modo

modo à superiori, qui in interioribus, hoc
est meningis ipsius cerebri contingebat. Caluariae
membrae
Binæ autē caluariae sunt mēbranae, quarū duo.

Vna cutis est quæ caput integit, omni carens sensu, quum ibi nulla interposita carne ossi adhaereat, crassior tamen natura, qua maiori quasi radice capilli nitantur. Altera verò sub cute membrana, qua caluariam extrinsecus velat, pro tegmine à natura cōstituta, vt Alexan. Benedictus in Anatomia sua recitat, quo alio etiā velamento caluaria illa sa seruetur, quæ magnā etiam cū interiore mēbrana germanitatē gerat. Sub eiusmodi itaq; velamenti aliquando apostemata contingunt calida, vt phlegmones, Erysipelas: Frigida, vt Scirrhus, Oedema.

Ante causarum verò istiusmodi mor Causa.
bi cognitionē, tum aliorū quoq; adfectuū in sequētibus enarrandorū, prius Gulielmi Placentini ex recentioribus haud pœnitendi medici, dogma vniuersale in chi

Morborū rurgiae suae exordio exactissime perpen-
 causae qua dendum. Quatuor, inquit, sunt quae ex
 tuor, à cau necessitate eueniunt, quum membrum
 fa extrinsecum aliquod aegritudinem aliquam incurrat
 seca prouenientium. à causa videlicet intrinseca, ut sunt apo-
 stemata, & id genus alia. Primum est
 materiae alicuius, siue humoris prae-
 sentia, in corporibus hominis, qui non sit
 idoneus, ut in nutrimentum membro-
 rum conuertatur: siue ob eius multitudi-
 nem, siue propter eius maliciam. Secun-
 dum est robur, siue imbecillitas membri
 impellentis. Tertium est membri imbe-
 cillitas, in quod aegritudo incumbit. Quar-
 tum est meatuum atque receptaculorum,
 siue viarum ad humorum transitum cō-
 uenientia, ut de vno ad aliud permeent
 membrum. Quorum ipse meminisse vult
 in primis, in omnibus à causa interna
 proficiscentibus, adfectionibus, veluti hic
 videre licet, in causarum, praesentis ca-
 sus, dignotione. Humores, inquit Aui-
 cen.

cen. alijs, & non solum humiditates illæ aque (de quibus alio fit sermo) causæ sunt istiusmodi apostematum. Quasi diceret, qui ad loca inter caluariam & cuticulam perfluant, siue ex violento compressu, siue ex alijs causis (ut ex Placentino intelligimus) quibus membra huiusmodi recipiant humores. Quorum omnium in morbi descriptione satis absolutam fecimus mentionem. Nunc verò ad signa diuertendum.

Cuticulæ color in hac adfectione im- Notæ
mutabitur à nativo videlicet colore, quia materiam humoris delinquētis, siue calida, siue frigida sit colorem inuariare quis dubitaret? Præterea tactus fit diuersus, & à nativo longè alienus, quum frigidius, plus iusto percipiatur. Ad hæc manus adpositio, & compressus in locum adfectū fit difficilis, atque cōtumax, cū re luētanti humorum ab interioribus cranei ad exteriora edução, ob humorum

tenacitatem, vel membranarum exteriorum in quas, vel sub quas permeare deberent. Porro mordicatio hinc sentitur, potissimum tumore hinc existente feruido.

Notatum
differetia
inter cali-
dos, & ge-
lidos tumo-
res.

Tactus
qualitatu
attingenda-
rum index
infallibili-
lis.

Amborum autem tumorem qualitate scilicet calidorum, & frigidorum, certis inter se dignoscuntur indicys: sicut à tactu, qui indubitatus qualitatu attingendaru index existit. Quod enim tactu calidum esse percipitur, id esse calidu dyndicatur. A colore vero, ut quod cute tensus est rufum, siue spiceum, caliditate inesse, representat. Quod autem album, siue fuscum, siue cinereum, frigiditate. Item ab his quae tumori vel conferant, vel noceant, indicium suae essentiae sumendum est: nam ille calidus esse discernitur, qui à frigidis refocilletur: à calidis vero obledatur: & sic è diuerso.

Simile suo
simili ad-
positu fu-
riosius red-
dit.

Siquidem simile suo simili adpositum furiosius ipsum reddit: praecipue in adfectionibus intemperatis. Peculiare tum est, atque commune hoc utriusque tumori,

per

perpetuumq; indicium dolor: scilicet ipsius caluariæ cōpressiuis, quem planctus, horrorq; ipsius decumbentis vbi tangitur, indicant.

Meminisse præterea hîc oportet Verborū Aeginetæ. li. 3. de arte medēdi ca. 6. indicantis, tanta sæpenumero inflammatione cerebrum opprimi, atq; in tumorem etiam adeò attolli, vt testæ commissuræ in capite distendantur, dispalenturq;: qui dolor omniū ferme grauissimus sit & diuturnus quem ingens quoddam fastidium comitetur: rubor multus in vultu cum tumore eluceat, oculi proterui, & exerti redantur, caput deniq; in mole sese attollens intumescat. Ad hæc, oriri in cerebro quoque Erysipelaten, quē Latini sacrū ignem vocent, cui malo obnoxios eiusmodi pati Symptomata: caput enim vniuersum adfici, vt quasi flamma totū occupet, videri: vultū verò gelidū, subpallidūq; apparere: os verò omnino arefcere. Hæc Aeginetæ.

Aeginetæ
verba.

Erysipelas
ignis sacer
dictus.

Ex quibus malis quid portendatur incommodi haud oscitanter difficiendum.

Prognostica.

In tumoribus capitis infantium dignoscendum est, an materia sit copiosa, an ne ab externis ad interna membris contumaciter sit protrusa: quod si ita se res habuerit, letale & perniciosum erit. Sunt equidem infantis membra adhuc tenera eiusdemque facultates, siue vires imbecilli, defluxioni, extenuationique maxime obnoxij, ob nimiam eius quasi recens inchoati operis molliitudinem.

Curatio.

Totius curationis modus statuitur in eo quem de reliquis ipsius capitis siue calidis, siue frigidis, autores posuerunt apostematibus, ut in phrenitide: dempto hoc, quod hic leuioribus tantummodo opus sit medicamentis, ob loci adfecti viciniam & praestantiam. Cauendum itaque hic, ne eiusmodi materia nimium detrudatur, alias mox vel cerebrum & gulam obfessura. Discutientium porro medicaminum
satis

satis sufficienter gessura vices fœnogra-
cum, & chamæmelū. Sunt qui retroactio-
nem materiae omnino in vniuersum in-
terdicāt. Aduersus inflammationes capi-
tis, quæ phlegmones dicuntur, Aegineta
embrochas cum cataplasmatibus, tum hume-
ctandi, tum maturandi facultatem haben-
tibus vtendum esse persuadet. Erysipelati
autem frigoris cum in primis & in-
trepidè exhibenda.

Repulsio
materiae
peccantis
interdicta.

Morbus tertius Hydrocephalon, hoc est, aqua extra cranium Auicen-
næ: Apostema verò intercutaneum
Haliabbati.

Morbi des-
criptio.

Congregatur interdum, inquit Ma-
nardus epistol. medicinalium lib. 7.
Epistola secunda in Capitibus præsertim
puerorum, aqua in medio aut cutis &
pericranij, aut huius, & ossis: ὑδρο-
κεφαλον Græci vocant, Auicenna a-
quam extra cranium: Haliabbas aposte-
ma intercutaneum. Sic Galenus aquam
in ca

Hydroce-
phalos a-
qua extra
cranium.
Apostema
intercuta-

neum Tu-
mor mol-
lit in capi-
te.

in capite extra craneum interdum esse ad-
mittit, tunc quoque tumorem apparere mol-
lem. Aut quandoque sub craneo consistere,
neque tum foris comparere. Aut quandoque
utrobique inesse. Qui vero intra craneum
constiterit, hunc quidam exponunt, aut sub
craneo consistere, videlicet supra menin-
gam, duram à Barbaris matrem voca-
tam. Huiusmodi morbum nequaquam fie-
ri, neque inchoari nisi in recens natis pue-
rulis. G. Placentinus admittit: nempe quod
ex causis istius morbi optime persculturis,
rem ita se habere, certius constet.

Mater
dura.

Causæ. Ex quibus manifestissime liquet, istiusmo-
di congregationis aquæ causam in capite
infanati, plusquam in alijs membris, ni-
si quod interdum intra, interdum vero
extra caluariam potissimum reperiri.
Cuius quidem rei idem Placentinus in li-
bro. I. suæ Chirurgiæ, capi. I. duas inducit
causas. Primam scilicet respectu aliorum
membrorum immensam capitis capaci-

ta

tatem. Alteram verò infantis in utero materno posituram, qua capite inclinato propendeat: quare facilius ad eum aquea humiditas defluat, ex mensibus retenta suspēsis, quam nec mater ipsa, neque puer convincere, seu corrigere potuerint, sed tantummodo istiusmodi materiam retrudere capitiq; infantis demandere. Ad quam quidem operationem proculdubio & causæ superius ex eodem autore citatæ, nonnihil adiuvant, eandemq; efficaciter promouent. Constat enim iuxta eundem autorem infantem utero, & renibus maternis communicari, atq; ex venis uteritum hepate matris, sanguinē, ministerio umbilici, nutrimentū gratia, ad iecur suum pertrahere: ob faciliorem itaq; attrahendi dispositionē, occasionemq;. Ventrem præterea infantis, eiusq; partem anteriorem circa renes mulieris collocari, qui manus super genua teneat occlusas, ut capite propenso super manus, in concauo oculorum

Causæ duæ
iuxta Plac-
centinum.

Infantis in
utero ma-
terni po-
situra.

lorum manus occultentur, naribus, inter duas manus consistentibus. Quibus facile materia conflentis spontanea promptitudo in caput infantis deriuetur.

Causæ
aliæ.

Sunt autem qui istiusmodi duarum causarum Gulielmi sententiæ refragentur, tanquam improbabili, quum vter ipsius infantis multum sit capacior, decliniorq; ipso capite, ad quem potissimum eiusmodi materia rapi, deberet. Ob quam rem alias tres eiusmodi aquæ in capite coaceruata adducunt causas. Primam videlicet ipsius membri, scilicet cerebri naturam, tanquam humidam, & aqueam, inter reliqua nostri corporis membra, præcipue vero in exortus initio. Alteram verò tegumenti sui imbecillitatem, hoc est, ossis siue craneæ, unde humiditates non tam facile exhalare possint, neque in vaporem mutari, sed potius retineri. Tertiam vaporum adsignant prouentum ad ipsum cerebrum, qui tum ibidem ex frigiditytate

tate coaceruati in aquam conuertantur,
 Vt ex Aristotelis verbis lib.2. de parti-
 bus Animalium, Cap.7. liquido depre-
 hendatur recitantis, Fluxiones etiam ob
 eam rem ex capite oriri in ijs corpori-
 bus, quibus cerebrum sit frigidius, quam
 temperamentum postulet. Quum enim
 alimentum per Venas sursum respiret,
 Vbi excrementum ob eius loci vim refri-
 geratum sit, fluxiones pituita, sameiq;
 moueat: quod simile generationi imbri-
 um euenire, intelligendum sit, quod ma-
 gnum conferre cum paruo liceat. Cū enim
 ex terra vapor exhalet, efferaturq; in
 sublime à calore, Vbi supremum aerem
 subierit frigidum, consistat denuo in a-
 quam, propter refrigerationem, atq; in
 terrā defluat. Hactenus Aristoteles. At Auic.
causg.
 Auic. Capi.11. Canonis. 3. fen.1. Tract. 3.
 Aquæ cōgregatæ extra craneū hanc im-
 portat causam, obstetricis scilicet malè
 & inconcinne caput infantis tractantis,
 com

componentis, effigiantis, siue fingentis, comprimentis &c. quare ob suturarum reclusionem, venarum oscula referentur, ad quæ deinde aqueus ille latex sub cuticula decurrat. Cuius autoritate nonnulli permoti, alias tres aquæ extra caluariam corriuata inferunt causas videlicet facultatis expultricis cerebri potentiam, retentricis verò impotentiam, atque aquei nutrimenti copiosam administrationem, quæ facile tum capiti inter cutem, caluariamque surrogetur. Hæc de Causis.

Notæ
Aque coa-
ceruatae in
tra calua-
riam notæ.

Signa congregationis aqueæ in capite intra caluaria, vbi scilicet membrana dura mater vocata adhæserit: sunt grauedo, quam infans facile explicaret, si verbis exprimere posset. Oculi præterea difficilis & quasi impossibilis occlusio, quare oculis adaperitis in vñ tantummodo intuentur locum. Oculorum præterea lacrymæ ex resudatione illius aqueæ materiæ ad ipsos deriuatæ. Porro & capitur
ma

magnitudo insueta, ut aliquibus videtur,
respectu colli, reliquorumque membrorum.

Signa verò eius sub caluaria, hoc est, Aquæ coe-
aceruatae
sub calua-
ria notæ.
sub membrana, pia mater vocata, consi-
stentis, sunt oculi prominentes, & rubei,
& dolorifici. Ex causa enim immensa re-
pletionis prominēs, ex vaporibus verò ca-
lidis ad oculos confluentibus rubent, ab exi-
libus verò, subtilibusque dolitant. Deli-
rium nonnulli adiungunt, quòd ex inor-
dinatis, & varijs ipsorum infantium di-
gnoscur actionibus.

Notæ verò istius quæ suprà caluariam
consistat, sunt caluariæ depressio, vel ex
materiæ ossi incumbentis gravitate, vel
quod comprimendo locus ille adfectus, re-
lictæ fovea, tactui facile cedat, ob quam
rem & Gal. hoc apostema molle esse ad
tactum indicat. Præterea & fletus in-
fantilis ob læsæ particula nocumentum.
Item & vigiliæ ex fletu, & oblesio-
ne ac suborientes. Similiter cuticulæ co-

C

lor nō mutatus, aqua enim minimè veluti alij solent humores cutim inficit, coloresq; subinde inuariat. Cuticula autem istiusmodi aqua comprehensa, nonnihil in fastigium attollitur: aqua enim dum sit subtilis, exilisq; substantiæ, facillimè erumpit, & ad cutem foras se diffundit.

Prognostica.

Verum si huiusmodi aquea collectio intra caluariam contineatur, Auicennæ decreto minimè curabitur: medicamentis enim istiusmodi aquam egerentia, infantes adhuc tenerrimi, mollesq; existentes ferre non possunt: neq; alia medicamentosa remedia caliditatem aliquam præ se ferentia, quibus materia ipsa peccans absumi debeat. Sunt autem quidam qui ex materia eiuscemodi in cerebro consistentis malicia, curationem hanc nequaquam attemptandam esse velint. Quamuis è diuerso reperiantur, qui cauterijs, osse tamen capitis non perforato, atq; medicinis diaphoreticis hoc malum fuisse curatum, vidis

disse se attestentur. Quod tamen in pueris experiri velle, cum cautione non parua, id admoliendum esse commonemur.

Haud minus hîc diligenter observandū esse, an huiusmodi aqua fuerit copiosa, aut ab exterioribus ad interiora violenter detrusa: quod quidē immedicabile plerumq; foret malum, ob ingētē in cerebro maliciam. Nec minus vbi infantes aqua istiusmodi collectione laborantes, spasmus inciderint, perniciosum fore, quod ex redūdantia nervis communicata eueniat: ob lēSIONEM non paruaM quā in principio fit neruorum, videlicet cerebro, quare ex huiusmodi spasmo exitium portendi.

Curādi ratio in tres diuiditur partes, scilicet dietā, potionē, & chirurgiā. Curatio.
Dieta, Dieta verò nutrici est iniungenda, ne humectantib. vescatur: aērē in habitat siccū boreali flatui obuiū: aut aērem lignis contemperet aridis: nōnihil meditabūda et anxia,

vigilijs, dimotionib. frictionibus, capitis
pectinationibus, balneis arefacientib. fati-
gata indulgeat. Cibus verò exiccantib. ve-
luti assis, siue frixis vtatur. A potu absti-
neat: famen sufferat, redundantiarum
molem egerat.

Potio tri-
bus con-
sideratur
modis.
Exinani-
tio quot
fiat modis

Hippocra-
tis dictum
aureum.

Potionis verò ratio tribus dimetienda
erit modis, videlicet exinanitione, resolu-
tione, & cerebri confortatione, ne mate-
ria regignatur. Exinanitione innumbris
fit modis iuxta ipsius corporis euacuationē
indigentis necessitatem. Semper tamē hīc
memoria tenendum aureum Hippocratis
dictū: Digesta medicanda esse, cruda ve-
rò minimē mouenda. Qua facto deinde fa-
cilius ad alios exinaniendi modos pergen-
dum erit, qui sub forma vel sternutamenti,
aut emplastri, aut Gargarismatis, aut ca-
putpurgij alicuius à medicis moliuntur.
Quorum omnium paradigma ex serie pone-
re non libuit, quā hāc in periti, & exer-
citati medici industria, iuxta delinquetis

cor

corporis naturam solummodo sint statuen- Sternuta-
mentū no-
bile & ex-
pertum.
da. Sternutamenta autem hoc in casu opti-
mè ex eiusmodi componi medicamentis
traditur: Vt sunt gruis, vel vulturis fel, ca-
storeum, ruta sylvestris, macis, crocus,
omniū simul aequalibus partibus sumptis,
& cum saccharo subtilissimè trito, dein-
de cum psilly viridis succo incorporatis,
impactisq; in formam granorū lētis, qui-
bus induratis, siue sub vmbra desiccatis,
omni die vñ in aqua rosarū maceratum,
naribus infantū per dies tres instillare-
tur. Eiusmodi enim sternutamentū à me-
dicis ipsis puerorum naribus toties intru-
sum, pro experimento quodam laudabili
habetur. Ad hoc emplastra etiam hīc con- Emplastre
ferentia ex semine nasturtij in aqua agi-
tato conficiunt, in qua demum lintecolum
madefaciunt, atq; capiti adponunt.

Resolutio cū diaphoreticis fit medicinis Resolutio,
& cū qui-
bus fiat me-
dicamentis
emplastrū.
qua vel in forma linimēti, siue emplastri,
siue embrocharum administrantur. Sic

quidam accipiunt origani, calamenti,
 fauinæ, sticatos, serpilli, gallarum cupres-
 si, æque drachmas duas, cinnami, nucis
 odoratæ, corticum citri, macis, singulo-
 rum drachmam unam, ceræ uncias tres,
 oleorum de lilio, de costo, æque semun-
 ciam, succi maioranæ drachmas duode-
 cim: & tali modo concinnant empla-
 strum. Aqueæ quandoquidem coacerua-
 tioni (nisi supra modum & plus iustè co-
 piofa foret) eiusmodi diaphoretica, mo-
 re emplastrum adhibita, solummodo me-
 deri posse, autores concedunt: nisi quod
 nonnulli fortiora quædã supra dictis desi-
 gnant ut sunt: aristolochia, lupinorũ fari-
 na, & id genus alia. Cerebri autem con-
 fortatio, ne materia repullulet, cum odo-
 ramentis exiccatorijs, & cerebrum ex-
 calefacientibus fieri solet, musci, ruta.
 Itidem cum electuarijs & confectioni-
 bus, ut sunt diacorus, plirisarcoticon Nico-
 lai, theriaca, mithridatum. Sunt qui odo-

Odoramen-
 tum.

ra

ramentum in hunc conficiant modum: adcipientes castorei, ruta sicca, parteis æquales, & cum glutino tragacanthæ pomum odoriferum conficiunt. Quamquam omnia odorifera per se, & simplici modo administrata, compositorum odoramentorum gerere vices satis abundè valeant.

Chirurgia secundum antiquiores, auctoritate Placentini, istiusmodi absoluitur medijs. Nā quidam ex capite aquam secernere studētēs, incisionē, inquit, instar lineæ in parte anteriori capitis, hoc est fronte molitur, ubi ossa in quibusdā pueris nō facile, nisi prolixiori tēporis intervallo, coalescāt. Alij verō eiusmodi incisiones sub forma triangulari admoliantur. Alij in modū crucis incidant. Alij incisionibus istiusmodi inhiantes in parte aliqua decliniori id imitantur, vel in parte capitis posteriori: ut quocunque modo liceat aquam ipsam faciliiori modo effluere

Chirurgia

Incisionū
modi variū
& diuersi.

Omnes prætereà in hoc conuenire, vt incisione peracta, ne aqua omnis in vniuersum simul, sed sensim certisq; moræ interpositæ interuallis egrediatur. Quã quidem curandi rationē ipse non adprobare possit, nec velit, dummodo neminem sua ætate, eiusmodi curandi ratione attentatum, euasisse incolumen, viderit. Namq; solum infantes, dū constet, & recens natos, plerūq; huiusmodi laborare malo, quo minus fieri vt hac incidēdi forma, pueri adhuc imbecilles, & molles feliciter curentur. Se

Historia. autē vidisse puerum, idem adserit author nullius Medici auxilio, sed ipsius naturæ opera, itaq; per tēporis diuturnitatem curatum fuisse, multosq; adhuc dies superstitem fuisse. Ex quo quidē naturæ ipsius instinctu, in puero isto tantū naturali auxilio curato, ipse tandem edoctus sit, in eiusmodi affectus medela, paulatim excicatorijs medicamentis, etiam diuturnitate temporis adhibita, agendum esse.

Quod

**Experimē-
tū a ratio-
ne natura-
li inuentū.**

Quod quidem ipse demum expertus sit
in alio quodam boni amici puerulo: cu-
ius primum inungere caput vniuersum
exordiebatur, cum oleo chamæmillino,
& sulphure, in hunc modum commistis,
& preparatis. Acceperat enim olei
chamæmillini vncias quatuor, sulphuris
vnciam vnā, quibus commistis bis in
die pueri caput calidè oblinebat. Quo fa-
cto lanam calidā & siccam capiti super-
ponebat, vel pannum de lana calida, &
sicca, & ab istiusmodi instituto per inte-
gri mensis spaciū non desistens, donec
natura non parum confortaretur, euincen-
do morbum, humiditatem psam eviden-
tissimè exiccabat, In notuerat verò hu-
miditatem illam inter caluariam & cu-
tim exteriorē consistere, quare for-
tioribus innitebatur medicamentis: ad-
hæc præscitum est, membra huiusmodi
robustiora, confirmatioraq; esse. Ob quam
rem adurentium quippiam medicamen-

Caustica
 medicamē
 ta, fortia,
 & poten-
 sialia.

torum (quæ καυσικά dicuntur) nequa-
 quam violentorum, sed ut ipsi vocant,
 potentialium: adfectæ parti, hoc est, an-
 teriori capitis, id est, frontis admouebat,
 cui quoque id imprimebat usque ad aquæ coa-
 cervationē, quo factō, ocysimè hæc proma-
 nabat. Addidit post hæc duo adhuc alia
 caustica auxilia in parte posteriori, ex qui-
 bus eodē modo destillabat aqua, semper ad-
 iungens olei superioris usum, donec ex ra-
 dice, ut ita dicam, ipsa desiccaretur aqua.
 Quibus medijs, sub dimidijs spacio anni,
 puella ista ad vnguem sanitati resti-
 tuta. Cauebat autem ne ex istiusmodi
 causticis medicamentis, aqua vniuersim,
 sed tantum destillando efflueret. Circa
 eam autem quæ intra cranium atque
 membranas cerebrum amplectentes con-
 tingentem aquæ collectionem maiorem
 innuit cautionem esse habendam, ob virtu-
 tis scilicet imbecillitatem, & caustici me-
 dicamēti impressionē, et aquæ prope cere-
 brum

Caustica
 sensim ad-
 hibenda,
 & inter-
 quiescen-
 dum.

brum propinquiorem viciniam. Quam ob rem sternutamentorum, Gargarismatum caput purgiorum, superius enarratorum, Usus in nutricibus potius, quam in ipsis infantibus admoliendum esse.

Morbus quartus Emphysema, Paulo, Inflatio capitis, Auicennæ.

IN superioribus ostensum est, tumorem Morbi descriptio.
 omnem siue ab humoribus, siue à flatuoso spiritu progigni. De illo verò in iisdem locis nonnihil dictum est, de hoc autem in presenti agendum est loco. Istiusmodi mali mentionem facit Auic. Can. 3. fen. 1. Inflatio Capitis puerorum. Emphysema.
 Tract. 3. cap. 11. quod etiam inflationem capitis puerorum nominat. Nos verò auctoritate. P. Aegineta suffulti, ἐμφυσήματα, more Græcorum nominamus. Is enim lib. 4. De arte Medendi capi. 28. Emphysema differit, à spiritu flatuoso, sub cute quidem aliquando, sub membranulis interdum ossibus circumfusus, vel musculos

ava

Manardus
medicus ce-
lebris.

Emphyse-
ma oculo-
rum infla-
tio etiam
dicitur.

ambientibus, collecto, & coacervato (quā
inflationem Latinorum quidam nomi-
nent) gigni. Huc etiam adigimur. Manar-
di celebris medici autoritate li. 8. Epistola-
rum Medicinaliū, Epistola. 3. contra Mar-
celli in Dioscoridis scholia inuecti, quod
perperam posuerit Emphysema in oculo
tantū fieri, quamuis eo vox oculorum in-
flationibus etiā accommodetur, sed intelligi
hoc debere in omni spiritu flatuoso, vel sub
cute, vel sub membranis, quæ ossa, aut la-
certos ambient, contento.

Causa. Ea propter Schola nostra inflationem fie-
ri capitis adserit à calore imbecillo, sub
innumeris humiditatibus crudis, & vi-
scidis velato, & suppresso, quas exupera-
re nequeat, actione ita tam infirma in
eas operāte, flatus subinde suscitari: qui in-
terdū craneæ suturas infringāt, forasq; erū-
pāt. Adinuare hīc Paulus ostēdit cutis de-
sitate, quæ spiritu non tam facile persfletur
cunq; hac, si crassarū partium sit spiritus.

Si

Signa presentis mali communiora sunt, Notae.
 Tumor, & inflatio. Nonnulli his adiun-
 gunt illa quoq; signa superius in secundo
 Morbo ex Avicenna citata.

Quod si pueri hoc melo laborantes alui Prognos-
tica.
 fluore infestentur, malum id, exitiosumq;
 esse Avic. portendit: quia eiusmodi mate-
 ria ne dysenteriam importet, aut facultas
 pueri cominuatur: quum facillime resol-
 vantur, precipue ex vigilijs, dolore, &
 febre, aliorumq; symptomatum concursu,
 exactissime providendum esse.

Curationis scopus, iuxta Aeginetam, Curatio.
 est capiti raritatem inducere, spiritus cras-
 siores extenuare, quæ quidem medicame-
 tis, tenuium partium, calidæq; potentia ab-
 soluatur. Et nihil hoc nos remoretur Avi-
 cennæ in cap. II. Can. 3. fen. 1. curandi per
 refrigerantia modus. Per medicamina Medicami-
na flatus
discutien-
tia.
 enim ex ordine calefacientium flatus ipsos
 discuti, cur ipse idem autor in Can. 1.
 Fen. 3. Doct. 1. c. 3. edocuit & castoreo, ori-

ga

gano sicco, cymino equaliter commistis,
 & in puluerem redactis infanti in potu
 dari, in pondere granorum trium hor-
 dei permisit? Proculdubio non aliam ob-
 rem, nisi quòd flatus discutiant tam
 in stomacho, tam in intestinis, quàm
 in cerebro ipso contentos. Haud dissi-
 mili ratione Paulus in lib. i. de sanitate
 tuenda puerorum peditus, flatusq; cum cy-
 mino, anetho, apio, lanæ inspersis com-
 primit, penitusq; extinguit. Quod etiam
 & Razes in presenti casu obseruauerat,
 calidarum virium administrans medica-
 mina, vt sunt, oleum amygdalarum ama-
 rarum, & anetinum, & de Been. Et
 aquam maioranæ, infantium naribus im-
 mittere, iubet. Itidem & emplastra ex
 olibano, sarcocolla, serapino, gummi amyg-
 dalarum capiti adponere, ausus est.

Item, & reliqua calefacientia, vt in
 sequenti patebit capite. Quòd autem
 Auicenne curandi
 modus. Auic. diuerso huic modo suam exordia-
 tur

tur medicationem, ut cum aqua hordei, quam lactantem potare precipit, fortè magis symptomata mali, quam ipsum morbum respicit, hoc est febriculam, quæ solet plerumq; ex immenso doloris, & inquietudinis malo in puero progigni, quæ facile ex nutricis lacte per aquam hordei refrigeratam compescitur. Simili modo, & alio symptomati huius morbi succurrit: nempe fluori alui, cum spodio, & semine portulacæ torrefactis, atque in aqua hordeacea epotis. Sic non aliam ob rem balnei interdicat usum, ne in febriculæ æstum, infantem magis protrudat, adhibita viola refrigerata. In summa, si morbus omnis suo contrario est medicandus auxilio, & inflatio à spiritu flatuoso adiuuante ad hoc cutis densitate, vel spiritus crassitudine suboriatur, quis dubitat eiusmodi malum extenuantibus, & raritatem inducentibus, & calidarum potentiarum medica-

mi

Ex flatu
duplici du-
plicem cu-
randi ra-
tionem ori-
ri.

minibus adimendum esse? Deinde Symptomata, instar umbræ corpus insequentis, mala, & suis certis, iuxta rei dispositionem, medijs propulsanda esse. Estò quòd quidam sint, qui hanc curationū diuersitatem ita componant. Flatus scilicet duplici modo fieri: aut à calore imbecilliori in humidum tenuiter agente, & tum eiusmodi flatum progignente, atq; talem vaporis more exuscitari. Alium verò fuliginosum, turbulentumq; esse, & à calore nonnihil vehementiori concitari illi tum calefacientia: huic verò refrigerantia competere.

Morbus quintus, Capitis magnitudo immodica.

Morbi descriptio.

Pveros interdū magnis progigni capitibus Razes in de Locis adfectis puerorum, & experimentorum libris indicat: atq; his editis eorum deinde capita supra legitimam naturæ mensuram denuo augmentari. Vidisse itaq; se puerum cuius

Historia.

ca.

caput in longitudine adeò adauctum sit, ut corpus hoc diutius ferre non poterat, atque in augmentando non desysse, donec puer decesserit. Quèadmodum enim exiguum caput vitiosam cerebri suppellectilis constitutionem, autore Aegineta, indicat: itidem neque ingens bonæ cerebri cōstitutionis notam præ se feret. Namque ex hoc minimè, nisi ob insitæ potestatis robur, multam, ac optimam materiã fingentis eueniat, bonum utique indicium habebitur. Nam quòd propter materiæ duntaxat copiam ingens fuerit, sine decenti figura, malum certè erit.

Ob quam rem Medici istiusmodi mali ^{Causæ} causas, vel aquæ colluuiem, de qua superius dictum est, vel flatuosi spiritus in capitis ossibus tumultuantis impetû posuere.

Quare nutricis caput cum Hieris ma- ^{Curatio.} gnis exinaniendum esse, Razes persuadet: victumq; flatuosam materiam pro-
gignentem interdicat. Deinde verò pue-

D

50 DE PVERORVM

rorum naribus olea amygdalarum amararū, aut de anetho, immitti, vel de been optimo: aut de aqua maiorana docet. Quibus medijs si minus curetur puer, emplastrum ex libaneto, hoc est, thure, sarcocol-la, & opo Cyrenaico, & gummi amygdal. capiti admouendū esse, vult. Aut si nondum eiusmodi modo curatū sit, nuciū tūc putamen cū testa pisere, atque in formam vnguenti reddere, precipit, cū modico thuris, deinde verò capiti raso, ad aliquot dies adplicandum. Nā huiusmodi medicinam caput restringere, atque vt ad legitimam redeat formam cogere, idem pollicetur autor. Ad hac puerorum naribus, vel lupi, vel cerebrum: itē myrrhae modicum, vel ambra intrudere, identidemq; quouis mēse repetere iubet.

Morbus sextus, capitis vlcera, quæ Plinius manantia, Græci Achoræ, & Ceria, Auicenna Saphatum, nostri Tineam vocant,

IN capitis cute fieri Ulcera P. Aegin.

lib. 3. prodidit, quæ Achores dicantur, Morbide-
scriptio.
tenuissimis foraminibus cutem perforan-
tia, ex quibus glutinosa sanies defluat. Achoræ.

Hoc notum mali genus nostra ætate à ti-
nearum in vestibus similitudine capitis
tineas adpellari Marcellus protulit. Teneæ.

Veluti enim illæ multo, eoq; tenui mor-
su, & erosione vestes perforent, sic capi-
tis Ulcera hæc cutem. Quod etiam Ha-
liabas imitatus tineam hoc malum ad-
pellat, attamen generali sub nomine
(teste Manardo) quo non solum achores,
& ceria Græcorum, sed & ficus, & Psy-
dracia, & exanthema comprehenderit.
Plinius verò, quādo antiquitas huic ma-
lo nomen nullum adhuc repererat, à con-
tinuo saniei fluxu, manantia capitis Ul-
cera nominavit. Sunt præterea ex neote-
ricis qui hunc morbum capitis impetigi-
nem vocent, quasi scabiem siccam, sub
forma spherica, atque asperam adpa-

Tinea.
Achores.
Ceria.
Ficus.
Psydracia.
Exanthema.
Capitis vl-
cera ma-
nantia.

rentem.

Capitis im-
petigo.Scabies sic
ca.

Saphatū.

Eminētia.

Pustulae
rubeae.Maculae
rubeae.
Saphati
descriptio.

Hoc verò genus mali Avicē. Sapha-
tum adpellauit, & esse de genere emi-
nentiarum in cute vlcerosarum: quae qui-
dem in principio valde sint exiles, hoc
est, in formicarum forma, vt quidam ex-
ponunt, adparētes. Ad haec esse fixas, le-
ues, & diuersas in positu: propterea quòd
sint innumera. Quae verò deinde vlceri-
bus exulcerentur crustosis, quod quidem
in temporis processu fieri, declaratur, pro-
pter materiae acrimoniam: atque demum
crustis obduci, ob materiae siccitatem, tum
crassitiem. Proinde eiusmodi pustulas ad
rubedinem proclines esse idē prodit Avi-
cenna, fortē ob sanguinis biliosi morsum,
ad locum adfectum pellectum. Qua quidē
ratione nonnulli persuasi, vt Razes, Sa-
phatum maculas esse rubeas adfirmātes,
quae cum paruis fiant pustulis, atque pue-
ris plerunque accidāt, tam in facie, quā
in capite. Hinc nonnulli Saphatum de-
scri

scribentes, hoc ruborem in cute capitis esse
 definiebant, in quo innumera, & diuer-
 sa suboriretur pustula, quæ denuo effrin-
 gantur: quare locus exulceretur, sæpius q̃
 verò euanescent, & denuo iterum re-
 pullulet, & hoc tantū ex malo cutis tem-
 peramento prouenire. Alij verò hoc ma-
 lum rubedinis tantū esse adfectū in car-
 ne accidentem, pulmonis verò colorem in
 rubore referentem: sed variū, & diuer-
 sum, iuxta materiæ ipsius hunc ruborem
 procreantis differentiam. Sunt præterea
 qui tineam verè dicant esse Saphatum,
 cutis scilicet cum crustis deturpationem,
 veluti cum glutinoso cruoris fluore, &
 capillorum defluuio.

Tinea vas-
 rum Sapha-
 tum
 apud quos-
 dam.

Porro Saphatum in species duas Aui-
 cen. ponit: Vnam videlicet siccam, absque
 crustis, & sine cruore glutinoso, alteram
 verò humidam, quam denuo in alias,
 subdiuidit species. Vna enim est, ut Pau-
 lus recitat, quæ tenuissimis foraminibus

Morbi di-
 uisio, in
 siccum, &
 humidum.

Humidi
sub diui-
sio.
Achor.
Cerium.
Tineæ spe-
cies alia
apud Ga-
lenum.

cutem perforat, è quibus glutinosus ex-
cernatur cruor, quæ αχὼς nuncupetur.
Cui sanè haud dispar figura, & aspectu
malum sit, quod κηρίον hoc fauum dica-
tur: quoniam foraminibus peramplis te-
rebratum, mellis instar humorem con-
tineat, quemadmodum in apum fauis
detur liquidò cernere. Ceterum adhuc
vnum aliud hoc genus mali reperiri
Galenus in lib. I. decē Tractatum adse-
rit, quòd inter hæc duo sit quasi medium:
quia neque foraminum admodum sub-
tilium ut superior: neque adeò peram-
plorum, ut secunda in ordine compe-
riatur.

Tineæ spe-
cies sex
apud Ha-
liabatem.

Hinc Hali. lib. 8. suæ Theoriæ sex qua-
si species Tineæ ponit. Vnā, ex qua quid-
piam instar faui emanet. Altera, in qua
quidpiam simile granis ficuum cõtinea-
tur, quæ sphaericæ figuræ sit cum rubore.
Tertia, ex qua cruor effluat instar aquæ
in qua caro sit elota. Quarta, quæ similis

exi

existat papillis vberum muliebrium cum rubore aspersa, ex qua sanguinolentus profluat cruor.

Quinta, quæ lupinorum & formam, & colorem representet, à qua quidem cortices instar squamarum candidarum, & aridarum decidant. Sexta, ex qua furfuracea defluant corpuscula, interdum minutissima, aliquando verò densiora.

Originē verò præsentis mali Aegī-
neta ad nitrosam, salsamq; pituitam re-
fert. Hinc Guliel. Placen. lib. 3. capitu. 8.
hoc malum aliquando cum vdis, ali-
quando verò cum aridis adcidere pu-
stulis recitat: siue recens, siue per tem-
poris diuturnitatem vtrumque euene-
rit. Illud autem ex pituita salsa non-
dum abundè adassata, aut ex sangui-
ne quodammodo exassato cum bile
commisto: hoc verò ex pituita ad vn-
guem exusta, siue ex sanguine cum bi-

le iam quasi exhausta compacto, pro-
uenire. Ex sanguinis verò redundan-
tia cum cutis humiditate hunc mor-
bum accidere, Razes de puerorum
egritud. lib. attestatur. Constat autem
apud vniuersos Medicinæ professores,
istiusmodi malum ex humoribus prauis,
salsis, nitrosis, acutis, & erodentibus eue-
nire: quæ interdum tenues, interdum
verò crassi sint, aut ex vtrisque permisti,
vel in utero genitricis ante partum pro-
geniti: post ortum ex cibationis delicto
ad accumulati. Consentaneum equidem est
ex humiditate praua, acuta, erodente,
sanguini commista adfectionem istam
produci, autoritate etiam Auicen. qui
crassos istiusmodi humores per combu-
stionem humiditatum illius excedentis
in causa esse, adserit: quo crassum eueniat
apostema: nempe tenuiori humiditate
absumpta. Namque crassiores eiusmodi
humores, & prauos in capitis cute
exi

existentes, crassum gignere apostema,
tenuiori scilicet materia foras protrusa,
quis dubitabit? atque huiusmodi sapha-
tum tunc verè humidum adpellari. Sic- Tineæ sic-
cæ causæ.
cioris enim succus atræ bilis in causa esse

Videtur, videlicet aridus, biliosus humo-
ri coniunctus, qui excretionem cute tenue
promotam facile adiuvat, istic tam cor-
rumpentem, quam crustis aridis arro-
dentem. Eiuscemodi itaque causæ huc-
usque recitatae, in ipsius hominis corpore
consistunt: quanquam & extrinsecus
causæ interdum nonnullæ eueniant, ipsum
corpus vehementer alterantes, immutā-
tesq;: quas interim procatarchontas, inte- Causa pro-
catarchontæ.
rim procatarchéticas, autore Gal. pronun-
ciant causas: Ut sunt res quas dicunt non
naturales, è quibus potissimè in præsenti-
arum hæ duæ sunt cibus & potus.

Notarū istiusmodi mali indicia par-
tim ex ipsius usus intuitu: partim ex Notæ.
correpti hac labe enarratione depræhen-

Tinea hu-
mida no-
ta.

Phthiria.

duntur. Nisi quod Saphatum humidū ali-
qui velint cum pruritu mordicāte exor-
diri, scalpendi q̄ ardorē incitāte, vt demū
locus ille adfectus intumescat, adaugea-
tur q̄, & foraminibus terebretur, ē qui-
bus deinde cruor ille emanet, pedicula-
tionis plerūque, quā Graci φθυσία dicāt,
particeps. Ad hæc Vermes sub crustis de-
litescere, vnde & abominabilem exha-
lare fœtorem. Quare Razes vulnera hīc
parua comparere in pueris ait, ex quibus
humor ille profluat, qui tum in capite, fa-
cietenus q̄, cum pruritu expatietur, vnde
pueri vigilēt, plorēt, plāgant & eiulent.
Guliel. Placen. hīc aliā circa indicia fert
sententiam. Nā inibi pustulas adparere
einentes, euidentes q̄, albas scilicet &
rubeas recenset, ē quibus sanies tūc in cō-
pressu destillet, sine tamen prurigine, cum
rubedine verò non admodū intēta, ardore
tamen & calore ibidem inexistētibz.
Quam quidē notarū differētiā ex ma-
teria

teriarum illic delinquētū varietate colligendā esse, in cōfesso est omnīū. Nā si ex sanguine cōstiterit, locū adfectū cū rubedine, magis tamen sub obscura adfici: & calorem hīc excitari, cum dolore, & pruritu leuioribus, & cruoris fluore minori, nemo est, qui circa hac hæsitet. Color enim loci adfecti, tum humor effluens super delinquētū materiae essentia perpetuò dijudicant: veluti & präteritæ cibationis diæta in cibo, & potu siue in alijs, vel rectè, vel perperam obseruata. Equidem ex cutis colore, redundantem, vnde vitium proueniat, humorem esse coniectandum, Paulus lib. 3. capi. 1.

De arte medendi insinuat. Sic in Saphato, quod siccum esse dicitur, color croceus, viridis, & niger adparet, vnde nihil profluit, aut parum quidem, id quoque exile. Huic verò rubedinem inesse immodicam cum spiceo colore Gulielmus indicat, & cum pustulis paruis,
raren

Cutis color humor rem redundantem indicat.

Tineæ sic notæ.

rarēter humore reijciētibus etiāq; cōpres-
sis, nisi quod locus ille crustis sit plenus, pru-
ritu vehementi, & rubedine adfectus.

Prognosti-
ca.

Quotquot sint Saphati species, omnes
tamen in deciduum capillicium vēturas,
nonnulli tradidere autores, inæquali ta-
men malitia, iuxta materiæ delinquen-
tis, siue erodentis in sua dispositione dif-
ferentiam. Proinde verò & in Alope-
ciam, tum Ophiasim, & ad exulcera-
tionem in cute, vsque ad carnē verti, po-
tissimum verò ubi hoc inueteratū fuerit.

Curatio.

Curationis præterea in præsentī pue-
rorum malo siue sicco, siue humido, mede-
la omnis in nutricem ipsam, autore Raze,
reijcienda. Hæc igitur autoritate etiam
Aegin. melioris succi cibo utatur, atque
modis omnibus acri, acerboq; abstineat,
præcipuè verò quando inflammatione lo-
cus adfectus correptus sit. Dulcia itaque
hic maximè negligenda, ne fortè mate-
ria biliosa in caput rapiatur. Itidem &

Tineæ sic-
cioris Dia-
ta.

solis

solis, & ignis æstus euitandus, aceti-
 q; vsus: tum portulacæ esus (vt quibusdam
 placet) non à suo temperamēto, sed inter-
 na, & abstrusa facultate malo huic insi-
 diantis. Hic etiā fructuum comestio in-
 terdicitur, malis punicis demptis: item &
 lactis pisciculorum omniū, ouorū tā asso-
 rum quā frixorū obsonia omnia. Hinc
 etiam Auic. lib. 4. Fen. 7. Tract. 3. capi. 2.
 nutricibus diligenter inculcat, ne edulia
 immodicam dulcedinē sapientia esitent:
 potissimum verò dactylos quasi materiā Dactyli.
 omnem ad cutē ipsam proritantes. Itidem
 & amarorem, acorē, salsedinem, præ se
 ferentia. At hīc tantummodo humectā-
 tibus corpus, iusto tamē modo, refocillan-
 dum esse, vt sint balnea, & id genus
 alia. E diuerso tamen in humidiori agen-
 dum esse tinea, iuxta materiæ in humidi-
 tate peccātis differentiā. Hīc enim exic-
 cantia, vt sint turtures, aues syluestres,
 adassatæ, & parua, & alia quidem eius-
 dem

Tinea hu-
 midioris
 diata.

dem generis conducere. Quum verò præ-
 sens malum ex humoris pravi cōpressio-
 ne, iuxta Gal. in 1. Meamir, eueniat, exi-
 nanitione nonnulla indigebit, facultate
 roboris (quod in pueris minimè) concessa.
 Hæc ratio est, quare Auic. Venarum se-
 ctiones, vt in brachio, capite, fronte, iuxta
 aures admittat: vel sanguisugarum, siue
 cucurbitularum adpositiones. Pharmaca
 verò quibus sicca tinea humorem bilio-
 sum, & melancholicū, siue pituitosum, ni-
 trosūq; educimus sunt myrobalanorum,
 & Epithymi, cum aliqua alpēs, & scam-
 monia & portiuncula adiecta decoctū. Haud
 dissimili modo & certa conficiuntur me-
 dicamenta, tinea humida materiam eli-
 cientia, in communi vsu apud quosuis ha-
 bita. Quamobrē fit, vt nonnulli puero, nō-
 nihil adultiori intelligo, de Hiera quid-
 piam dare iusserint, per decem dierū spa-
 cium, iuxta facultatis, & ætatis in pue-
 ro tenorem. Postremò & Symptomatum,
 hec

Sympto-
 matum cu
 ratio.

hoc malum comitantium, non minima ratio est habenda. Ob quam rem Aegineta congruenti euacuatione peracta, de-raso prius capillamento, bis, aut ter, aut multo sepius aqua calida fouere locum adfectum adhortatur: in qua quidem elixata sit myrtus, aut rubus, aut lens, aut lupini amari, aut asparagi radix. Et si multa vi ichores exernantur, locum illinendum esse cum folijs salicis, cum aqua, aut lenticula syluestri. Quem more & nostri sectantes, frequentem capillitij abrasionem tam in sicca, quam in humida tinea repetentes, nisi quod in arida id subtilius admoliantur. Rasura vero peracta, arida tinea cum aqua decocti ex beta, fumo terrae, & chamemelo, abluunt. Vdam vero cum lixiuio decocti predictarum herbarum, cui & alia nonnulla medicamenta adfectui siue humidiori, siue receti, siue vetulo admiscet. Haud impari modo

Razesca. i. de puerorum mor. capita puero-

Psilothrū. rum tundi cum psilothro, hoc est medica-
 mento depilatorio, iubet. Deinde verò
 Atriplex. Atriplicis folia super poni uenenum illud
 Vnguent. quasi extrahentia: quo facto, sanitatem
 Razis. tam facilius restitui posse. Ad hac vn-
 guentum huiusmodi capiti eorū illitū,
 valde conducibile esse. Adcipiatur enim
 cerussæ, lithargyri, æquè drachmæ quin-
 que: lixiuij de cineribus vitū, aut vrti-
 carum, iuxta quosdam, drachmæ tres:
 olei rosacei vncia vna, ceræ vncia vna,
 qua liquefacta, cum oleo rosaceo, atque
 duobus ouorum luteis assatis, in formam
 vnguenti redigantur.

Morbus septimus, quem Raz-
 zes Fauum, Græci Κυσίον
 adpellant.

Morbi de-
 scriptio.
 Cerion fa-
 uus.

IN superiori loco ostensum est ex Paulo
 I malum reperiri, Achori haud sanè
 dispar figura, & aspectu, quod Cerion,
 hoc est, fauum dicatur: maioribus tamen
 foraminibus, in quibus sanies melli simi-
 lis,

lis, instar faui contineatur. Hoc Gal. in
 suis diffinitionibus, si Galeni sunt, vlcus
 esse scribit contiguus terebratum forami-
 nis, ex quibus mellis crassitudine humor
 excernatur, quod quidē etiā in sua Isago-
 ge, vbi de capitis tractat vitys, tātū capiti
 adsignatur. Attamē Marcellus super lib.
 I. Dios. cap. 14. infert, duo in vlcerum ge-
 nere à Græcis numerari: ab apibus, & ea-
 rū aluearibus inuēta adpellatione *κυσίον*,
 scilicet quod fauū possimus adpellare: &
μελικηρίδα quæ à Latinis Græcè semper *Meliceris*,
 meliceris dicatur, factō ex melle, & cera
 nomine, quæ quidem duo mala à scripto-
 ribus commisceri sæpenumero adfirmat.
 Celsus enim li. 5. vtrumq; cōmiscet genus,
 nisi quod alterum terebratū esse, alterum
 tunica subinuolutum admittat, ex vtroq;
 tamē crassitudine mellis, aut visci humo-
 rē fluere, & in toto corpore, præcipuē tamē
 in scapulis, et pectore vtrūq; nasci. E cōtra
 verò Meliceridē in capite & reliquo cor-

pore Gal. attestatus est. Quod & Pau. lib. 4. de arte medēdi confirmat Melicerida scilicet tunica sua contineri tenuioremq̃, ex ea quā ex fauo humorē manare expressumq̃ fluere, contra morem aliorum huiusmodi vitiorum, abcessuumq̃. Ex quibus proculdubio constabit, hęc duo mala ita inter se differre, quod fauus contiguus sit terebratus foraminibus, meliceris verò in sua tunica claudatur, & inuoluatur. Conuenire autem quod ex utroq̃ mellis crassitudine, & colore, humor manet, & expressus. Qua autem parte corporis utrunq̃ eueniat, medici adhuc tam Græci, quā Latini certant, et adhuc sub indice lis est. Proinde licet de achoribus & de fauis, quasi de cōgeneribus, in eadē parte malis, ab Aegineta, ut prius ostendimus, actū sit: attamen eiusdem scriptoris autoritate permoti, qui in tertio libro, quāuis hęc duo mala coniunxerit, in quarto de fauis & vlcerib

Fauis & meliceridis differentia & conuenientia.

ribus foraminosis peculiaria capita conscripsit. Itidem fecit & Razes, qui licet ambo mala ambas Saphati species esse senserit, attamen fauum crustosam esse tineam distinxit, de qua humiditas mala profluat fauo mellis haud absimilis.

Idq; eiusmodi docet, notis deprehendi, quod circa Ulcera veluti squamæ adpareant: & quod cutis scalpatur immenso pruritu, & quod instar mellis emanet. Paulus vero tumorem esse ostendit pluribus & continuis in cute foraminibus terebratum, per quæ mellis omnino crassitudine humor defluat.

Curationis modus superiori non est Curatio. admodum dissimilis. Caput enim quotidie deradendum esse Razes docet, de novo cū decocto mētastrī maioranæ, Thymbra hoc est, satureiæ ablucendū, postea vero cū sequēti unguēto perlinēdum. Accipiat^{Unguētū.} lithargyri, cerussæ æquæ aurei duo: sulphuris, hydrargi æquæ aureus unus

68 DE PVERORVM

olei rosacei partes duæ, aceti pars vna: commisceantur, & cum oleo rosaceo, & acetotandiu, donec in vnguentum concinnetur, cum quo caput manè & serò inungatur: cum decocto verò abluatur.

Morbus octauus, Vigilia.

morbi descriptio.

Infantibus ac nuper natis puerulis nunquam contingunt vigilie, teste Hippocr. li. 3. Aph. 24. quas tamen ipsis haudquaquam adfuetas esse, Galenus super eodem loco interpretatur, quòd maiori parte temporis dormiant. Sed fortè ob ipsam passionem fieri infantibus vigilias opinatur, siquidem somni abundantiam ipsis maxime secundum naturam inesse.

Vigilia ex passionibus oritur.

Dormire & vigilare penes Ari-
stotelem quid sit:
Vigiliarum

Dormire aliquem deprehendimus, Aristoteles ait, quum exterioris sensus usu priuatur, & officio. Vigilare autem discernimus, quando exterioris sensus fungitur officio sentitq. Compertum tamen est, vbi vigilie modum excesserint, cerebrum

bri bonam temperaturam corrumpi, sensus debilitari, virtutes consternari, cruditatem & inconcoctionem effici: atque demum corpus resolui. Somnus enim & vigilia, si utraq; modum excefferint, autore Hippocrate, malum. Quare eiusdem & Auicennae autoritate, infantibus vigiliae accidunt, ut Can. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 1. Ex quibus incessanter plorant, atque os indefinenter vagiendo mouent. Alludit his etiam Razes cap. 6. de puerorum morbis. 25. Experimentorum pueris vigilias accidere, in prima etate cōtestatur, idq; ex lactis corruptione provenire.

Sunt qui huius mali culpam in alimen-
torum copiā & vitium, stomacho onera-
to rejciant, veluti P. Aegineta, quod se-
pius vsu venisse & compertum esse idem
affirmat. quasi ex istiusmodi vapores ad
caput ascendant, vigilias, pauoresque
prouocantibus. Quorum Symptomatum

incōmoda.
Somnus &
vigilia mo-
dum exce-
dētia ma-
lum.

Causa.

Note.

notæ unicuique ex ipsa refacillimè innotescant.

Prognostica.

Vigiliæ ex euacuantibus exiccantibusque proueniunt.

Conuulsio ex siccitate cum desipientia.

Vigiliis tussis superuacaneus mala.

Curatio.

Pessimam autem esse notarum illam, Vbi in vigilia autoritate Hippo. Aphor. lib. 7. Aph. 18. Conuulsio, & desipientia, quia immensam siccitatem & facultatum imbecillitatem portendat. Constat enim ex Galeni verbis, Vigilias maximè euenire, ex ijs quæ euacuent & exsiccent, atque ideo conuulsionem ex siccitate facere, ac desipientiam, immodicæ siccitatis ratione ac præterea quia in longis vigilijs biliosior reddatur sanguis. Ad hoc in vigilijs superuacaneis tussim siccam esse malum, quia siccitatem membris spiritualibus inesse portendere.

Quo pacto autem huic malo succurratur, id circa nutricis nutriendæ dietam statuendam autores posuere. Dictum enim est, hoc malum in primis ex lactis malicia pullulare. Quamobrem si ex alimen

mentorum quippiam copia, vel vitio, aut stomachi quidpiam redundantia delictum fuerit, id considerari debeat iustaque occasione abscindi. Razes vero in Experimentorum, tum de puerorum adfectibus libris persuadet, puerorum naribus, oleum violarum cum aceto injiciendum esse, aut oleum anethini cum succo lactucae. Deliniri praeterea caput sum oleis praedictis praecipit: ita tamen ut in nutricis lac animadvertatur. Ad haec syrupum de papauere candido, pueris sub eclegmatis forma dari persuadet: tum frontem temporaque cum oleo, opio, & croco inungi. Atqui ex Avicenna in sua curatione intentionibus, quatuor à nostratibus deliguntur remedia, vsui nostro non parum competentia: nisi caput alicuius pueri, in hac adfectione correpti (quod in primis hic observari debet) admodum humoribus esse infarctum comperiretur. Primum est, ut ex modica aqua rosacea, pa-

Remedia
quatuor
ex Auic.
mutuata.

Primum.

paueris capite trito, malagma concinnetur, quo cataplasmatismore frons oblinatur. Nam tritis, mollificatusq, papauerum capitibus iuuari hoc malo adfectos Aegineta consentit. Simili modo contra nimias vigilias, & Vbi sopire opus fuerit, papauer nigrū emplastri modo fronti, & tem-

Secūdu pa-
pauer albū. poribus ex aqua impositum Dioscorides lib. 4. ca. 63. aperit. Nos verò iuxta vsum

nostrorum medicorum, non nigro, sed albo vtimur, quasi nonnihil familiari ad somnum prouocandum remedio. Huius equidem semen & cortices terimus, & cum aqua rosacea, tum lacte muliebri, emplastri modo fronti & temporibus imponimus, quod secundi remedij lo-

Tertium. cum obtinebit. Tertium est oleum de lactucis fronti, temporibus, tum vertici adpositum. Quartum, est oleum de papauere, eodem, vt dictum est, modo vsitatum.

Ex quibus verò quatuor remedijs nonnulli huiuscemodi conficiunt compositionem

nem. Recipiunt enim corticum papaue- Cōpositio.
 ris albi, & eiusdem seminis aequè semun-
 ciam, oleorum de lactuca: & de papa-
 uere aequè vncias duas, quibus seorsim
 tritis, commistis, & in modum vnguen-
 ti redactis, fronti, temporibusq; indunt.
 Sunt porro qui tantum pannum in lacte
 mulieris puerulum lactantis intingant,
 deinde fronti & temporibus imponant.
 Quibus etiā addūt, necessitate impellen-
 te, succos lactucæ, portulacæ, αἰθῶνος, hoc est
 peruiui, cum modico opij, vel in decocto
 maluæ plantaginis minoris, cum populeon
 & oleis rosarum, tum violarum pannum
 intingunt: dein verò fronti, temporibusq;
 imponunt. Siue oleo violaceo cum lacte mu-
 liebri & oleo rosaceo, frontem cum tem-
 poribus vngunt.

Morbus nonus, Somnia terrifica,
 pauores Hippocrati & Galeno.

INfanti somnia accidere terribilia in Morbi de-
scriptio.
 somno, Aui. Can. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3.

innuit. Cuius etiam Hippocr. mentionem facit in Aph. lib. 3. Aph. 24. Vbi ostendit in nuper natis puerulis oris vlcera, (quæ aphthæ vocentur) vomitus, tusses, vigilias, pauores, vmbilici inflammationes, aurium humiditates contingere.

Pauores.

Hoc malum Galen. super eodem, nunc allegato loco, pauores vocat, per somnum infantibus accidentes, & præcipuè ijs, qui sint natura edatiores, quum loca ad ventriculum pertinentia, sensu quidem vigeant, sed imbecillia existant, cibis verò corrumpatur. Obseruassè se idem Galenus adserit, nō in tantis solum sed etiam in atate perfectis, terribiles fieri per somnos imaginationes, quum multum vitiosi humores grauent, & mordent ventriculum, præsertim verò ipsius os, quod præcipuū habeat sensum. Cōstat præterea & recentiorum autoritate medicorum somnia eiusmodi ex nimia cibi redundantia euenire: quæ cum à natura

Imaginationes terribiles in somno.

tura concoqui minimè possit in ventriculo demum corrumpi, quòd malum tunc stomachus maximè sentiat, à cuius deinde potentijs sensualibus ad vires partium cerebri sensualium defertur, quatenus sunt imaginaria, siue phantastica. Nam cuiuscunque somnus passio est Somnus. particula, ad eandemq; insomnium Insomniū. pertinere potentiam, Aristoteles Libro de somno & vigilia, Tract. 2. confessus est. Somnum enim partis sensitivæ existere: igitur & insomnium sensuali potentia ascribere dum esse. Ad hæc cum insomniū imago tantum quedā & phantasma esse videatur. Rectè igitur sensualis partis existere, non quatenus sensualis sit, sed quatenus imaginaria, siue phantastica. In eandem sententiam & Galenus ferme differit, in libro de somnijs, quem si voles, super huiusmodi re consulto.

Porro quemadmodum somnus à cibis, Causæ.
 teste Aristotele tanquam causa potissima
 pro

proficiscatur, ita de somni causis ratiocinandum erit. Quum enim à cibo multus vapor, & corpulentus educatur sursum, illicq; consistens grauedinem parturiat, sensuumq; languorem. Atque rursum vbi is cor adobruerit, atque receperit, secumq; calorem repellens profundum gignet somnum. Idem præterea capitis, & oculorum, & palpebrarum grauedinem facere, indicio sunt somnifera vniuersa, siue sint esculenta, siue poculenta, vt sunt opium, papauera, mandragora, temetum, fatigatio multa, morbus, vt febris, lethargus, infantia. In paruulis enim recens natis hæc plerunque eueniunt, quòd capita aliorum proportionem membrorum, habeant maxima totius, multique (quòd illa ætate augeantur) alimenti capacia. Ob quam causam hanc ætatem morbo comitiali, hoc est, Epilepsia, aptissimam esse traditur, vt, in sequenti videbitur adfectu.

Hæc

Aetas puerilis Epilepsia obnoxia.

Hac fortè ratione Raz. huc fuit addu-
ctus, quòd somniorum mala sub Epile-
psia capite in lib. de puerorum morbis com-
plexus sit: Vbi etiam omnem mali cau-
sam in lactis, vel alimonie illegitimæ
ingestæ, à natura non satis concoctæ, sed
potius corruptæ errorem reijcit.

Ex quo quidem incommodo, sine mo- Nota.
ra in somno pauorem accidere, in vigi-
lia vero calorem adcumulari atque ex
ore infantis odorem fætidum emergi, no-
tarum huiusmodi certissima sunt argu-
menta.

Quo autem remedio huic succurratur Curatio.
incommodo. In primis curandum est,
ne infans ventriculo adhuc infarcto ob-
dormiat, sed potius aliquandiu hinc-
indè gestetur: Vt nonnihil interim vi-
gili mente ludat, donec alimentum ab ore
ventriculi descendit: quo facto vapores,
tum fumi copiosi cerebrum minus inflig-
gent. Ad hoc mellis nonnihil, vt lingat,
puer

puero propinandum, quod sua extergen-
di facultate digerat, ad ima^q protrudat. Commoniti etiam à Raze dyaplivis,
vel dyamusti cum lacte in quātitate gra-
norum decem, puero administrare. Prae-
cipuum quoq; in hoc casu iuuamentum es-
se, theriacam magnam cum lacte por-
rectam, ab eodem instruimur autore. Sunt
postremò qui tantum cibi aliquid deme-
re, doceant, & lingere mel instituant.

Morbus decimus, Epilepsia Græ-
cis, morbus comitialis, La-
tinis, mater puerorum
vulgò, Regius, ac
diuinus Aris-
toteli.

Somni cū
Epilepsia
cōmunitas.

Dictum est in morbo superiori, ex
Aristotelis autoritate, etatem pue-
rilem Epilepsiae obnoxiam esse: quem
morbum idem autor recitat, ceu somno
persimilem fieri: atque eiusmodi ma-
lo la

lo laborantes corruere, itaque cessante anima, & sensu dormire, videri: quae quidem ex causa huius morbi initium in somno esse. Præterea & nonnullos in somno hoc malo corripiti, in vigilia vero nequaquam quod multus sursum cum alimenti vapore in somno spiritus efferatur, qui reciprocans, spirituique alteri sursum alimentum tollenti obuians, venas intumescere faciat, animæ, & respirationis meatus occludat. Quæ quidem spiritus occlusio, strangulatio, comitialis, regius, ac diuinus adpelletur morbus. Conuenit ergo præsens superiori succedere malo, in ordine: atque Razem ut prius, meminerimus, ambo sub vno contextu, quasi congenere complexum fuisse mala. Comitialis olim dicebatur is morbus, quod hoc correpti in comitijs maximè detegebantur: & comitia, quod die aliquis concidisset, teste Q. Sere-no, interrompebantur. Sed Græci ut

Hip

Strangulatio. Comitialis. Regius, diuinus morbus. Comitialis morbus unde dictus. Epilepsia.

Mater pue-
rorum
Παιδία
νόσος,
puerorum
morbus.

Hippocrates, & alij *ἐπιληψίαν* nomi-
nant: quem hactenus schola nostra,
quoad casum praesentem, Matrem pue-
rorum vocitauerat: Graecis vero *παι-
δία νόσος*, id est, puerorum morbus
dicitur, quod is videlicet pueris quous-
que pubertatis aetatem pertingant, pe-
culiaris est. Huiusmodi enim adfectum
praecipue pueris accidere, & longe frequen-
tius recens in lucem editis, Aegineta
tradidit: post hos vero adolescentibus
& adultioribus, qui sint in aetatis flore:
minime vero senibus & decrepitis. Ni-
hil hic nos remorentur *Ραζις*, tum alio-
rum eius sequacium somnia, adfectum
hunc nequaquam pueris à febrilis aestus
inflammatione accidere, disceptantium:
atque sic morbum istum distinguen-
tium, quasi alius ab humore pituitoso
proveniat, & id recte quidem: alius
vero à nimia ariditate, qui potius spaf-
mus, quam Epilepsia dici, debet. Est
enim

enim hic morbus in pueris verè Epilepticus dicendus, qui potissimum (ut in causarum explicabitur negocio) ex pituitoso, tum melancholico, sed rarius, eueniat humore. Atqui comitialis morbus, quem *ἑπιδειψία* Græci vocant, conuulsio est omnium corporis partium non continua, sed per intervalla quædam temporis facta, cum sensuum, & principalium operationum, rationis scilicet, & memoriæ oblesione, ex crasso, magna ex parte humore, ventres cerebri obstruente, & transitum spirituum prohibente, principio nervorum seipsum quatiente, ad expellenda, quæ sunt sibi molestæ. Hanc quasi epileptici mali absolutissimam finitionem Ioan. Manar. epistola medici. libro 13. epistola 6. composuit: quum alij tantummodo epilepsiam dicant, totius esse corporis conuulsionem, non sine nocumento principum effectuum.

Epilepsia
verè mor-
bus est pue-
rorum.
Epilepsia
finitio ve-
ra.

F

Causa.

A tempe-
ramēto ce-
rebrī inna-
to.A causa
externa.Epilepsia
non facile
incurrunt
pubertate
egressi.

Morbi autem huius videlicet Epilepsiae puerilis causa est duplex, auctoritate Rasis capi. 7. de puerorum adfectionibus libro.

Aut enim ex temperamento cerebri ingento, sed improbo, scilicet frigido & humido subnascitur: aut ex alio quodam accidentario modo. Sic ex nativae istiusmodi causae ortu potissimum hic morbus pueris accidit, ut dictum est, tanquam algidioribus, vditioribusque: post hos vero adultioribus, veluti ex aridioribus rarissime tamen, ob eorum membrorum siccitatem. Ab accidenti vero quod eveniat casu, illegitimo pravae dietae usui praecipue adscribitur. Sic illud à prima ortus sui genesi causam sui mali secum trahit: hoc vero ei à casu quopiam foris accidit. Quamobrem pubertatem egressos difficillime hoc malum incurrere auctores decessere: quanquam in hoc nonnunquam incidant, praecipue ubi retro in teneriori etate hoc semel labora-

bora

borarint. Pueros autem adhuc existen- ^{Epilepsia}
 tes facillimè hoc malo corripì, quorum ce- ^{facillimè}
 rebella humiditate copiosa scateat, atque ^{incurrunt}
 membra adhuc existant imbecilliora. ^{pueri.}
 Quare *Auicē. lib. 3. Tract. 5. Fen. 1. cap. 8.*
 more aliorum, Epilepsiam plurimū acci-
 dere pueris annuit, ob eorum videlicet
 humiditates, plerunque in eis quum na-
 scantur adparere, interdum verò post pu-
 bertatem.

Epilepsia in pueris nativæ notas in ^{Notæ.}
 partu deprehendi adfirmat Razes: ad-
 ventitiæ verò post partum.

Atqui si infans, ut quidam prodide- ^{Prognosti}
 re, Epilepsia malum ab utero materno ^{ca.}
 secum traxerit, & deinde evomuerit,
 seq̃ ipsum ita repurgaverit, exinanie-
 rit de copiosas expellendo redundantias,
 aqueasq̃, liberationis à malo indicium
 erit: si verò minus hæc evenerint, nequa-
 quam. Itidē infans in mensium fluxione,
 aut ex impuro parentū sanguine genitali

conceptus, & tandem genitus Epilepsia correptus difficillimè sanabitur, quòd ab utero & causis prauis quasi modo inueteratis mala intemperies egisse radices videatur. Præterea Epilepsiam puerorum, & mulierum, atque omnium quorum sanguis sit paucus, valde detestabilem esse Auicenna arguit, ob Venarum scilicet strictionem.

Curatio.

Eslo P. Aegineta libro 3. capitu. 13. De arte medendi, Comitiali correptis etià dum infantibus, nullo planè medicamine esse succurrendum velit, ætatis quasi mutatione imbiliosius, & aridius, & diætæ intemperantius, ac frugalius, sua sponte plerunque adfectionem istiusmodi cessuram: attamen Neoterici nostri hanc medendi, in hoc morbo rationem, in duas dirimunt partes: nempe præseruationem & curationem: sententiæ interim Pauli & Hippocratis, illius videlicet dicti auctoris, nequaquam immemores.

Præseruatio & curatione.

Præ

Præseruatione Verò vtuntur, quan-
do causam morbi esse præsentem sciunt, <sup>Præserua-
tio.</sup>
sed nondum morbum facientem, tunc ab
exordio, adito iam puerulo, corporis par-
tes disponunt, irrigant, continent, tum
quæq; in suum ordinem redigunt, tum
Verò ante lactis exhibitionem huiusce-
modi cibum infanti porrigunt. Acci- ^{Pulmētū.}
piunt enim sacchari candidissimi Vncias <sup>Oleum su-
famainum</sup>
duas in puluerem redacti, quem cum oleo
sesamino recenti (hoc enim fit ex sesa-
mi semine, iuxta Dioscor. Aegyptijs fa-
miliare, nobis autem perrarum) vel oleo
de amygdalis dulcibus concinnant in
modum alicuius conditi, siue pulmenti,
de quo cum digito infanti mensura co-
chlearis præbent. Est autem cochlearis
capacitas minor drachma integra atque <sup>Cochlea-
ris capaci-
tas.</sup>
duplex eius mensura, scilicet, magni, &
parui.

Ocyssimè enim ex hoc ferculo puerum
somno corripi, adserunt, quem semel ab eo

excitatum, denuo huiusmodi cibo iterum, atque iterum alendam esse, ad innumeras quidem horas persuadent. Eiusmodi enim cibum nutrire infantem, & delicatissimè humiditates noxias, tum pituitosas, tum crassas, & melancholicas sordeis in vtero coaceruatas, iam in stomacho, & in intestinis contentas euacuare ministerio alui efficacissimè traditur. Quod ni fieret, perfacillimè in Epilepsiam, etiam ex leuissima quadam causa puerum incisurum. Ad hac omni die per quatuor siue sex menses, post balnearum vsum, corpore adamussim deterso oleo sesamino, vel chamæmilino puerum perungendum precipiunt. Addunt præterea lapidem smaragdum, & radicem pæoniæ, vtiliter collo alligari, ad arcendum Comitiale morbum. Nam illum collo suspensum hæmitriteum curare morbum, & caducum Albertus lib. 2. Tract. 2. capi. 17. De Mineralibus testatur. De hoc

Lapis smaragdus.

Historia
Galen.

Verò

Verò Gal. indubitanter differit se quondā
 nouisse puerum, nunquā sanè morbo co-
 mitiali correptum, quandiu radicē Gly-
 cysidis, quam Pæoniā nuncupent, magnā,
 & recentem collo suspensam tulisset. Iti-
 dem de visci quercini, atque lapidis in
 hirundinum nidis reperti usu, & cōmo-
 ditate, in præsenti morbo, apud autores
 hincinde mentio fit crebra. Oportet autē
 hīc præcipuè, & tā circa infantes, quā
 & lactātes, victus rationē obseruare: nā
 utrobique si quid delictū fuerit, non parū
 huic malo incōmodabit. Nutrici igitur in-
 iūgatur ne quid ingerat, quod lac aqueū,
 vel crassum, aut vitiatum generet: sed
 eiusmodi nutriatur edulys, quæ lac te-
 nuus, sed medicè reddāt, & in substātia
 proba, & odore laudabili contineant,
 coitumq; omnino fugiant. Infans verò
 ab omnibus animæ adfectionibus probi-
 beatur: ab omniq; nutrimento, dempto nu-
 tricis lacte, subtrahatur: neque subinde la

Radix gly-
 cysidis, id
 est Pæo-
 niæ. Viscū
 querci.
 Lapis nido-
 rum hirū-
 dinum.

Syrupus de
Cichorio.
Cichorij
virtus.

etetur, in huiusmodiq; cibandi ratio-
ne vsque ad dentitionis tempus custo-
diatur. Nonnulli Syrupum de cichorio in-
fanti, diu, noctuq; præbent, vt ex eo lin-
gat. Cichorium enim à sua innata facul-
tate comitalem arcere morbum æstimã-
tes. Eundẽ præterea Syrupum quũ pue-
ruli iam firmare gressus cæperint, cũ eorũ
vrina calida perrigunt, vt humiditates
eorum tenues molliter educat, & exiccet.

Curatio.

in quiete.

Porro curationem ipsam in duo seor-
sim distinguunt tempora, videlicet Pa-
roxysmi, & quietis. In primis autem
nutricis hũc dietam diligentissimẽ obser-
uari, vt in præseruatione nonnihil per-
strinximus, præcipiunt: proculdubio Hip-
pocr. autoritate admoniti, qui in libro.
Aphor. secundo, Aphor. 45. insinuat;
quocunque iuuenes morbo comitali la-
borantes, mutatione maximẽ ætatum,
& temporum, & locorum, & victuum
quoque liberari. Quod idem quoque au-
ter

tor in Epidem. lib. 6. inculcat, inquit:
 Puerorum nonnullorum morbi comitiales
 vna cū pubertate mutationes habent, &
 alias. Quum enim Galen. ait, super loco
 iam pridem superius citato, frigidus, &
 crassus sit humor epilepsia, idcirco adole-
 scētium etas, quæ calida & sicca est, ma-
 ximum affert auxilium ijs qui morbo
 laborant comitali. Sic & locorum pro-
 portionales mutationes, eodem modo &
 victuum. Namque horum non qualibet
 mutatio morbum soluit comitale: sed quæ
 calidiorem & sicciorē corporis habitū
 efficit. Contingere præterea, & audire
 simpliciter victus rationem, siue muta-
 tionem morbo comitali prodesse, quū ma-
 gna ex parte victus deprauatus passio-
 nem generet, vnde & mutatio multo
 ad melius perducatur. Operæ precium ita-
 que erit, hūc summum studium circa vi-
 ctus rationem adhibere, præcipue ve-
 rò in lactantis observatione, postea ve-

Victus de-
 prauatus
 passionem
 generat.

Epilepti-
cus mor-
bus diutur-
nus.

ro ipsius lactentis. Nam ubi semel hic
erratum fuerit, de morbi huius prolixita-
te nonnihil timendum erit. Quibuscunq;
enim idem inquit Hippoc. Aphor. lib. 5.
Aphor. 7. Morbi comitiales sunt, ante
pubertatem & mutationem accipiunt:
quibuscunque autē vigesimo quinto, com-
moriuntur. Hinc etiam Aegineta hunc
morbum adserit magna ex parte longū,
ita scilicet, ubi non in pubertate, aut mu-
lierum expurgationum, aut concubitus
tempore cessauerit, aut si post hoc tempus
permanserit, plerunque vsque ad mortis
diem comitari, nisi per commoda reme-
dia sustulerint.

Victus pue-
rorū Epi-
lepticoꝝ.

Puerorum itaque cibus sit lac optimè
preparatum in decenti obseruatione la-
ctantis. Atqui nutrix ipsa neque sit plus
iusto obesior, neque multum laboriosa,
neque ociosa, sed viuax, vultusq; amœni,
moram proborum, non luxuriantium,
sed operationum nativaru, viuidarumq;.

Exer

Exercitium itaque eius sit temperatum
 & modestum. Quod silac eius aquosus
 redderetur, aridioribus cibis corrigatur.
 Si verò crassus nonnihil efficeretur, cum
 extenuantibus temperetur: ita, ut ca-
 ne & angue peius vitet, quicquid hu-
 miditatem generet: potissimum verò
 coitum ipsum. Lac præterea omni probe-
 tur die, spectando an vitiatum fuerit,
 quod & odore, tum colore exactissime
 deprehendetur. Hic cardamomum à
 nutrice sapius masticatum optimè in-
 uabit, atque idem cum lacte in os infan-
 tis impositum, quod & præseruare, &
 curare hunc morbum in paroxysmo fer-
 tur. Ad comitiales enim hoc facere
 morbos aqua potum Dioscorides con-
 uincit.

Lactis pro-
 batio.

Cardamo-
 mum pue-
 ris Epile-
 pticis pro-
 ficuum.

In paroxysmi autē tempore, summo-
 pere est curandum, ut conuulse partes
 irrigentur, contineantur, & in ordinem
 redigantur, manibus prius perunctis, oleo
 scili

In paro-
 xysmo.

Odorame
ta.

scilicet amygdalarum dulcium, ne vlt-
rius conuellantur. Deinde verò ori aper-
to, digitus, aut penna oleo irlino illita ad-
mouentur ad pituitam eliciendam, au-
tore Paulo. Postea verò odoramentis sen-
sus excitandi gratia, vtendum est, vt fit
cum ruta, & id genus alijs. Naribus si-
quidem medicamenta calida adhibere
Razes iubet, vt assam fœtidam, rutam,
& calidorum vnctiones. Demum vbi
morbis inueterascit ille, Theriacam ma-
gnam dari, cõcedit. Sunt autem qui Pœo-
niæ radicem in puluerem contusam cum
lacte mulieris infanti administrent.

Morbis vndecimus, resolutio
neruorum: apud Græcos
παράλυσις dicitur.

Morbi de-
scriptio.

Causæ.

Notæ.

Curatio.

Resolutio, autoritate Rasis capi. 23. de
puerorum adfectibus, accidit pue-
ris, vel in vno membro, vel in toto corpo-
re, quæ eius ex lectione motum impediat.
In causa præterea est humor crassus, re-
soluens

soluens nervos. Notæ sunt satis apertæ.

*Curatio verò fit, si nutrici syrupum ex
attenuantibus medicamentis admini-
straueris. Et cibum aridum, vt assatum.
Et si lactis interdicator vsus, similiter
& piscium, & vini diluti potus. Puer
vero ante lauacri vsus lactandus est,
atque cum oleis de costo, & castoreo circa
iuncturas perfricandus. Deinde autem
istiusmodi Electuarij esus commēdatur,
quod Galeno adscribitur, quo puerū quen-
dam spasmo laborantem curarit. Recepit
itaque mentastri, rosarum, cinnamomi,
mastichis, meon, valerianæ, ameos, do-
ronici, Zedoarie, gariophilorum, singulo-
rum aureum vnum, sandalorum, ligni
aloës cuiuslibet drachmam vnam, musti
drachmam dimidiam, singulis exactis-
simè tuis, simulq; mistis, cum melle confi-
ciebat Electuarium, de quo singulis die-
bus, partem quartam drachmæ vnius,
vel dimidiæ porrigebat.*

Electuariū
Galenī pue-
ro labora-
ti spasmo,
concinna-
tum.

Mo

Motionis
impedimē-
tum, vel de-
fectus in
pueris.

Motionis porrò impedimentum, vel defectum in pueris accidere, comperimus, vel ex neruorum oblesione: vel musculorum crura dimouētium adfectione: Vnde motus progressiui debilitas suboriatur: quo pueri omnes dimotionum, siue positionum differentias obeundas aliqui impotentiores efficiantur. Cui malo pulchrè subuenire, hoc leue auxilium ferūt, si crura, & articuli puerorum lixurio decocti baccarum lauri, & granorum Pæoniarum decorticatarum illinantur.

Auxilium
leue pro
pueris pa-
ralyticis.

Morbus duodecimus conuulsio, quam Græci, *κράμπη* vocant.

Morbi de-
scriptio.
Conuulsio
spasmus.

Conuulsio, ex Galeni, vt quidam volunt, expositione, quā Græci *spasmū* nominant neruorū, tū musculorū est adfectio, in qua trahūtur ea sine electione, hoc est, inuitis his aliquādo totū corpus, aliquādo corporis aliqua partes. Hāc idē in li. 5. Symptomatum causis ait neruos, musculosq; ad eundē cogere adfectū, in quē ab anima

li facultate, quam naturalē habitum ser-
uarent, ducebantur. Prater eā conuulsione
fieri in Apho. 6. lib. 6. Aphorif. 39. Con-
uulsis ad propria capita musculis, idē tra-
dit autor, atque id ipsum indicare nomē.

Hinc Arabes morbum hunc describen-
tes, alij nerui cōtractionē esse in se recen-
sebant, & in longitudinis suae decurta-
tionem: propterea quod contrahatur, &
colligatur. Alij autem aegritudinem esse
neruosam dicebant, qua muscoli ad suum
principium vel fontem reuellātur. in di-

Conuulsio
nis descri-
ptio Ara-
bica.

latatione contumaces. Quum autē de con-
uulsione hīc mentio fiat: non de ea quidē
sola fit, quae in vna tantum parte corpo-
ris, sed in omni eo infestet, quam prom-
ptissimē pueris euenire Galen. docet, po-
tissimum verò lactentibus: non minimē
verò propter vsum lactis, magis q̃ verò
quoties fuerit crassum, & quia pluri-
mo alimento, & importuno vtantur,
nihil aliud adgnoscentes viuendo prae-

Conuulsio
nis diuisio.

Conuulsio
nibus pue-
ri sunt ob-
noxij.

ter

ter esitandi cōmoditatē, omne enim ner-
uosum in eis esse debile. Quod quidē etiā
Hippocrates Aphorif. lib. 3. Aphor. 25.
indicat, in progressu inquit, cū iam den-
tire incipiūt, gingivarum prurigines, fe-
bres, conuulsiones, alui profluvia, & ma-
ximē cū caninos edunt dentes, & ijs
præsertim pueris, qui sint crassissimi, &
aluos habent duos. Ex crudo itaque ali-
mento, hoc malum fieri Gal. exponit, tum
quia nervosæ parteis nondum sint satis
validæ.

Conuulsio
nistria ge
nera.

Atqui hoc malum Galenus in Isa-
goge sua triplex simul complexus est, in
nervis quoque fieri ostendens, conuulsio-
nisq; genus omnium à capite nervorum
esse, per quos corpori motus detur: & ut
recta, vel in alterutram vis illa cōuulsio-
nis partem se insinuet: itaque diuersum
loco potius, quàm re malum hoc fieri. Sæ-
pißimē equidē euenire cernimus (quod
Marcellus pulchrē depingit) ut in neu-
tram

tram partem rigeat caput, ceruix & reliquum corpus: sed veluti solidissimum, siccissimumq; aliquid inflexum, & immotum recta rigeat. Sape etiam in anteriorem, aut posteriorem partem, ceruix, collum & caput inflectatur, rigeatq; singula communi rigoris adpellatione vocantur. Est enim rigor, teste Paulo, in convulsionis genus totus comprehensus. Non autem de rigore hic illo intelligendum est, de quo medici in febribus dicunt, quos Celsus frigora, algores, & horrores nominat. Sed de eo latino rigore, qui pro inflexibili duritie sumitur. Sic Plinius alijs animalibus à natura ceruicem esse datam flexilem, alijs rigentem scribit. Huiusmodi igitur rigores intelligentes, quos Latini proprijs vocibus dignari non possunt, sed id à Grecis ipsis mutuuntur, atq; primum eorum genus quod Greci, *τῆταρον* nuncupant, Latini rigorem simpliciter adpellant: hoc est illud convulsionis genus quod

Rigor.
quid.
Rigores.
Algores.
Frigora.
Horrores.
Rigor latine dictus.

Convulsionis genus
primum Rigor Latine
simpliciter Graecis
Τεταρον

G

nos dictus. recta per corpus fit, in quo collum, & ma-
 Genus se- la contrahantur, autoritate Galeni, den-
 cūdum La tes utrinq; hæreant, neq; annuere, neq; re-
 tinis rigor in pectus, nuere ceruix possit. In hoc enim ceruicem
 Græcis Em cum reliquo corpore veluti immobile in-
 proschoto- flexam verò in neutram partē priuatim,
 nos dictus. sed iuxta in utramq; intēdi recta Paulus
 Genus ter- prodit, & sic rigorem simpliciter dici. Se-
 tium Lati- cundum verò genus cum in pectus, caput,
 nis rigor in scapu- ceruix, & reliquum corpus rigeant, &
 las, Græcis inflectantur à Græcis ἐμπροδοτονον, La-
 Opiscoto- tini rigorem in pectus nominant. In hoc
 nios voca- enim collum in anteriorem trahi, nec in
 tus. posteriorem trahi posse, idem Gal. aperit.
 Tertium verò genus quando caput scapu-
 lis veluti adnectatur à Græcis ἐπιδοσό-
 vos, Romanis verò rigorem in scapulas
 dici.

Conuulsio Porro conuulsionem vel ex repletionē,
 vel inanitione fieri, ex Hyppocratis auto-
 ritate Aph. lib. 6. Apho. 39. in communi
 omnium Medicorum est sententia. Nang;
 ex

ex repletionem fieri, sicuti etiam in ex-
 dentibus iuxta aëris humiditatem am-
 bientis constitutionibus accidere chordis,
 ob eam namq; causam sæpissimè rumpi
 Galenus recensuit. Itidem & in sicciori-
 bus constitutionibus adfici idem tradit:
 nam in seipsas colligi, ac conuelli omnia
 nervosa corpora violentius exiccata: velu-
 ti quæ ad ignem longo tempore calfiant
 loca, simile quid pati, & quæ sol æstiuus
 exiccet. Conuulsionem itaq; non absq; ra-
 tione à contrarijs fieri causis.

Conuulsio
 à contra-
 rijs fit cau-
 sis.

Proinde istiusmodi conuulsionis in
 pueris ex repletionem euenientis duæ potif-
 simum colliguntur causæ: concoctionis vi-
 delicet deprauatio, quæ partim ex dolori-
 ficis dentium punctiõibus: partim ex la-
 etis plus satis auida ad nutritionem at-
 tractiõem, atque ad incrementum ubi
 fuerit digestum, oriri, dicitur. Altera
 Verò est nervosi generis in illis pueris im-
 becillitas, quare redundantias humorum

Causæ.
 Concoctio
 nis deprau-
 uatio, &
 nervosi ge-
 neris imbe-
 cillitas
 duæ

potissime
causae con-
uulsionis
ex reple-
tione eue-
nientis.

facile pertrahunt, ut saepissime in illis
contingit, corpus crassum, & humidum,
aluumq; duram habentibus quum, mi-
nor in istiusmodi humorum superuacaneo-
rum resolutio pertingat. Harum causa-
rum, & in Aegineta, de tuenda sani-
tate libro, cap. 9. mentionem fecimus: Vbi
ostendit circa mensem ferè septimum
pueris dentes plerumq; provenire, atque
prorumpere, quo tempore quidem ipse
gingivarum, maxillarum tendinumq;
phlegmones, quod est inflammationes non
raro nervorum etiam convulsiones in-
festare: vel ob nervorum debilitatem, vel
propter concoctionem depravatam, siue
propter corporis in puero crassitiem, &
humiditatem potissimū accidentes. Pluri-
mos autem eorum, Hippocratis testimo-
nio, saluari, non omnes verò hoc malo
correptos perire, eodem in loco à nobis osten-
sum est. Atqui in superioribus iuxta Ga-
leni mentem, inculcatum est convulsio-
nem

Convulsio
pueris
promptis-
sime eue-
nit.

nem pueris promptissimè euenire, & præcipuè lactentibus, non minimè verò ob lactis vsum, & magis quidem quò crassius fuerit. Quia plurimo, & importuno pueros vti alimento nihilq̃ aliud viuendo agnoscentes præter esitandi commoditatem. In hoc equidem proculdubio Hippocratis aut oritarem sequutus, adferentis, Conuulsionem nuperrimè editis pueris promptius accidere ad septimum vsque annum. Huc enim non minimum causarum pertinere, Galenus super eodem disputant loco, neruosi scilicet generis in pueris debilitatem. Quia quum tres genere vires existant ex quibus gubernetur hominis corpus, & duabus quidem pueri quàm ceteri fortiores habeantur: vna verò debiliores, quæ in neruis innexa sit, ob quam quidem rem promptissimè conuelli: & rursus ad habitum naturæ facillimè remeare. Adultioribus verò nec facile consistere,

Tres genere vires in corpore humano.

Conuulsionibus pueri facilius

adultiori- neq; desistere conuulsionis adfectum pro-
bus libe- pter valentem in nervis facultatem.
rantur.

Notæ.

Conuulsio
nis à reple-
tione indi-
cia.

Conuulsio
ni febrem
superueni-
re melius,
quàm è
contra fie-
ri.

Possunt autem presentis mali nota fa-
cillimè ex re ipsa argui. Sunt tamen Ga-
leni hîc verba super Hippoc. Aphor. lib.
2. Aphoris. 26. exactissimè perpenden-
da, qui dicit, Vbi sanum aliquem con-
tingat repente cōuelli, huiusmodi cōul-
sionem ex repletionem fieri, necessariū esse.

Quia nervi oppleantur à frigidis, & glu-
tinosis humoribus, ex quibus etiā nutrian-
tur, vnde cōuulsionē patiātur, quibus tū fe-
brē superuenire melius esse, quàm febri cō-
uulsionē Hippoc. infert. Hanc enim ma-
gna ex parte calefacere, extenuare, at-
que dissolvere Galen. interpretatur. At-
tamen ex febribus adurentibus totum
corpus exiccari, et nervis deinde ex sicci-
tate conuulsionem accidere, maximum
hoc malum esse, & penè insanabile:
quum longum ad sanandum requiratur
tempus, siccitatem scilicet remouendam,

atq;

atque morbi acumen, tempus minimè expectare, quin citius vires dissoluat, & subito exitium adferat, in eundem circa causas Aegineta ratiocinatur modum. Quotiescunque ait, circa morbi statim exordium, vel non longè ab initio conuulsiones orsi persistant, atque perennent, à plenitudine proculdubio originem habere. Si Verò post plurimos corporis sudores, aut vomitiones, aut excrementorum alui deiectiones, aut hæmorrhagias, aut immodicas vigilias, aut famem, aut permultas denique aut vehementes commotiones sequuntur, tum à vacuatione fieri consentaneum esse. Sed ubi aliqua sospitum partium subito conuellatur à plenitudine fieri necessarium esse. Atqui si ex febribus adurentibus totius corporis aruerit moles, ex illa q̃ ariditate conuulsio ortum habuerit, nervisq̃ pariter exarescentibus, proculdubio id exitiosissimum, & tantum immedicabile esse malum.

Conuulsio
nis diuisio
ad materiã
proportio
nata siue
nō propor
tionata.

Et hæc est conuulsionis diuisio, quam ha-
tenus Schola nostra in proportionatam
ad materiam, aut non proportionatam
ad materiam distinxit. Illam verò quæ
siue ex materia copia, vel defectu con-
tingat: vt ex materia cuiusdam re-
dundantia veluti est pituita glutinosum,
aut ex materia eiusmodi conferti ina-
nitione. Hanc autem materia non propor-
tionatam ex dolore aliquo, vel cerebri
nocumento consequi vt conuellatur, cuius
nulla materia causa existat, sed tantūmo-
do qualitas quædam adficiens, vt sunt do-
loris puncturæ, adfectiones.

Prognos-
tica.

Ex prædictis Galeni verbis facile de-
prehenditur, conuulsionem puerorum es-
se faciliorem: quum enim facilius in pri-
stinum reducantur statum, quia ad habi-
tum naturæ facile sint, (vt ipse ait) re-
meabiles. Simili modo Auic. lib. 3. fen. 2.
cap. 5. recitat, pueros à cōuulsione arida ve-
locius liberari ob humiditatem tam tem-

pe

peramenti, quàm cerebri eorum. Intelligens ex hoc quidam exponunt, à conuulsione sicca velocius præseruari, hoc est, à veloci, siue leui causa eueniente: pueris enim quum sint humidi, non tam promptè conuulsionem siccam à subitanea, siue leui causa accidere posse subindicans.

Curandæ verò conuulsionis à plenitudine fortè auxilium omne à nutricis diæta auspiciandum erit. Imprimis etiam studendum ut aër gelidus, humidusquæ euiteatur, & potiss. in pueris quorum nervosum genus valde existat debile. Item & crassus, palustrisquæ adflatus, imo & venti quasi vniuersum omnes sunt effugien- di. Itidem & adfectus animæ refrigerantes, & ocium, & quies torpida. Somnus diurnus, illicoquæ post prandia sumptus: locorum humidorum inhabitatio, & vigilia superflua: itidem cibus omnis frigidus, & vdius, copiosusquæ siue multum infarciens: similiter & omnis recremen-

Curatio.
Conuulsio-
nis à pleni-
tudine cu-
ratio.

torum retentio. Aër verò sit calidus & siccus, vel à natura, vel ab arte ita fabrefactus.

Hic etiam conducunt & illa, veluti nonnulla iuxta solem, vel ignem (corpore tamen prius exinanito) statio, ira, animi adfectio, gaudium, sollicitudo, meditatio, dimotio, omnibus tamen his modicè vsitatis.

Olea ner-
uis contra-
ctis confe-
rentia.

Quo ad infantes verò primum vt nobis videtur, etiam Paulo autore, admolendum erit, vt membra, quæ naturæ quadam aptitudine contrahi nata videantur, vincantur, superentur, inordinatiq; motibus occurratur. Deinde verò nervi contracti quinq; oleorum generibus perfricentur, quæ Auic. lib. I. fen. 3. cap. 3. Doct. I. plurimum commendat. Quorum

Oleum iri-
num.

Oleum li-
riorum al-
borum.

primum est irinum. Est enim diaphoreticum, extersivum, maturativum, dolorum frigidorum sedativum. Nam iridem convulsis prodesse Diosc. adfirmat. Alte-

runa

rum, est liliorum alborum oleum, quod dolores compescit, lenit, calfacit, & mollificat. Tertium, est Cyprinum, cuius usus hominibus die non extat. Quartum Keirinum. Sic Aegineta lib. 1. De sanitate tuenda putat efficaciter puerorum convulsionibus herbam, quam Heliotropium Græci, Latini solarem dicant, aqua elixam opitulari, si eo decocto puer lauetur. Expedire autem multo magnificentius si oleo Irino, Cyprino, aut Sicyonio illitus puer, tantus, quantum est, incaluerit. Adhuc infantium iumenturis Auicenna adponere emplastrum docet ex melle compositum cum maiori pondere radicum lily, & cum aniso, croci vero minimo. His insuper addit, puerorum membra decocto chamæmeli, fœnigræci, meliloti infundenda. Oleum vero chamæmelinum per se solum aliquando administratum non parum iuuare. Quare olea Diaphoretica à recentioribus hic plurimum adprobatur Medicis, ut sunt: costinum, laurinum, chamæmelinum.

Oleum cyprinum.

Oleum keirinum.

Heliotropium solaris.

Solaris.

Emplastrum Auicennæ ad membra convulsa puerorum.

Oleum chamæmelinum.

Olea diaphoretica.

Con

Conuulsio
nis in vni-
uerso cor-
pore cura-
tio.

Emplastrū
Conuulsio
nis à siccitate
eueniē-
tis curatio.

Conuulsioni autem in toto corpore euenienti, RAZIS præscripto, huiusmodi emplastrum dorsi vertebris adponitur. Cera enim adcipitur vncia vna, Euphorbij semuncia, olei quantitas competens, & iuxta artis modum concinnatur.

Atqui conuulsionis curandæ à siccitate euenientis Methodus superiori est admodum diuersa, atq; ex diametro quasi opposita: quàmuis etiam circa nutricē ipsam auspicetur: attamē aërem calidum & siccum effugiat, imò & caloris immensi feruorem: imò & frigiditatis intentæ gelidū: Similiter & flatuosum, iuxta ignem siue focum stationem perennem, meditationes, dimotiones, frictiones omnino immodicas, balnea sicca, & arefacientia, vigiliæ, cibos nutrimenti pauci, & concoctioni contumaces, famem, sitim, venærem, alui deiectionem, dietam tenuem, siue attenuantem. Aër verò sit humidus nonnihil ad caliditatem, tempore gelido ad

ad frigiditatem verò, in calidiori tempore vergens. Foci verò vsus, si sit pernecessarius, lignis tantum aridioribus, minimè tamen prunis instructi admittitur, sed eminus. Ad sit præterea lætitia, gaudium, & iocunditas. Vestitus sit lenis, lineis vel sericis filis consarctus. Intercurrat quoque quies, somnus, amicorum cōgerronūq; amabilis affatus fercula sint humida: ut aqua hordeacea: sed iura pingua, mollia. Incoquantur autem aquæ hordeacæ fructus illi iuiubarum, & sebesten, quos Græci serica, & myxas vocant, febris ardore æstuante. Quare chordri & alicæ vsus Paulus hic commendat, cum sorbitionibus, et vinum tenue facilisq; coctionis ne aqueum verò exhibendum, nisi febris infestarit, tunc enim ptisanæ cremore vtendum esse, & somno vacandum. Ob quam rem Avicen. hic humectantia, & lenientia, & omnes pingues sorbitiunculas infert, ex hordei farina, oleo amygdalarum

larum dulcium saccharo, & aqua carnis
 excerpta ex agnorum hædorumq; corpu-
 sculis. Quod si calorem in huiusmodi car-
 nibus existentem extimescamus, olera
 refrigerantia indamus. Lactis hîc vsus
 culpabitur minimè, si non supra modum,
 vt concoqui possit, absenteq; febricula, in-
 gestum fuerit. Recens autem hoc sit, mi-
 nimè verò vetulum. Infestante siquidem
 febre, hordei, cum cucurbita, melonis, &
 violarum iuleb, aliorumq; vsus admitti-
 tur. Lac autem asininum hîc potissimum
 à Raze commendatur, scilicet vt lactis
 sint vnciæ quatuor, cum amygdalarum
 dulcium semuncia & sacchari drachma
 vna, cum dimidia sumptum. Idem in Di-
 uisionũ libro: Lac bibere dulce, & vinum
 cum aqua concedit.

Lac asini-
 num.

Morbus decimus tertius, Rigor
 iuxta Celsum, quem Græci τῆτανος,
 nostri communi & vna tantum vo-
 ce Tetanum, Auic. Cuzen, vel Alcu-
 zen nominat.

IN

IN superiori loco satis ostensum est, Rigore, quem Græci τῆτανον vocent, conuulsionem quandam existere: qua scilicet in adfectis hoc malo, ceruix maneat intenta, & immobilis. At ubi caput scapulis adnectatur ὀπίσθον: ubi mentum capiti ἐμπροσθέν fieri, quasi Tetani differentias, nomine potius, quam ipsa ratione dissidere.

Causas præterea huius mali nonnulli cum conuulsionis partim conuenire, partim differre causis voluere. Coire enim amborum causas, quum vtrinq; siue ex repletione, siue ex inanitione, & id genus alijs contingant. Distare verò quod conuulsio rareret ex repletione musculorum per spiritum, & aërem crassum, siue nebulosum quodammodo eueniat, veluti in Tetano fieri Pelops (quem Paulus citat) convincit. Adijciens præterea eundem supra modum frigidum & concretum esse, atq; ideo difficulter mobilem & inflexibilem: quare sic adfectis

mag

Morbi descriptio.
Tetanos.

Opisthotonos.

Emprosthotonos.

Tetani differentia
nomine potius quam
re dissidet.
Causæ.

Pelops circa Tetani
causas iudicium.
Rigoris
causæ ex
Paulo.

Rigoris
causæ ex
Paulo.

magis conuenire sicca, quàm humida. Rigorem autem Paulus noster fieri, ceu gelu concretis, corporis præsertim spina, musculis vult, frigido humore intus, & foris adstringente: quare in ea adfectione ita constituti seipsos inflectere nequeant. Hæc præterea adfectionem sapissimè parere etiam laborem, humi dormitionem, ponderis eleuationem, casum, vulnus, æstum, plagam, & alia quæcunq; iacturam possint nervis inferre: quibus tamen medendum sit, quemadmodum illis, qui ex inanitione conuellantur.

Nota.

Tetani autem indicia siue ex infarctione, siue ex inanitione euenientis, ex convulsionis notis prius enumeratis facile deprehendi possunt: tantummodo in hoc, si quid discrepantia, quòd ille in sui initio in musculis cum motione, hac verò cum quiete exordiat. Quibus & Pauli addamus singularia indicia in hoc adfectu maximè pensculanda, vt respiratione an-

gn

gustam, pulsum rarum & paruum, & interdum risum veluti sardonium, faciei ruborem, ut oculi magis intumescere videantur: lotij mictionem nullam vel aliquam: attamen instar aquæ emissi, vel cruentis ampullis quibusdā inspersi, aluum durum, vigilias, de lecto interdum casum ex periculo convulsionis, singultum, in capite, vel utrisque humeris & lumbis aliquando tremorem.

Erit autē Tetanus in pueris multū facilius ob easdē, ut suprà, causas adductas,

Prognostica.

Curatio autem Tetanorum, iuxta Aui-
cennæ decretum, duobus potissimum hisce constabit remedijs. Vnum est, sylvestris cucumeris decoctum, quo infantes esse medicandos tradit, quòd extergat, calfaciat, remolliat, & diaphoreticū existat. Alterum est, ut nervi convulsi cum oleo violarum, & sicyonio, hoc est, de cucumere sylvestri, in equali pondere comistis irrorentur, illud remolliat, hoc verò exterat.

Curatio.

Remedia
duo Aui-
cennæ.
Oleum sicyonium.

H

Sic Paulus rigore conuulsis, (adultioribus intellige) à morbi statim principio sanguinem mittendum esse, præcipit: deinde lanæ cooperiendos, partem verò eorum oleo sicyonio, aut castorio, cum veteri oleo perungēdas, aut Vesicam quoque laxiorem calido oleo refertam conuulsis imponendam esse.

Morbus decimus quartus, *Convulsio, & Tetanus ex inanitione.*

*Descriptio
Causæ.*

H*iuscemodi malorum descriptiones, tum causæ & notæ, in superioribus satis sunt inculcatæ. Post plurimos enim fieri corporis sudores, aut vomitiones, excrementorum alui deiectiones, hæmorrhagias, immodicas vigilias, famē, vehementes dimotiones, adhuc lentiori tum oriri gradu ostensum est.*

Curatio.

Restabit itaque nonnihil expeditius super eorū curatione edisserere. Sunt itaq; nervi, siue iuncturæ infantium ex solo oleo Violarum cū paucō cera cādida oblinēdi.

Hinc

Hinc nonnulli oleum violarū cum quarta parte cera iuxta ignē cōponunt. Ad hac infantis autē capiti oleum oliuarum domesticarū, maturarum optimè, cum oleo violaceo, ex Auicennæ præcepto, imponunt. Alij verò olea de cucurbitis, vel de salicibus, vel nenuphare, recipiunt, atque tepidè ab alto capiti injiciunt, siue infundunt, humiditatem ei ita imprimentes.

Morbus decimus quintus, Glauco cedo oculi, quam Græci γλαύκωμα, & hypochymata, hoc est, oculorū suffusiones vocant.

Glaucoma oculi esse, in glaucum colorē naturalis humoris mutationē, apud Galenum legimus. Vel crySTALLINI humoris in glaucum & aquosum colorem permutatio. Eundem Paulus sequutus, glaucomata ait, hæc, quæ & Græci Hypochymata, hoc est, oculorum suffusiones vocent, antiquiores pro vno, eodemq; mali genere adcepisse: posteriores ve-

Morbi descriptio.

Glaucomata, hypochymata oculorum suffusiones.

Hypochy-
ma & glau-
coma quo-
modo dif-
ferant.
Glaucedo
viriditas
oculi Aui.

Oculi pue-
rorum in
primo or-
tu virescūt
iuxta Al-
bertum.

rò tantum glaucomata crystallini humo-
ris in oculo vitia dixisse, ex humiditate
in glaucum colorem transeuntia. Liquet
igitur ex iam dictis, hypochyma, tū glau-
coma res diuersas esse: quum hoc tantum
ex mutatione crystalloidis ad glaucū fiat.
Videtur autem Auicenna glaucedinem
oculi viriditatem nominasse: fortè eo no-
mine deceptus, quòd pòetæ salicem glau-
cam dicant, altera foliorū parte virescen-
tem, atque quòd mare glaucum, ex eodē
colore sæpenumero adpellent. Vel fortè
quòd (vt Manard. sentit) in capite, quod
de varietate oculi inscribatur, de natura-
libus potius, quàm de his qui præter na-
turam sint oculorū coloribus mentionem
egerit. Enimuero oculos puerorum in pri-
mo ortu virescere Albertus Germaniæ
lumen prodidit, eo tamen etiā ad glauce-
dinem nonnihil vergere: in progressu ve-
rò temporis commutari ad colorem qui
iuxta naturam potissimè exuperet.

Eni

Evidens præterea est, eiusdem autoris sententia, in nullo animalium, præterquam in humano oculorum genere, in colore varietatem esse aliquam sitam. In pueris enim hæc accidentia evidentissime euenire, quod in primæ ætatis, deinde verò iuuenilis statu, & tenore oculorum colores inuariuntur.

Oculorum
varietas
tantum in
humano
genere re-
peritur.
Causæ.

Ad hoc, glaucedinem pueris accidere, ob oculorum eorum imbecillitatem, ratione humorum in eis contentorum magis debilius, respectu iuuenum. Etenim glaucedinem omnem, veluti in oculorum debilitate consistere. Consentaneum enim esse colorum euariantium causas ex humoribus oculi componentibus fieri. Nam ubi plus humoris indatur, nigrum inde enasci colorem. Vbi verò minus, glaucum. Ob quam quidem rem, nonnulli glaucedinem ex sola siccitate in oculo exuperante euenire, adseruerunt. Ob eandemque causam, tum præcipue in senioribus accidere. Sic & Hippocra. lib. 3. Aphorif. 31. Aphorif.

Glaucedo
oculorum est
debilium.

Colorum
oculorum
euariantium
causæ ex
humori-
bus depro-
muntur.

Glaucedo
ex sola sic-
citate exu-
perante iuxta quosdam

senibus, inter cetera multa quæ hîc enumerat mala, Glaucedines euenire, docet, quarum causam esse immodicam instrumentorum siccitatem Gale. adfirmat, & quod speciem habeant suffusionis.

Glaucedo
duobus cõ-
tingit mo-
dis.

Constat itaque in tertia oculorũ membrana vnea vocata, huiusmodi contingere mala: præcipuè verò Glaucedinẽ, & duobus huiusmodi modis. Vno vt si quãdo in ipsa non exacta fuerit concoctio, veluti in ceteris vegetabilibus depræhẽditur, vt in primo ortu eorum albescant: deinde verò cõcoctione increscente virescãt: qua potissimũ ratione & puerorum oculos, quasi cõcoctione adhuc incõpleta glaucos esse. Altero verò quando humiditas illa fuerit quasi absumpta, oculorũ glaucedo facile in tenebricosum vertitur colorem, ipsumq; oculorum acumẽ in albedinẽ quandã permutatur, quẽadmodũ & reliqua vegetabilia humiditatibus aqueis cõsumptis albescere in dies experimur. Ex
quo

quo quidē vera illa glaucedo originē habet, suā quam in oculis ob ariditatē exuperantem euenire, prius indicauimus.

Qua etiā tanquā ex vera causa, & decumbentium, & senio confectorum oculos glaucescere, sine dubio indicamus. Quapropter nonnulli duplicē glaucedinis posuere differentiā. Vnam scilicet natiuam, iuxta cōmunem naturæ cursum euenientem. Alterā accidentariā, vt ab ægritudine, fletu immodico, in infantibus accidentem. In vniuersum autē potissimū in his euenire solet, quorum oculi aliās à natura glauci existant.

Oculi senum, & decumbentiū quare glaucescant.

Glaucedinis differentiā duplex.

In medelā verò istiusmodi mali, succū solani cōferre Auicē. perhibet. Cuius etiā in collyrijs oculorū Dioscor. cōprobat vsum. Nanque cōtra acris oculorum destillationes collyrijs mixtū, atque ex eo oculos vtiliter inūgi ipsos, idē testatur autor. Visum verò ipsum corroborare Auicē. admittit. Idē quoque & croci hīc adprobat vsum.

Curatio. Solani succus.

Morbus decimus sextus, Emphys-
sema oculi, quod Auicē. infla-
tionem oculi adpellitat.

Morbi de-
scriptio.

Graecorum veteres medici Emphyse-
ma definierunt excreſcentiā ciliōrū
tumori ſimilem. Marcellus verò inter-
pretatus eſt, incrementū eſſe tumori ſimi-
le, quod quidem nō aliter fiat, quā cum
oris ſpiritu aliquid impleatur, id nomen
rei indicare: nec huiusmodi fieri niſi in
oculo. Quē locum quomodo Manardus cul-
parit, cum q̄, iſtiusmodi nominis interpre-
tatione veriori, in morbo quarto ſuperius
declaratum eſt. Idē verò Marcellus, Gal.
in iſagoge ſua citat, docentē, emphysema
aliter fieri, cum ſcilicet repente oculus tu-
meſactus, maiore contraxerit pallorē &
inflammationem, plerunque & in ſeni-
bus, & æſtate fieri. Iſtiusmodi graecorum
medicis emphysemata, idem adſerit, non
inflationes eſſe ſimpliciter, ſed oculorum
tumores, qua ratione illi doceant factos,
ideoq̄

ideoq³ eos oculorum tumoribus similes esse
excrecentias dicamus. Manardus autem
hoc mali inter palpebrarum enumerat
adfectiones. Interdum enim laxo quodā,
& indoloroso tumore crescere, quod Pau-
lus ἐμφύσημα, Avicen. inflationem no-
minet. Alludit & hīc Rāzes capi. 11. De
puerorum morbis, inquiens, pueris accide-
re in oculis diuersas adfectiones, ex qui-
bus reperiatur inflatio, & clausura pal-
pebrarum.

Emphyse-
ma palpe-
brarum ad-
fectus.
Palpebra-
rum clau-
sura.

Accidere autē idem tradit autor, ex Causa.
quatuor potissimum causis, videlicet ex
flatibus, pituita nō crassa, tum ex redun-
dantia quadam aquea: postremo verò ex
quadam crassa, & melancholica. In pue-
ris autē contingere propter medicamenta
quædam adstrictoria, à mulierculis capi-
tibus eorum adposita, veluti est Cyprus,
quare capitum superfluitates ad oculos
protrudantur. Nimirū id vel ex fluxio-
ne materiæ calidæ vel gelidæ, ad istum

H 5

locum protrahere contingere.

Nota.

Quum verò à calore id eueniat, tunc ruborem in facie, seu oculis, & calorem in fronte adparere. Secus autem fieri, quum à frigore hoc contingat.

Curatio.
Glaucij
succus.

Curari autē hoc malum quòd à calore proveniat cū succo glaucij Razes persuadet, quòd refrigeradi vireis habere Dioscor. doceat, atque à principio in oculorum medicina hoc vtendū esse. Nos verò chelidony, foliorū rosarū singulorū drachmā vnam sumimus: croci, myrrhæ vtriusque drach. vnā cū dimidia, quibus cōtusis, cū aqua ex vitium racemis decisis manante, & lacte muliebri conficimus, oculis, & fronti omni die repetitū imponimus, donec oculi recludantur, & sanitati restituantur. Aduersus idē à frigore malum, myrrham, crocū, aloē, & rosarum folia vnā cum vino optimo maceramus, ocellisq; adponimus. Ambrā verò cum lacte mulieris infriatam, atque auribus pue-

ro

rum intromissam, nonnulli maximè comprobabant. Oculi autem puerorum, iuxta Auicen. curandi modum, cum lycio & lacte illinuntur. Illud enim quod buxæ spineæ succus esse dicitur, apud Diosco. adstringendi vim habet, atque exterit ea, quæ claritati oculorū officiunt, palpebrarūque scabies, prurigines, & diutinas sanat destillationes. Hoc autem oculis immulsum ophthalmiā curat, atque materias calidas ad oculos defluentes cōpescit. Iubet præterea post lycij administrationē oculos cū decocto camomillæ, & ocymi aquatici abluendos esse, quia hoc, Dioscor. teste, contra oculorum destillationes inungatur, sistatq; eas. Illa autem digerendo per halitum humorem sine attractione abigat, laxet, rarefaciat.

Curandi
modus auicennæ.
Lycium.

Morbus decimusseptimus, Strabismus, hoc est, aspectus obliquus, penes Auicenn. Strabositas.

si

Morbi de-
scriptio.

Strabismus est totius oculi adfectus ab
 Auicenna strabositas vocata, ab Aegina-
 eta autem strabismus, qui modo resolu-
 tionem, molliciemq; musculorum bulbum
 mouentium, modo conuulsionem sequitur.
 Atqui. Guil. Placen. eundē lib. 1. Chirur-
 giæ suæ adcidere adfectum, ait, ob incom-
 moda neruorum, musculorumq; oculos di-
 mouentium diuersis ex causis promouen-
 tium, ut oculi ad differentes se positionis
 parteis inclinent, scilicet dextram, sini-
 stram, superiorem, inferioremq;. Alij ve-
 rò dicunt visum tortum & obliquum ex
 transpositione crystalloidis, modo & to-
 tius oculi contingere, ut se ad latera, vel
 ad superna, vel ad inferna vergant. Ob
 quam causam fortē quatuor strabositatis
 Auicenna posuerat species: Primā ad supe-
 riores: secundam ad inferiores: tertiā &
 quartam ad utrasq; nariū parteis se de-
 torquentes.

Visus tor-
tus & ob-
liquus.

Strabosita-
tis quatuor
species auicennæ.

Causæ.

Liquet enim strabismum fieri omnē,
 vel

Vel ex musculorum bulbum mouentium
resolutione, mollicieq; vel ex eorum con-
uulsione. Et quanquam eiusmodi muscu-
los sub quatuor specierum nomine, aut re-
solui, aut mollificari, aut conuelli contin-
gat, vt nunc vel ad superiora, nunc ad in-
feriora, nunc ad vtraque narium detor-
queantur: attamen & plerunque strabis-
mum, nunc ex humiditate, nunc vero ex
siccitate fieri, vt in febribus acutis autorū
est sententia. Sic Galen. eundē adfectum
quandoque ex primo geneseos ortu, quan-
doque ab accidentario cucnire casu adse-
rit, vt in quibusdam adfectionibus capi-
tis iam deficientibus, vt sunt cephalalgia,
scotomia, vertigo. Ex recentioribus au-
tem Guil. Placen. hoc malum in pueris
accidere potissimum ait, ex humiditate
musculos, nervosq; bulbum mouentes ex
cerebro progredientes irrigante. Aut ex
siccitate, vt in febribus asperioribus. In-
terdum etiam in apoplexia, conuulsione,
epi

epilepsia contingere, sed repenti quum
convulsionis esse species quidem ducatur.
Strabismus præterea nonnunquam fieri,
aliqui tradiderunt, ex musculorum oculi
situ depravato, ita ut bulbus male orbi-
tae oculi insitus sit. Aut interdum ex obli-
quo aspectu in rem splendidam quan-
dam, aut picturam intento, visum detor-
quente.

Nota.

Huiusmodi autem distortionum ma-
la ex intuitu cuiusque facile deprehen-
duntur, nisi quod hic notandum sit, ut
de convulsionibus dictum est, hoc, quod
repente suboritur, ex humiditate qua-
dam provenire ratiocinandum esse: cum
totius etiam corporis humidi plenitudi-
ne, ut ex naribus, oculis, & palato hu-
miditates perstillent indefinenter qui-
dem, & in copia non parva, cum alui
duricie, quæ promptissima & eviden-
tissima ex eiusmodi causis orta esse argu-
menta Placentinus convicit. A siccita-

te

te Verò quæ fiant, lentiori gradu sub-
repere, & præcipuè post diuturnas ad-
fectiones. Ad hæc strabismi malum si
tam sursum, quàm deorsum detorqueat
oculum, tunc rem vnā tantummodo
inspectam, pro dupla, habere. Secus au-
tem fieri si dextrorsum, siue sinistror-
sum distortio fiat. Quæ Verò ex apople-
xia, conuulsione, aut post fortes ægritudi-
nes contingat, eam facilius per se inno-
tescere.

Ratificatū est apud medicos strabismū Prognosti-
ca.
infantum nō curari, nisi in infantia val-
de humida, & recens subortum.

Distortionum postremo oculorum à Curatio.
Strabones.
generatione ortorum, quas Græci *σπαλ-
τῆας* & *σπαλνομοὺς*, nos strabones di-
cimus, in infantibus correctionem fieri
Aegineta in hunc tradit modum, quem
& alij omnes, tam Arabes, quàm La-
tini obseruant morem, quum persona
ita capiti imponatur, ut à fronte re-
Curatio.
Aegineta.
cta

Curatio.
Aegineta.

Et asspiciant: strabismus enim conuulsi-
uam musculorum, qui bulbum moueant
adfectionem emendari, si lucerna è regio-
ne, non à latere adparente ponatur. Vbi
verò nare versum oculorum detorsio con-
tingat, floccos rubro colore suffusos oculorū
hircus circa tempora adglutinandos esse,
vt ad hos fixis luminibus intuentes, oculi
corrigantur.

Morbus decimus octauus, Las-
crymæ: oculi lacrymosi,
& lacrymantes
Plinio.

Homo ad
lacrymas
natus.

Quum inter cætera alia vniuersa
præter vnicū hominē, animalia
reperiatur nullum, quod tantum nudum,
teste Plinio, & in nuda humo, die natali
statim ad vagitus, & ploratum abijcia-
tur, nullumq; tot animalium ad lacry-
mas, & has protinus in vitæ principio
natum sit: non absurdum fieri visum est
(licet autores inter puerorum adfectus
eiusmo

eiusmodi lacrymarum mentionem faci-
 ant nullam) nonnihil, sed perfunctorie
 hic de lacrymis puerorum differere. Est equi-
 dem adfectus quidē Lacrymarū prater
 voluntatē exeuntium, cuius plerūq; causa
 est materia pituitosa in vijs oculorum con-
 tenta, partim ibi generata, partim verò
 cerebro ad ea loca transmissa. Hunc no-
 stri adfectum tantum lacrymas vocant.
 Plinius autem lacrymosos oculos, & la-
 crymantes nominat, de quo hic non libet
 fusius tractare, puerorum saltem lacry-
 mas, siue planctus, & ploratus hic respi-
 cientes. Fletus equidem puerorum modera-
 tus, & interpolatus iuxta Placentinum
 cap. i. suæ practicæ, ad aliquot tempus ante
 lactationē verò nequaquam oberit, imò
 viscera et cerebrū calfacit, pectus dilatat,
 recrementitiorū humorū in membris con-
 tentorum vacuationē promouet, spiritus,
 caloremq; natiūū corroborat. Si verò eius-
 modi esset fortis, copiosus, & non in-

Adfectio-
 nis descri-
 ptio.
 Causa.

Lacrymæ
 oculi lacry-
 mosi, &
 lacryman-
 tes.

Fletus pue-
 rorum con-
 ducibilis.

Lacrymæ
voluntarię
& inuolun-
tarię: illę
in pueris,
hę vero in
senibus.

terruptus herniam, & vmbilici promi-
nentiam facile concitaret. Copiosiores ta-
men in pueris, ex voluntate emissę lacry-
mę adparent, quàm in senibus, quum ab
illis maiores intus animę adfectiones con-
tineantur: tum quod a varijs prius non
aspectis in admirationem ducantur va-
riam. In his autem præter voluntatem fre-
quentiores conspiciantur lacrymę, quia
facultas concoctrix multum imbecillior in
senibus, quàm in pueris comperiatur.

Morbus Decimus nonus Ptis-
iosis: Auicennę Silac Ha-
liabati, Palpebrarum
casus.

Morbi de-
scriptio.

NON pauciora, inquit Manardus, pa-
pebris quàm oculis nocumenta con-
tingunt. Fieri enim cum extra modum
crassescant, cum rubore, & calore, pilo-
rumq; plerunque casu, πῖλωση Græci, si-
lac Auic. Haliabas, palpebrarum casum
vocat. Ptilosim præterea palpebrarum
quan

quandam esse in callum induratum crassiciem, rubentem, Paulus tradit, quam magnam ex parte capillorum defluuium comitetur.

Auicenna verò hoc malum esse crassiciem dicit palpebrarum, à crassa materia productam, & nitrosa, hoc est salsa, quare palpebrae rubescant, quorum etiam aliud sit recens: aliud inueteratum: in pueris autem ex fletu contractum. Aliqui verò ex salsa, & subtili materia euenire huiusmodi adfectum aestimant quam tamen diuersitatem ita nonnulli componunt, scilicet recentis adhuc mali materiam esse tenuem: inueterati autem crassam dijudicantes. Ea quæ præterea comparere ex mali istius symptomatibus videlicet pruritu vehementi in palpebris pungente: item & ruboris vehementia, quasi à materia acuta, & subtiliori cum bile rubea sanguini commista euenientibus. Seu ex crassitie palpebrarum, & interdum corrosione,

Causa.

Exulceratione quadam arida materiã crassam hîc inexistetẽ, arguẽtibus. Atqui nõnulli crassam, alij verò tenuiorẽ huius mali pro causa materiam vsurpantes.

Notæ.

Quotiescunque etiam crassities palpebrarum cum rubore, & corrosione lacrymalium, cum defluuio capillorum adpareret, ptilosim adesse, significauere.

Curatio.
Solani
succus.

In curatione istiusmodi adfectus Solani succum Auic. in loco de puerorum morbis administrat. Nam succum eius facere ad oculorum fistulas, quas Aegilopas vocent, cum panem positus Dioscorid. recenset. Cetera quæ ab eodem autore medicamenta, vt in lib. 3. fen. 3. Tract. 3. capi. 4. huic morbo conuenientia adducuntur, vt ex lentibus cum aqua rosarum decoctis, & portulaca, Endiuiia cum albo oui, item balnea, & alia, adultioribus præcepisse hæc, minimè puerulis intelligimus, alium quàm hunc expostulantia locum.

Mor

Morbus vicesimus Psorophthalmia iuxta Paulum: quam Auic. scabiem, & pruritus, Haliabas pruriginem vocat.

Inter palpebrarum adfectus Manar-
 Idus Psorophthalmiam enumerat quam
 esse scabiem pruriginosam ostendit ὁ
 ψοροφθαλμία à Paulo uocatam, quam Gal.
 ὁριῶντα ἐλέφαρα καὶ κρημῶδες καὶ νύξ
 nominet. Auic. verò scabiem, pruritus,
 Haliabas pruriginem. Ex Neotericis
 etiā sunt qui dicant eiusmodi scabiem in-
 fectionem esse cutis arenosam, qua fie-
 ri, ut palpebrarum extrema quasi mi-
 lio sint aspersa, videantur. Similiter &
 tumorem pruriginosum cum exulcera-
 tione modica, sed numerosa, cutis verò
 actionem impedientem. Ad hæc Pau-
 lus psorophthalmiam esse pruriginosam
 palpebrarum Psoriasis dicit, quam sca-
 biem, vel scabrum adpellemus, ex salso,
 nitrosoq; humore originem ducens. Cui

Morbi de-
 scriptio.
 Psoroph-
 thalmia.
 Scabies.
 pruriginos-
 a.
 Scabies.
 Pruritus.
 Prurigo.
 Infectio cu-
 tis areno-
 sa.

Tumor
pruriginosus.

quidem sententia alludit & Auicē.
non minus causam istiusmodi ex matu-

Causa.

Pforiacis

Palpebra-

rum pru-

iginosa.

salsa, nitrosa, & sanguine calido, aut
mido, aut alio humore acuto provenire
riginem, deinde autem scabiem adset.

Quod etiam eius interpretes adfirmat,
omnis scabiei, siue pruritus, humorem re-
tum, & sanguinem inflammatum, ita
& bilem atram, & pituitam salsem,
bilemque exassatam in causa esse,
ferentes.

Pforoph-
thalmia
species qua
tuor.

Poriò huiusmodi pforophthalmia c-
asperantur interdum intrinsecus, hoc est
in internis palpebrarum partibus, scali-
cie quadam suborta, cum rubore, & pi-
rigrine, & crassitudine, asperitateque pi-

1. Prurigo
Arabibus.

ca: quæ passio ab Arabibus prurigo
citur. Cuius verò Symptomata, ut sunt
pruritus, rubor, scabries, ubi int-

Trachoma
à Paulo.

duntur à Paulo τράχωμα, Celso autem
asperitudo adpellatur. Quod si verò as-
ritas in tantum crescat, ut tendi

atur, *ὀγκωσις* à Paulo, quasi *ficatio*,
 Et nomine à similitudine, quæ fit cum
 interiori parte intumuerint palpe-
 ra, excreseatque illic aliquid carni si-
 mile, ex quo oculus difficile moveatur.
 huiusmodi *ficosa*, & *aspera palpebra*
 Latinis nominatur. Fit enim in ea
 extensio rigida, quæ peruatit eò ut fis-
 suras obtineat. Ex qua quidem palpebra
 inuertuntur, quibus vniuersis, non aliter
 quam à sanguine rubent, asperiores, &
 carnosiores fiunt: & ut in fico exiguis
 quasi frumentis confpersæ. Quod malum si
 inueteratum fuerit, atq; collum obduxe-
 rit *τὸ λωὸς* adpellabitur. Propaliam est
 vniuersa hæc. *Luic. in cap. de scabie com-*
prehendere, quæ Habiabas species pruri-
ginis ponat.

2. Asperi-
 tudo à C. I.

so diciur,

quod à P.

Tracho-

ma.

3. Sycofis

à Paulo

palpebra

ficosa, &

aspera à la

tinis dici-

tur.

Ficatio.

Tylofis.

Ex humorū itaq; varietate corpori in-
 existentium specierum illarū differentiæ
 facillimè indagabantur. Nam vbi rubor

Notæ

palpebrarum, & caliditas adfuerit, sine prurigine euidenti, cum scabricie modica, sanguinis peccatum indicat. Cui si quando bilis admisceatur, pruritus tunc ardentior, & scabricies minor, color ad croceum vergens, cum scabricie tamen nonnihil eminente, adparebunt. Vbi verò bilis huiusmodi exassetur, sanguinem exuperans, non tam pruriginosum redditur malum, interdum etiam sine asperitudine, ob humoris illius delinquetur crassitudinem, locum adfectum non tam mordicus obludentem, sed nonnihil exhalantem, tantum post se relicta materia quadam squamulis furfuribusque persimili, quam si perfricueris in maiorem pruriginem incitabis. Quod nequaquam continget ubi eiusmodi materia pauca, & tenuis fuerit. Adparebit subinde humilior asperitas istiusmodi, & nonnihil albescent, & lata, ubi pituita salsa hic redundarit. Latæ enim minus

iuxta. Hip. decretum, & non admodum pruriunt pustulae.

Quare ex sanguinis, vel bilis cum san
guine delicto euenientia mala, multum
erunt salubriora, quàm ea quæ ex pitui-
ta, vel atra bili sanguini commista, sint
suborta. Hinc liquet, primæ speciei, &
recentem adhuc scabriciem, cæteris verò
paribus, non parum leuioris existere cu-
rationis. Secundæ verò, & tertiæ speciei
mala curari difficilius posse.

Prognostica.

Curationem autem huiusmodi malo-
rum in pueris contingentium Razes eo-
dem ferè modo fieri tradit, vt in cæteris
iuuenum adolescentiumq; ætatibus, nisi
quòd hîc mitioribus rem attrectandam
esse medicamentis iubeat. Quum autem
illorum malorum curatio in vniuersum,
vt in adultioribus corporibus, non sit ad-
modum facilis, eiusdem in pueris, tan-
quàm tenerioribus adhuc corporibus dif-
ficultatem haud dubiè persenties. Sic non

Curatio.

temere rem, nisi ab expertis, priusq̃ edo-
ctus, adgrediari. De quibus in alio lo-
co non hîc fusius tractare licebit. At-
tamen ficosas, asperasq̃ oculorum palpe-
bras ficorum folijs vtiliter fricari Diosc.
trahit. Itidem cum folijs paritariae, quam

Paritaria.
Elxine.

Chamo-
millæ vi-
res.

Aegilops
oculi fistu-
la.

Resinae fu-
ligines.

Elxinen. Gal. nominat, alijsq̃ huiusmo-
di extergendi experimentum docenti-
bus. Chamomillam præterea emplastrum
modo oculis impositam conferre dicitur,
fortè quòd partium sit tenuium, & di-
gerendi, laxandi, rarefaciendiq̃ vires
obtineat: aut fortè quòd tali modo admi-
nistrata, omnes oculorum fistulas, quas
Aegilops vocemus sanare à Diosc. signi-
ficetur. Aloën præterea oculorum scabies
& in oculis angulorum prurigines leni-
re idem ponit autor. Ad hæc alia quæ-
dam hîc breuitatis causa omittenda: in-
ter quæ sunt Resinae fuligines autorita-
te Dioscor. honestandis palpebris vti-
les, corrosis oculorum angulis palpebra-

rum

rum ex corruptione defluuijs & oculorum lacrymationibus.

Morbus x x i. Aurium dolor.

Aurium dolorem infantibus plerumque accidere, *Avicenna lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. ex flatibus, & humiditatibus insinuat. Ex flatibus, enim interpretatur, fieri, ob ipsius calorem, effervescente facientem humiditates crassas. Ex humiditate autem, propter exuperantes in cerebro humiditates. Alij vero hoc malum partim forinsecus excitari, tradunt, sicuti ex vento valido, & impetuoso, vel ex frigore, aut occasu, & id genus alijs. Partim vero ab intrinsecis, ut à temperamento malo cum materia coinquinato: aut præter cuiusmodi: aut ab alijs affectionibus instrumentis siue ab apostematibus, aut à loci uniti solutione. Quorum quidē notæ ex huiusmodi deprehenduntur indicijs, ut si à flatibus eveniat malum, hoc*

Morbi descriptio cum causis.

Nota.

an

auriū sonitas, sibili, murmura, tinnitusq;
 indicabūt, sine aliqua introrsum percepta
 grauedine. Vlcera verò intus existentia
 dolor pruriginosus significabit. Quum au-
 tem in imo, funditusq; inhereat dolor,
 absq; grauedine, vel lancinatione, tempe-
 ramenti malitiam in causa esse, euiden-
 tissimè demonstrabitur. Exempli gratia,
 Ut si frigidus iusto sit, à frigidioribus: si
 verò calidius, à calidioribus facilimè ob-
 ledi. Materiam autem auribus inesse, gra-
 uedo indicat. Siccitatem autem qui post
 vigilias, & in ediam oboriatur dolor, fa-
 cie, & oculis detumescentibus. Humidita-
 tem autem modo è contrario inuestigabi-
 mus. Verminosas autem aures indefinens
 commotio, cum vermium interdum exitu
 arguent. Atqui dolor iste qui ex aposte-
 mate calido, & in imo prouenerit, non-
 nunquàm phrenitidem importat, & sym-
 ptomata validè terrifica. Siquidem mul-
 tò lenior is est dolor, qui foris in partibus

Char

Aures ver-
 minosæ.

Prognos-
 tica.

Chartilaginosus ingruit: quum interior ille hominem subito enecet, & potissimum adulescentiores, rarius verò seniores, in septimo plerumque die terminans. In senioribus equidem hoc malum frequenter ad saniem, siue pus permutabitur, quam iuniores ante suppurationem plerumque interficit. Suppurationis autem argumenta sunt plausibilia. Decernunt itaque ex iam dictis nonnulli dolorem aurium in iuuenibus perniciosum esse: minus verò in pueris, tardiusculè autem in senibus. Quæcunque autem in modum criseos suboriuntur apostemata, ante concoctionis diem, atque in die minus cretica, cæteris non probè concurrentibus notis, adparentia: molesta sunt, & periculosa. salubriora verò ea, quæ post concoctionis notas, cum cæteris iustis indicijs suboriuntur apostemata. De his, & alijs, hîc non est vberius agendum, quum in præsentiarum mali ex flatibus, & humiditate prouen-

Suppurationes argumenta plausibilia.

nientis, tantum meminisse satis sit Aui-
cennæ autoritate, cuius curationem ex
eiusdem autoris præscripto, positis prius
ante curandi modum, aliquot canonibus,
notatu dignis perstringemus.

Canones
curandi me-
thodum in
hoc malo
præceden-
tes.

In primis itaque ante vsum ali-
quorum medicamentorum aures à sor-
dibus suis repurgentur: neque quicquam
notanter siue calidum, siue frigidum, sed
tantum tepidum intromittatur. Nullum
præterea medicamen in magna quanti-
tate, scilicet tantum vnica guttula, due
verò ad summū immittantur. Quod vbi
intromissum fuerit, super aure incolumi,
cui scilicet Medicina non fuerit commis-
sa, reclinato capite, aeger conquiescat. Me-
dicamen etiam hoc neq, secundo inijcia-
tur: nisi priori satis excusso, atq, ab aure
vniuersim detruso.

Curatio.

Deinde verò curationem mali ex
eiusmodi flatibus, & humiditatibus
orti: admoliendam esse Auicenn. cum
octo

octo medicamentis tradit, quæ prius con-
 tusa, & in oleo decocta, quo excolato
 manè, & vesperi, quatuor, aut quin-
 que guttæ auri indantur. E quorum nu-
 mero primum est linum, hoc est semen Primum
Lini semē.
Parotides
aurium.
 eius, doloris sedativum, quod etiam di-
 scutere quæ secundum aures abscesse-
 rint Dioscor. tradit: quod malum Græ-
 ci parotidas nominant. Secundum est Secundum
est Origa-
nus.
 Origanus, quæ incidendi, extenuan-
 di, calfaciendique facultatem possidet,
 quare dolori flatuoso perutilis. Hanc
 cum lacte auribus instillatam, earum
 lenire dolores Dioscorid. docet. Hinc ma-
 cer, auribus infusus sedat cum lacte do-
 lorem succum hinc eius intelligens. Ter- Tertium
est sal.
 tium est sal, quod exterit, repurgat,
 dissipat, reprimit, extenuat, & vili-
 ter in dolorem aurium imponitur ex
 aceto, more scilicet emplastri adpositum.
 Quartum est saccharum, quod aperit, ex- Quartum
est Saccha-
rum.
 terit, & mundat. Sacchar enim, inquit

Gale

Mellis
vſus cōtra
incertos au-
rium ſono-
res & do-
lores.

Quintum
eſt Lens.
Sextum eſt
Myrrha.

Septimum
Colocyn-
this.

Galenus, mellis eſt ſpecies, adſimiles ei vi-
reis obtinens, quod eſt abſtergere, deſic-
care, & digerere. Quare mellis vſum,
contra incertos aurium ſonores, doloresq̃,
cum trito foſſili ſale tepidum ſtillatum
Dioſcori. commendat. Quintum eſt Lens,
fortè quòd medium teneat caliditatis, &
frigiditatum, & deſiccet in ordine ſecun-
do. Hanc cruſtos erumpere, & vlcera re-
purgare, Dioſcorides innuit. Sunt qui ve-
lint hanc maturare, & exterere, ſed de-
biliter quidem. Sextum eſt Myrrha, cui
adeſt, teſte Galeno, abſtergendi potentia,
cum excalfaciendi, deſiccandi q̃, purulen-
tas aures ſanare Dioſcorides ſcribit, atq̃
inflammatas, cum caſtorio, opio, & glau-
cio atque præterea aures contuſas. Septi-
mum eſt Colocyntidis ſemen, fortè quòd
ob eius caliditatem, & ſiccitatem re-
ſoluat, & incīdat, & à remotioribus
pertrahat locis. Aut fortè Colocyntis,
hac eſt, cucurbitæ intelligendum eſſet,
cuius

cuius ramentorum succum ad aurium dolores cum phlegmone iniunctos cum rosaceo utilem esse Galen. posuit. Octauum est Cedri genera, quæ Dioscor. dicit aurium vermes cū aceto instillata enecare.

Octauum
Cedri genera.

Quum verò auris dolorem ex calida intemperaturæ causa ortum persentiamus, guttam vnam olei rosacei cum lacte muliebri, & opij modicum instillabimus.

Dolori ex
intemperie
calido.

In flatuoso autem dolore, ex myrrha, spica nardi, cymini, anisi, atque olei chamæmillini decocto, guttā vnā inycimus.

Dolori flatuoso.

Morbus vicesimus secundus, Aurium umiditates: interdum sanguinis instar, aut puris adparentes: nonnunquam vermiculi ex auribus exeuntes, vnde aures verminosæ adpellantur.

Auribus infantium nonnunquam accidere fluxus humorum, Auiçē. lib. I.

Morbi descriptio.

K

Sanguis,
pus, vermi-
culi, ex au-
ribus.

Aures ver-
minosae.

Fen. 3. Doct. 1. capit. 3. adserit. Exit enim:
ait *Manardus epistol. Medicinal. lib. 7.*
Episto. 2. ex aure modo sanguis, modo pus,
modo vermiculi, αἷμα τὸ μὲν αὐτὰ πρῶτον
Paulus, πυορροὺν αὐτὴν secundū, ut Galenus:
ἰχθῦροὺν αὐτὴν Dioscor. tertium σκωληκί-
δὺν αὐτὴν vocet. Hoc vltimum autē Latini au-
res verminosas adpellent. Eiusmodi au-
rium malū in aetatibus contingere paruis,
et nuper natis puerilis etiam Hippocra-
tes lib. 3. Aph. 24. recēsit. Quē Ga-
lenus rectē adserit aurium humiditates
morbis adnumerasse, si quidem à natura
omnino alienā esse, quā per aures fiat ex-
purgationē. Eam verò quā fiat per pala-
tum, et nares naturā cōuenire, quā cere-
bri superfluitates expurget: id quod etiam in
atate iam perfectis euenire. Quum autem
infantibus per aures etiam cerebrum ex-
purgetur, rectē quidē inter proprias huius
etatis passiones, etiam aurium humidi-
tates Hippocratem posuisse.

Ma

Manifestum prætereà esse idem Gale. ^{Causæ.}
 conuincit, totum corpus in nouiter natis
 puerulis maximè humidū esse, ad cō quod
 & ossium natura in ipsis potius cerea,
 quàm lapidea videatur. Præ cæteris ve-
 rò partibus cerebrum humidum existe-
 re, ut quod etiam in perfectis talem ha-
 beat intemperaturam. Ob quam rem non
 absque ratione in foramina eis, super-
 fluitatibus abundantibus, per omnia ex-
 cerni.

Notarum Verò indicia unicuique ex ^{Notæ.}
 intuitu satis superq; innotescunt.

Curationem autem illarum humidita ^{Auriculae}
 tum Razes cum auriculario specillo (eius- ^{ria specillo}
 modi enim ^{la.} ~~ἰσχυρὰ~~ à Galeno dicun-
 tur) bombice, siue lana mollissima obuc-
 luto admolitur: quo humiditas huiusce-
 modi extrahatur, & exteratur, sæpiusq;
 repetendo, donec ad viuum resecetur.

Auicenna verò medicamentis mun- ^{Auicennæ}
 dificantibus, exterentibus, & exiccan- ^{cure.}

tibus aures curam adoretur, videlicet lanam, vel bombices in melle cum vino styptico, & pauco aluminis, aut croci, aut pauco nitri intinctas, auribus infundit.

Compositio
recitatio
rum Medi-
corum.

Aurifusoria
specillo.
Mellis vi-
res.

Crocus.

Notio cir-
ca aurium

Quem recentiores Medici imitati, in hunc modum tali vtuntur medicamento. Accipiunt enim mellis, & vini singulorum vnciam vnam, aluminis cōtriti, vel croci, vel nitri æquē drachmam vnam, quibus simul ebullitis, eorumq; decocto lanā aurifusorio specillo inuolutam, auribus imponunt. Mel enim cum vino mundificat, exiccat: quod alumen, & nitrum fortius agunt. Crocus verò maturat, mollit, & ex terit: auriumq; remedijs vtilissimum est apud Dioscoridē medicamentum. Quare nonnulli croci drachmam vnā in vini styptici vncijs duabus mediocriter calidi, infusi, ex quo lanam intinctam auribus intrudunt.

Atqui aurium humiditates quum cerebri sint expurgationes, visum est
non

nonnullis, has minimè in suo deflexu im- expurga-
 pediendas, nisi ob earum diuturnam flu- tiones no-
 xionem, exulcerationē, siue obturationem tanda.
 minitantē: tunc forinsecus saltē capiti ad-
 plicanda esse, quæ tenuiter exiccent. Ve-
 luti milium torridū sacculi more adposi-
 tum: aut alia quædam aures à sordibus
 suis repurgantia. Sit autem omne quod
 auribus adhibetur mediocriter calidum.

Nonnulli porro ex Ruffo citant, se pue- Historia
 rum vidisse ex cuius aure humiditas ex Ruffe
 exierit, quam non potuerit esse sanguinē mirabilis.
 æstimari, sed veram fuisse alimenti su-
 perfluitatem: quare noctu vsque ad ma-
 tutinum tempus eiuscemodi ablaetandū
 esse puerum, quo factō hasce humiditates
 extirpari.

Vbi verò sanie ex auribus proflue- Saniei au-
 re conspexerimus, oleum de Cannabe sa- rium cura-
 tina, siue succus eius vtiliter instillatur. tio.
 Similiter oleum Irinū cū aceto: & tere- Oleum de
 byntho, siue resina cum melle: hanc enim Cannabe
 sativa.

contra sanie[m] destillantes iuuare aures

Diosc. docet. Itidē oleum amygdal. ama-

rarum, & myrrha cū vino. Idētidē ab-

Abinthij

succus cum

melle.

Stupefaciē

tibus quan

do & quo-

modo hic

fit vtendū.

Papaueris

succus,

opium.

synthy pręstat succus cū melle: hoc enim

cum melle addito nitro destillatibus au-

ribus vtiliter inungi Dioscorides tradit.

Sed violentius dolore saniente, obtundē-

tibus, & stupefaciētibus sensus medica-

mentis vtendū esse, quidā concessere: ve-

luti est papaueris succus (quod opiū dici-

tur) in dosi parua, cum lacte muliebri, aut

cum melle: aut oui candido, iuxta Pauli

sentētiā, aut vino dulci, passō ve omnia

tepidē instillanda. Mutuata sunt hæc ex

Galeno de cōpositione pharmacorū secun-

dum locos libro tertio, capite primo, dicen-

Galeni ver

ba.

tis: Cogente verò dolore, necessariū est etiā

his, quę sensum stupefaciūt vti, quemad-

modum etiā in his qui colum, aut renes,

aut quamcunque tandē partē affecti, ve-

hementi dolore adfliguntur, facere con-

sueuimus. Miscetur autem opium mulie-

bri

lacti, & oui candido, quæ ipsa & per
se sæpe aurium inflammationibus profue-
re. Miscetur, & castoreo opium, & cate-
ra quæ in ipso licet autore intueri.

Morbus vicesimus tertius aus-
rium purulētia, quam Raz-
zes venenum appellat.

Venenum fluidum ex auriculis pue-
rorum, vel infantium profluere, ex
vesica, vel plaga accidente in auricula
Razis, capi. 10. De puerorum adfectibus
libro recitat.

Morbi des-
criptio.

Curationi autem eius sufficere, mel
ebullitum tepidum instillatū cum aqua,
hoc enim expurgare venenum ab auri-
bus. Siue accipienda esse folia myrti, quo-
rum succum contra purulētas aures instil-
lare Dioscor. docet, aut gallas aceto in-
friandas, & more consueto infundenda
hec sint.

Curatio.

Morbus vicesimus quartus
sternutamentum.

K 4

Mali de-
scriptio.

Quemadmodum Tussis iuxta Gale-
num casus quidam naturalis est,
ad expurgandas eas, quæ sunt in pulmo-
ne asperas arterias, sic sternutamentum
manifestè videtur narium expurgare
meatus. Nanque id expellendo ea quæ in
naribus retenta sint, quæ & ipsæ a natu-
ra inuenta sint, ut respirationis meatus
essent. Quia spiritus in ipso admodum ve-
hementer motus, ipsarum meatus tibi-
num more, tibiae, fistulasq; purgantium
expurget.

Causæ. Sternutamēta verò validiorē, quā
tussis habere spiritus impetum Gal. lib. 5.
De symptomatum causis cōmostrat: atque
aliā generationis habere causam, quā
tusses. Quippè ea, non ab ea, quæ asperis
arterijs, sed naribus molestæ sint cū spi-
ritu violenter emisso euenire: cum quo etiā
ex prioribus cerebri ventriculis nonni-
hil emittatur. Proinde verò Tusses capi-
ti nihil conducere: sternutamenta verò

Tussis, &
sternuta-
menti dif-
ferentiæ.

ma

maximè, & potissimum vaporibus op-
 pleto, nisi ob destillationem eucenerint. Tusses ca-
piti nihi
cōducunt
sternuta-
menta ve-
rò maxi-
mè.
 Neque admiratione dignū esse spiritum
 vñico impetu, & ex capite, & ex pul-
 mone emitti. Quum igitur insurgāt ster-
 nutamenta, vtroque tunc vtantur expi-
 rationis meatu: vt ea quæ per nares mo-
 lestant, expellāt: altero scilicet quē ipsum
 per se fecerit, altero verò nervis, veluti
 longis quibusdam manibus in thoracem
 demissis. Per hos enim illū contrahat, per Ossa eth-
moidea.
 ossa verò quæ ethmoidea adpellentur, a
 percolandi officio: ipsum vaporantē emit-
 tat spiritum. Vniuersa hæc per Hippocra-
 Aphor. lib. 7. capitu. 52. confirmantur di-
 cta: qui recitat, sternutamentum fieri ex
 capite, calefacto cerebro, aut humectato
 eo, quod in capite inani. Aërem etiam
 intus contentum extra erumpere. Sona-
 re autem quoniam per angustum ipsi sit
 exitus. Cuius quidem Hippocratis verba
 Galenus in hunc interpretatur modum.

K 5

Consentaneum equidē esse, sternutamentum ex capite eueniens fieri cerebro calefacto, vel humectato in capite inani, sed non necessum esse, vt omne sternutamentum istiusmodi proueniat causis. Fieri enim vt interdum pennis nares irritantes sternutent. Quum enim & cum tussi spiritus desubter veniens ad naris meatus, sternutamenti causa sit. Atqui nec aërem solū ex capite excretum esse quod sonet, idem testatur autor. Liquido enim adparere, ipse adserit, desubter ex pulmone aërem elatum vniuersum se cōprimēte thorace. Sed antecedente inspiratione fieri sternutamentū, natura adgregante aëris copiam, ad sternutamenti copiam, superioribus, quæ dicta sint adstipulari. Solum itaque illud quod habeat suæ generationis principium naturam adpetentē flatuosum ex capite spiritum excernere. Si enim & aliquis in capite humor superabundet, non facere sternutamentum nisi

nisi in Ventum conuertatur. Hoc autem manifestè videri in multis, qui humoris copiam per nares excernant, non tamen ex necessitate sternutent. Solos autem illos sternutare, scilicet ita adfectos, quibus ea humiditas, quæ à capite fluat mordax sit, veluti si quid mordax naribus imponatur. Quemadmodum enim, ut superius ostensum est. Tussis quidem casus naturalis sit, ad expurgandas eas quæ sint in pulmone asperas arterias: ita sternutamentum manifestè videatur narium expurgare meatus. Et id quidem fieri duplici existente ipsa perforatione: lata quidem ad os, per meatus verò tenuiores ad cerebrum: quæ quidem ad os sit perforatio, ab eo qui desubter spiritu efferatur: qui verò ad cerebrum meatus pertingant, ab illis, qui ab ipso prodeat, expurgari. Ex quibus ratiocinandum esse, sternutamenta ex capite motus habentia caput leua-

Tussis sternutamentum -
tiq; differe-
rentiæ.
Sternutamenti ex
duplici perforatione
rationes.

re.

Hippocra-
zis sensus.

re. Ex rarefactis enim ijs quæ in capite sunt humoribus fieri, & naturæ impetus excretis. Rarefieri enim ipsis calefactis: calefieri autem natiuo calore excitato, ob cuius imbecillitatem superfluitates prius erant adgregatæ. Hinc Hippocra. calefacto eo, quod est in capite inani, intelligere de eo, quod sit in Vetriculis cerebri, atque etiam de eo quod ipsum ambiat exterius. Nam facile quidem esse, & illi per cerebrum primum scilicet ad ipsos Ventriculos: hinc verò nares subire. Quum verò vniuersum accidat sonitum edere. Commune enim hoc esse vndecunque veniat, siue ex pulmone elatus, siue ex capite deorsum actus. Hæc fermè Galeni super huiusmodi re sunt verba.

Notæ.
Prognostica.

Sternutamenta salubria.

Notæ satis sunt ex se manifestæ. Sternutamenta omnia in morbum inclinatio-
ne sunt salubria, etiã in ægritudine perniciosissima. Facultatum enim robur, & conualescentiã, materia delinquentis pe-

mm

nuriam denotat. Itaque sternutatio citra
 destillationem, in corpore minimè infar-
 cto, siue à natura, siue ab artificio produ-
 cta sit, capitis dolorem abigit, & mūdāt,
 qua ratione & pectoris adfectionibus
 succurrit: similiter & stomachi, & vte-
 ri, in morborum cū inclinatione, & cor-
 pore prius exinanito. Exitiosa autem est Infalu-
bria.
 ista, quæ cū destillatione procumbit, cau-
 sam enim malam caput obledentē præ-
 nunciat, capitisq; oppletionē, quam facile
 vertigo & scotomia comitantur, & id
 genus alia. Morituri nequaquàm sternu- Morituri
minimè
sternutāt.
 tant, autoritate Auicennæ: hinc mulier-
 culæ nostrates, sternutantes non tam citò
 morituros prognosticantur.

Quum verò sternutamenta malè quā- Curatio.
 doque officiāt, & infantes adhuc pertur-
 bent, nāque caput impleāt, & apostema-
 ta cum alijs adhuc malis inferant. Razes,
 tum alij autores refrigerantia, & anody-
 na, & digerentia adhibere cōsulant: ve-
 luti

Sternuta-
menta ex
apostema-
te cerebri
euenientia
ipsum di-
stendunt,
instimu-
lantq̃.

luti sunt portulacæ folia, & cucurbitæ
rasura cum oleo rosaceo, & hordei fari-
na. Aut caput cum oui luteo, & oleo per-
ungatur. Euidens enim est sternutamen-
ta ex apostemate alicuius partium cere-
bri euenientia, cerebrum ipsum disten-
dere & instimulare, ratione materiæ
indidem efferuescentis & vaporibus ce-
rebrum opplentis, quos ipsum expellere
moliens seipsum comprimit, sternutatio-
nemq̃ incitat. Quam ob rem frigorisca
superius etiam in primo morbo recitata
hîc maximè sunt profutura: scilicet dige-
rentia, dolorem sedantia, & inquietu-
dinem supprimentia. Quare mali & po-
lentæ odorem hîc conuenire Paulus indi-
cat, obtundere enim sternutationum eru-

Circa ocy-
mi admini-
strationem
inter Aui.
& Diosco.
controuer-
sia & reco-
ciliatio.

ptionem. Atqui Auicenna in sternuta-
mento puerorum frequenti Ocymon tri-
tum naribus eorum insufflandum præci-
pit, sententiæ cuius ex aduerso Dioscori-
dis reluctatur mens, volentis ex olfactu

per

per nares attractum ocymon, copiosa excitare sternutamenta. Quorum differentes sententias nonnulli ita componunt. in calido, & raro cerebro ocymon solo odore suo sternutationem ciere: attamen id ipsum tritum, & naribus intrusum ipsam tunc reserare, aperire, & despilare, ut ipsi vocant, ossa ethmoidea adpellata. Siquidem eiusmodi modis sternutatione sopiri ex humiditatibus obstruentibus has videlicet partes, & eas vellitantes, quas demum natura excutere cum sternutamento admoliatur.

Et si sternutationem temperatam cerebro ad humiditates superfluas proijciendas nonnulli adprobant. Copiosam autem & praesertim in pueris adhuc tanquam nociuam condemnant, quod supra modum ipsos concutiat, & capita eorum inflammet, venas interdum atque arterias cerebri rescindat, suoque impetu materias plurimas ad pectus

Sternutatio quae non ceat siue proficua sit.

Oleum de
salicibus.

excutiat. Occurrendum itaque illis, & succurrendum esse medici persuadet: precipue Verò cum rosarum, & de salicibus oleis, nanque sternutamenta cohibere, pro certissimo traditur. Inhibere præterea atque compescere irruentē sternutationē, sorbitionem calidā, aut capitis irrorationem, siue balneationem cū aqua, & infusione oleorum calidorū in Vtrasq; aures Auicenna docet. Paulum proculdubio in huiusmodi remedijs imitatus, conducere hīc affirmantem, frictionē nariū, frontium, oculorum, oscitationē, palati frictionem accuratam, eructuationem, illorum contentionem, capitis sublimitatem, in latus conuersionem, extremorum musculorum, palpitationem, masticatoriorum, si sic dicere liceat, pinguedinem, calidi olei in aures infusionem, aduenientis caloris materiam. Obseruare præterea admonet repentinam ē somno excitationem, fumum, puluerem, odoramenta acutio

tiora. Inanium etiam spongiarum marin-
narum hic commendat odorem.

Nonnulli verò sternutamenta ex aposte-
mate euenientia ex oleo rosarū, & lacte
muliebricū aceti modico persanant. Ex
destillatione calida accidentibus fronti,
et temporibus rosas, & sandalos cum san-
guine draconis, & aqua rosacea admo-
uent.

Ab aposte-
mate.

A destilla-
tione cali-
da.

A destilla-
tione frigi-
da.

Ex gelidiori autem destillatione pro-
uenientibus, mastichē, thus, myrham, an-
teriori parti capitis adplicant, ob illius lo-
ci raritatem, qua pueri facillimè destilla-
tiones incurrunt.

Morbus vicesimus quintus, Rime
vel scissa, vel fissa, vel scissuræ labio-
rum, quas Græci γάρδαγ, Auicenna
fissuras nominat.

INter vlcera quoque enumerari ma-
la, quæ Græci γάρδαγ, vel γάρδαγα.
Auicenna fissuras, Latini rimas, vel
scissa, vel fissa nomenclant Manardus epist.

Morbi de-
scriptio.

Rhagades
fissura. Ri
ma scissa,
fissa. scissu
re labiorū.

Diuisiones
fissiones.

Cause.

Rhagades
Græcis à
frangendo
dicuntur.

Medicinalium libr. 7. Epistola secunda
meminit. Est autem cutis scissura cum
callosis labris, eiusmodi malum non in
vna tantum corporis parte sentitur, ve-
rum etiam in mulierum naturalibus, &
vtriusq; sexus sede, labris, digitis pedi-
busq;. Itaq; autoritate Galeni in suis defi-
nitionibus, nulla corporis in quo fiat de-
creta parte, diuisiones, siue scissiones dice-
re malis, cutis callosis labris Rhagades es-
se dicitur.

Fieri porrò & in labris, cunctisq; &
his partibus, Plinius tradidit, verum ex
diuersis causis, itinere, frigore, alijsq; mul-
tis, id tamen pro comperto habere, qua-
cunq; corporis parte in duo, vel plura de-
hiscat cutis labra, Græcos Rhagadas à
frangendo, Latinos rimas id malū adpel-
lare. Nostri verò Medici in vtriusq; contin-
gere labris hoc malum conuincunt, siue
in superiori, siue inferiori, quādoq; in am-
bobus: potissimum tamen post coryzam,
siue

siue catharrū euenire, Mesue ait, diffluentibus his ad ea loca, ut deinde nares, & labra cū roboris nota tumescāt, & inscindantur, exasperentur. Ex humiditatibus equidem acutis labra cōpungētibus, mordicantibus, exulcerantibusq; id malum aliquando prouenire dubium est nullum. Humiditates enim huiusmodi interdū vel ex capite destillant, aut ex stomacho ascendunt, aut à toto corpore corruant, aut interdum per modum criseos adcidunt.

Notæ eius sunt apertæ. Inter quas tamen hoc potissimum considerandum, quòd si rimæ, vel pustulæ, aut vlcera in tertianis, aut alijs conspiciantur febribus, concoctione præeunte, signum esse laudabile, ideo quòd natura fortior reddita, huiusmodi superfluitates ad labra, tanquam viliora quorum caro est tenera, protrudat membra. Secus autem esset, si eiusmodi in lingua conspicerentur rimæ, tanquam in membro nobi-

Notæ.
Prognostica.

Rimæ in lingua.

liori, quod magis ex vi symptomatis aliquius mali, quam ex natura fortitudine videretur accidere.

Curatio. In curatione verò istiusmodi mali medicamentis arescietibus, et adstrictorijs, cum quadam lenificatione indigebimus.

A causa calida. Sic rimis labrorum à causa extrinseca & calida euenientibus, adipem gallinaceum cum oleo rosaceo, & violarum administrabimus. Similiter & tragacanthæ succum, quem vulgus mustillaginem vocat, in aqua rosacea dilutum.

A causa gelida. Ex frigida autem accidentibus, mel rosaceum, tragacantham, gummi arabicum, mastichem, thus, in aqua rosacea confriata propinamus.

A causis intransiis. A causis verò intrinsecis erupentibus rimis huiusmodi medicamentis succurrimus, accipientes cerussæ lotæ, amyli, cadmiæ lotæ, lithargyri singulis ad placitum, et cum tragacanthæ succo, siue mustillagine coccinamus. Vel tragacanthæ, gummi arabici dicti æquè.

æquè in aqua rosacea intinctorum capi-
mus, cū cerussæ lotæ, et lithargyri, & opij
quibus contritis cum lacte muliebri, vel
caprino rimosas partis illinimus. Oleū præ-
terea rosaceum cum succo plantaginis mi-
stum in presenti casu ab aliquibus valde
commēdatur. Sic & violarū oleū cum adi-
pe caprino, anserino, gallinaceo, anatino.

Euenit interdum vt infantium labra ex
mamillarum nutricis duricie, vel calo-
re, scissuræ incidant, quas facile cum lana,
succo plantaginis minoris, & butyro, &
adipe gallinaceo recēti inuoluta, & rimis
indita percurabimus.

Scissuræ ex
māillarū
nutricis du-
ritie, vel ca-
lore.
Adfectio-
nis descri-
ptio.
Dēitionis
sympto-
mata.

Morbus vicesimus sextus dentitio
siue dentium productio.

Circa mensem ferè septimum, inquit
Paulus lib. 1. De tuēda sanitate ca. 9.
Pueris dentes plerunq; proueniunt, atq;
prorumpunt, quo quidem tempore gingi-
uarum maxillarū, tendinumq; phlegmo-

Dentitio.

Dentitio
tarda, ver-
nalis, hye-
malis, atti-
na.Dentitionis
sympto-
mata.

Curatio.

nes quod est inflammationes nō raro etiam
nervorum cōuulsiones infestant. Solent &
alia pueris dentientibus plerunq; accidere
mala, quorum quidem in scholijs nostris
in Aeginetā consarcinatis mentionē feci-
mus. Razes ex Galeni autoritate citat, de
rititionē citam esse leuiorē, minusq; dolori-
ficā esse huius productionē et imbecilliorē.

Tardam verò duriorē, robustiorēq; pro-
ductionis, vehementiusq; dolentis. Verna-
lem verò velociorem esse, & dolore caren-
tem. Hyemalem autē fieri modo è contra-
rio, siue gingivarū consummatione. Aesti-
ue verò doloris parū adesse. Hoc tēpore sci-
licet dentitionis potissimum accidere gin-
giuarū, maxillarumq; apostemata, & au-
rium pruritus, sanguinoletasq; fluxiones,
febres, & diarrhœam, hoc est, alui fluo-
rem, siue eiusdem adstrictionem.

Istiusmodi symptomatum, eorumq; cu-
rationibus Aegineta in si o de tuenda
valetudine lib. meminit: admonēs etiam,

ut

Ut tunc temporis puero neque quicquam quod multo, aut difficili conatu comman-ducandum sit exhibeatur, sed gingivæ digitis à balneo assidua quadam fricatione palpentur, gallinaceorumq; adipe, aut leporino cerebro emollientur. Vbi verò dentes iam emicuerint, atq; profilierint, lanam delicatescentem, atq; sincerā ceruici, capiti, & maxillis adplicandā. Tum verò embrocā hanc ex oleo dulci, ac calida fouendam, auditorijsq; meatibus id instillandum. Eo etiā tempore infans vberiori nutriendus sit victu, nec non aqua calida lauandus.

Ex Neoterics autē sunt, qui in den-
tium productione gingivas omni die bis
cum butyro perungunt, atq; gingivas
cum hordei grano interdum perfricant
pro leuiori dentium eruptione. In eius-
modi etiam casu aliqui mel infantibus
ministrant, quò ora eorum pala-
tum scilicet, gingivas, & linguam per-

Neoterico-
rum vsus.

Cerebrum
leporinū.

ungunt addendo nonnihil thuris, & gly
cyrrhizæ. Porro cerebrū leporis attritum,
& esum vtile esse Galenus se didicisse fa
tetur lib. 11. De simpli. medic. facul. pueris
dentientibus, capite videlicet toto elixo,
vt & ipse facere soleat. Nō enim minimā
ei vim inesse, sed similē melli, & butyro,
& alijs quæ ad pueros dentientes conue
niant. Quē fortē Auic. imitatus, cerebrum
leporis post decoctionem de capite extra
ctum cū cypro, & butyro, & oleo de lilio
dentientibus puerulis conuenire tradit.
Iac caninū in præsenti casu multum à sua
proprietae conducere Auic. asseuerat.

Dolori in
tollerabili
ex dentiū
productio
ne.
Butyrum.

In dolore autem immenso & intollera
bili quidam gingiuas inungunt cum suc
co solani, tanquā narcotico medicamēto, et
cum oleo rosaceo calefacto. Butyrum por
rò cum melle mixtum quibus carnes ad
natæ, hoc est, gingiua perfricata, opti
mè in dentium productione autoritate
Gale. conducit, tum etiam quòd dolorem

&

& erosionem maximè abigat. Eadem
& de canis lacte dentibus admoto ab ali
quibus feruntur.

Morbus vicesimus septimus, Gins
giuarum maxillarum, tendinum &
phlegmones, quas Paulus parulis
des vocat.

Symptomatum dentièbus accidentium Morbi de-
scriptio.
Sin superioribus Pauli autoritate men-
tionem fecimus, quæ proculdubio ex Hip.
Galenique monumentis decerpta sunt. ille
enim Aph. lib. 3. Ap. 25. adserit.

In progressu cum iam dentire inci-
pant, oriri tunc gingiuarum prurigines,
febres, conuulsiones, alui profluvia, & ma-
ximè cum caninos edant dentes, & ijs
præcipuè pueris qui sint crassissimi, &
aluos habeant duros. Hic autem, Gale-
nus videlicet, ait, liquere quod perforatis
gingiuis à dentibus prodeuntibus, huius-
modi casus eueniunt, quemadmodum ubi
stimulus infigatur carni, & sanè plus

Causa.

Notæ.
Parulis.

Epulis.

Tubercula
iuxta den-
tes.

Curatio.

dentes adfligāt quā stimuli. Hi enim se-
mel firmati, in mēbro quiescant, cui semel
ab initio sint infixi: dentes verò semp pro-
cedere, & tantum, quātū augeātur. Ac-
cidūt autē istiusmodi in puerulis facillimè
& præsertim in crassissimis, & aluos du-
ras habentibus, propter eorum corporum
plenitudinem, & superfluitatum redun-
dantiam. Quorum indicia ex intuitu
sunt liquida & manifesta. Est enim paru-
lis, ut Paulus recitat, inflammatio circa,
partem aliquam gingivarū, quæ nō solu-
ta, suppuretur. Differt autē ab epulide, sci-
licet supercrescēte ex inflammatione car-
ne. Celsus lib 6. cap. 13. iuxta dentes in gin-
giuis tubercula quædam oriri docet dolen-
tia, quæ παρῳδῖδας Græci adpellent. Quan-
quam in quibusdam eius exemplaribus
παρωτῖδας, sed falsò legitur.

Curatio verò in hunc observatur mo-
dum, ex Avicenn. præscripto, ut pue-
ruli lingua digito molliter comprimatur:

dein

deinde autem oleis ut chamamelino, & melle: aut melle & resina terebinthina confricetur, atque caput aqua multa prius calida abluatur, ex decocto verò chamamila & anethi. Quem quidem curandi modum nonnulli in quinq; administrandorū medicamentorum digerunt partes.

Curatio
nis partes
quinq;

Prima est ut gingivæ inflatæ cum digitis leuiter attrectentur, quò ab eis humiditatum tumores indefinenti compressu amoliantur & discutiantur. Secunda ut

Prima.

Secunda.

eiuscemodi gingivæ tumida ex oleis & pinguedinibus in puerorū dentitione recitatis molliter perfricentur, veluti sunt leporis cerebrum & adeps gallinaceus, sumēdo vniuscuiuslibet drac. vna quæ simul in mortario contusa, & in formam vnguenti redacta, quo calefacto gingivæ demum cum panno molli, aut digitis perfricentur. Tertia, ut gingivæ, tendinesq; cum melle, & oleo chamamelino commistis, confricentur. Mel enim ex terit, exiccat,

Tertia.

Mel,

& hu

& humores delinquentes extergit, cum oleum chamæmelinum dolorem sedet.

Quarta. Quarta, ut cū melle & resina terebinthina

Resina.

simul sub æquali pondere sumptis gingivæ perfricentur. Resina enim istiusmodi calefacit, mollit, & disijcit collectiones omnes, repurgat, teste Dioscoride.

Quinta.

Quinta, ut fiant embrochæ, siue effusiones aquæ calidæ ex decocto chamomillæ

Embrochæ
descriptio.

& anethi. Accipiuntur enim florum chamomælinorum & anethi cuiuslibet manipulus unus, & in aqua fluminis, siue fontana, feruere vnico coquantur, in duarum librarum pondere: ex quo decocto infantis capiti, manè, & stomacho ieiuno, et calidè infunditur. Constat enim eiusmodi embrocham cerebri superfluitates per cranei suturas exterere, & à loco adfecto diuertere, cerebrumq; ipsum corroborare.

Morbi vicesimus octauus, & vicesimus nonus Gingivarum pruritus,

tus, qui ὀδασμοῖς à Dioscoride dicitur: & Gingivarum caro superflua ἐπὶ ὀδῶν à Paulo vocata, à Raze autem Vesica.

IN gingivarum morbis considerandum Adfectuū
descriptio.
est, Pruritus tantummodo festinantibus ad eruptionem dentibus infestare parvulum, qui à Diosco. ὀδασμοῖς dicatur. ὀδασμοῖς.
ὀδοντίασις.
quum ὀδοντίασις. solum ipsa dentitio prorumpentibus dentibus vocetur. Hinc etiam duo alia suberiri morborum genera, quæ à Græcis, παρὺλιδες, de quibus in superiori dictum est morbo, παρὺλιδες. & ἐπὶ ὀδῶν enumerentur. Voces hæc quidem quasi similes, sed diuersas res significantes. Est enim iuxta Paulum παρὺλῖς abscessulus circa gingivas factus, qui nisi solvatur, suppuretur. Ἐπὶ ὀδῶν. verò caro superflua ex inflammatione in extremo molari dente, cui dolor, & interdum febris iungatur. Celsus verò, ut prius ostensum est, parulidas (licet parotides.

des in codicibus vulgatis legatur) tubercula dicit in gingiuis iuxta dentes dolentia. Illud præterea mali genus Haliabas Auralem, hoc abulem vocat: Auicenna

Auralis.
Abulis. Bo-
ralis. Caro
addita.
Vesica in
ore puero-
rum.

Verò Boralē, & carnē additā. Istiusmodi porro carneæ excrescētiae, ab inflāmatione scilicet exurgente Raz. meminisse videtur, & in pueriliū adfectuum numero posuisse cap. 14. quam vesicam in ore puerorum cōtingentem nominat: in primāq; ætate eorum accidere, vel ex lactis corruptione, vel acuitate: atq; eiusmodi vesicam aut nimis acutā esse, aut perparum.

Causa.
Nota.

Indicium proinde huius mali esse ruborem, & doloris vehementiam, salivæq; fluxionem. Minus tamen acutum non-nihil albescere, & quasi indolorificum esse cum humoris ad os defluentis copia, ut idem recitat autor.

Pruritus
curatio.

Pruritus autem duobus medicamentis curari Auic. docet: ex oleo scilicet, & cera, & carne putrida salita, in hoc
pro

proculdubio Aegineta auctoritatem sectatus, qui in lib. De tuenda sanitate, de curatione pruritus puellorum ita, inquit: Quod si pruritu, gingivarumq; commor-
 sionibus puellus torqueatur, non fomentationibus modo sed abundanti quoq; un-
 ctione ex oleo crudo, non sine modico cera liquefacto utendum censeat. Præterea gingivarum pruritus salsamenti veteris carnem veterem lenire. Nos olei olivæ immaturarum, quod Omphacium dicitur, uncias duas capimus, cera semunciam, quibus commistis, unguentum concinnamus, quo dolor compescitur, calor obtunditur, excrescentiæque detumescunt. Itidem per carnem
 salsam, quæ salsamentum vetus à Paulo dicitur, quod Græci τὰριχὸν vocant, unde tarichia, hoc est succidia veniunt, gingivarum adfectus ille extergitur, & excrescentiæ coguntur, stringuntur, siccantur. Sunt autem aliqui, qui
 hosce

Pauli verba.

Caro salsa.
 Salsamentum vetus.
 Tarichia.
 Succidia.

hosce malum, cum eiusmodi curent me-
 dys. Ordinantes scilicet, imprimis febric-
 itantium more nutricis dietam: dein-
 de verò gingiuas, & collum, & fauces
 cum oleo violarū, & ceræ modico illinūt.
 Caput autem cum aqua ex decocto cha-
 momillæ, meliloti, violarum, rosarum ir-
 rorantes: Ventrem quoq; cum aniso, &
 rosis in aceto emollitis in forma empla-
 stri fouent: Ventriculo etiam absinthium,
 & mentam cum rosis imponentes. Non-
 nulli gingiuis dolorificis, aut propter
 erosionem, aut caninorum dentium produ-
 ctionem, plantaginis & corticis celsi ar-
 boris quidpiam puerorum ori inferunt.

Excreſcen-
 tiarum cu-
 ratio.

Razes autē excreſcentiarū curare malū
 cum nutricis lacte correcto, docet, & cum
 oleo frigido, & humido. Deinde verò nō
 nihil de lentibus masticandū esse, ori q; pue-
 rorum indendū, fortè ob abstringēdi vim
 & naturam quæ lenti inest. Aut amyli
 parum sumendum esse, & cum aqua rosa

cea

cea infriandum, demum gingivis admi-
nistrandum. Siue ori puerorum ex aquis
malorum, ut punicorū, cotoneorū, macia-
norum: aut ex succis gelidis, ut lactuca,
portulacæ, aut id genus alijs ingeredū esse.

Vesicis autem parum acutis, ut ipse
vocat, & albescentibus, myrrhæ, croci
æquè drachma vna, contusis, & cum sac-
chari duplō superponendum esse.

Vesicarū
parum acu-
tarum cu-
ratio.

Morbus tricesimus, aphthæ Græ-
cis, alcola, Auicennæ, calaba,
Haliabati, oris vlcus
Plinio.

INter oris vitia & aphthæ reperiun- Aphthæ.
tur mala scilicet vlcera, præsertim in
pueris, quæ ἄφθας Græci vocant. Huins-
modi enim vel alba, vel rubra, vel ni- Alcola.
gra sunt: interdumq; crustas, his quæ ab Calaba.
ignibus fiunt non dissimiles emittentia. Morbi de-
Interdum etiam quasi depascēdo linguā, scriptio.
& palatum erodentia. Quæ quidē Auic.
alcola, Haliabbas calaba vocat vlcera.

M

Eiusmodi quoque oris *Ulcer*a, quibus apud
 Græcos *aphthæ* cognomento sit, Paulus
 quoque in lib. De tuenda sanitate expli-
 cat: plerūque etiam nuper natis incidere,
 alia quidem subcandido, alia rubescente,
 nonnunquam atro colore, & qualis in
 adestorum crustis videatur, quod omnium
 periculosissimum, & maximè lethiferum
 esse dicatur. Proinde eiusmodi oris *Ulcer*a,
 quæ *Aphthæ* dicantur in etatibus talia
 contingere Hippocr. Aphor. lib. 3. Apho-
 ris. 24. indicat, etiā paruis, & nuper na-
 tis puerulis. Quem quidē diligentius quæ
 ad etates attineant Hippocra. consideras-
 se Galen. interpretatur: apudq; Græcos
 istiusmodi *Ulcer*a *Aphthas* vocari, quæ
 summam oris occupent partem, ob molli-
 ciem maximè facta instrumentorū, quæ
 scilicet neque tactū, neque lactis sustineant
 qualitatem, quod non parvā in se serosam
 contineant partem: huiusmodi autē par-
 tem vim habere abstergendi. Quare non

mi

mirū esse, si in corporibus mollibus quasdā
per summa facere exulcerationes.

Celsus verò lib. 6. capi. 11. de coloribus
istorum vlcum mentionem facit nul-
lam, tantum ea esse periculosissima scri-
bens: sed in pueris, hos enim sapissimè cō-
sumere, in viris verò, mulieribusq; non
idem periculum esse: atque à gingiuis in-
cipere, deinde palatum, totumq; os occu-
pare, tum ad vuluam, faucesq; descende-
re, quibus obsessis non facile fieri, vt puer
reualescat. Porro Plinium huiusmodi
malum, plerunq; oris vlcus adpellare, Oris vlcus
sine certa proprij generis adpellatione
in Scholijs Aegineta nostris demonstra-
uimus.

Ex quibus iam recitatis patet hæc vlcus causa.
cetera ex quolibet humore progigni posse,
pueris tamen potissimum ex lactis acri-
monia, & concoctionis infirmitate eue-
nire. Pueri enim lactis nimium adpeten-
tiores, in Ventriculo eorum tandem cor-

rupti vapores sursum euehuntur, idemq;
malum alliciunt.

Notæ.

Eiusmodi autem mali notas ex colore
dijudicandas esse, autores ponunt. Veluti
albedinem pituitosam, & salsam indi-
care redundantiam: Croceum verò colo-
rem, bilē rubeam, & inflammationis ve-
hementiam: nigredinē verò bilē atram:
ruffum autē & præclarū, sanguinolentiā.

Lactis pro-
ba.

Hinc nonnulli lactis probam in casu præ-
senti singulariter prodidere, inspicientes
an lac ad spicuum colorem se inclinet. Post
hoc autem an in specillo, siue vngue de-
fluat certissimum malitiosi lactis esse ar-
gumentum scilicet nimium tenuioris, tan-
quam ex concoctricis facultatis vi im-
becilliori proueniētis. Quo lacte ita ad-
parente, infallibile tunc istiusmodi mali
subinde prorupturi fore prognostica, ad-
seruere. Proinde Vlcera eiusmodi sine
apostemate euenientia, atque minimè
hincinde deambulātia manifestè, neque
pro

Progno-
stica.

profunda, plerunque salubriora esse. Nigra verò aliorum comparatione valde exitiosa. Pestilentissima esse omnium ex atrabilis succo orta. Præterea Ulcera in oris superficie contingentia, populariter hinc inde vagantia esse, ob caliditatem istiusmodi loci inseparabilem, atque cutis eius humiditatem leuem. Ulcerationes enim in ore subortas, habere quidpiam igneæ caliditatis, Gale. in lib. 6. capi. 4. Aphthæ igneæ caliditatis nõ nihil in se habent.

De compositione pharmacorum meminit. Proinde mala huiusmodi oriri, & pluriarum, & febrũ pestiferarũ tẽporibus, fertur. Perpetuò tamen illa esse deteriora quæ difficulter maturescant, & quæ sint atra. Salubriora è diuerso esse quæ sint albi, aut spicei coloris. Iuvat etiam hĩc meminisse, non tantum oris Ulcerationes adpellari aphthas, sed & aliarũ partium, & maximè pudendorum, fortè quòd ignea quadam caliditate huiusmodi Ulcera ardeant, & sint quasi incensa. Aphthæ non tantũ oris, sed & alijs corporis partibus attri- buuntur.

Curatio.

Curantur facile, inquit Gale. Vtpotè cū moderatè adstringentibus medicamētis, fieri tamen interdū diuturna huiusmodi Vlcera, atque agrè solubilia, temporisq; progressu putredinosi quidpiā acquirere, quod à medicis Nome adpelletur. At

Nome.

puerorum Vlcerationibus nonnihil leuio-

Corpori-
bus fortio-
ribus for-
tiora me-
dicamina
sunt adhi-
benda, & e
contra.

ribus medendū est pharmacis, quandoque etiam cum lactis correctione. Scripta sunt itaque nonnulla à nostris ad ipsas mode- rata medicamenta, tanquā ad eas quæ nihil mali in se habeant. Equorū numero

Viola sic
oæ, trita.

est violarum tritarum exhibitio. Albas Violas & siccas cum melle tritas Gale- nus illinendas prædicat. Solent enim hæ interdum ex se huiusmodi Vlcerationum caliditatem, cum frigidityte, & humi- ditate suis extinguere, cursumq; eorum vagum, siue expansionem, Vt Auicen- na scribit, impedire. Has enim cum mel- le oris Vlcera compescere, quas aphthas dicant, Dioscorides etiam lib. 3. capi. 129.

con

cōvincit. Quasi per se inuvalidiores essent,
 rosas his & lentes addere possemus, re-
 cipientes, violarum recentium vnciam
 vnam: rosarum rubearum, lentium sin-
 gulorum semunciam, demum trita ad-
 ponantur. Secundum est lactuca, solani
 & portulacæ succorum administratio. Lactucæ
 succus.
 Eo quidem dolorem vlcera mitigari, Solani suc-
 cus.
 & materia delinquentis, & percurren- Portulacæ
 tis ardorem contundi, caloremq; indefi- succus.
 nenter adcurrentem protrudi, dilatatio- Glycyrrhi-
 nemq; vlcera prohiberi, quotidiana do- zæ succus.
 cet experientia. Tertium est Glycyrrhi-
 zæ succus, qui sua temperatura in caliditate,
 & humiditate, maturat, digerit, humo-
 rem, repercutit, dolorem miris modis
 mitigat. Quartum est autoritate etiam
 Pauli, crocus, modicum myrrhæ, galla,
 thus, cortex thuris, aut vnà simul & se-
 mel, aut sigillatim, seorsimq; mel- Pharmacū
 le irrigata, & excerpta. Quibus no- cōpositū.
 stri remedijs in hunc vtuntur modum.

Recipientes myrrhæ, gallarum, corticum
thuris æquè drachmas duas, quibus exa-
ctissime tritis, & cum melle irrigatis in
forma vngētī vlcera illinunt: quo medi-
camento mala hæc vlcera exiccantur, &
materia delinquens absumitur, loca ad-
fecta corroboratur, & solidiora reddun-
tur.

Mori arbo-
ris pomo-
rum imma-
turatorum
succus.

Quintum est moris arboris pomorum
immaturorum succus, quem in aeneo vase
decoctum, aut insolatū, adstringēdi vim,
& naturam adquirere, Dioscor. tradit.
additoq; illi exiguo melle ad destillatio-
nes facere, atque ob ea quæ pascendo ser-
pant, atque ad tonsillarum inflammatio-
nes. Mora itaque cū minus nisi cum melle
conseruentur, medicamēto isto, in eiusmo-
di malis vtimur, quod Dia morum ap-
pellare, solent. Sextū est succus Vuæ acer-
bæ, siue immaturæ, cuius libræ duæ coquā-
tur, mediocriter vsque ad tertiæ partis
consumptionem, quo colato, & vitreo
vasi imposito, insoletur vsque ad iustam
densi

Dia morū.
Vuæ acer-
bæ succus.

densitatem, sicq; vsui necessario conseruetur. Eodem modo fieri debet, atque cum alijs in hoc casu congruentibus succis. Septimum autoritate Pauli est aqua mulsa, Aqua mulsa. quod Græci μελίκρατον nominant, & mali denique punici dulcis cremor, de μελίκρατον. quibus in Commētarijs super eodē autore verba fecimus. Persuadent tamen nostri, ut post istā aquam mulsam, veluti exte-
rentem, digerentē, extenuantem, nonni-
hilq; refrigerantē, exiccatoria adhibea-
mus medicamenta, veluti sunt Gallæ,
cortices thuris, & alia id genus, ad lin-
guæ tantum oris carnes corroborandas.
Octauum, Auic. est remedium, quādo sci- Remediū
Auicēnæ. licet alia minus inuerint auxilia, recipiēs
radicum Chelidony exiccatarū, cor. ma-
lorum punicorum, balaustiorum, rhus,
hoc est, sumac, singulorum drachmas 6.
gallarum drachmas tres, aluminis scis-
silis drachmas duas, quæ trita, loco ad-
fecto prius aqua mulsa, vel vino eloto su-

Medicamē
cōpositū.

per aspergi iubet. Recentiores tamen ex huiusmodi medicamentis talem concinnant compositionem. Sumunt enim succi portulacæ, sumac, myrti, corticum mali punici, aluminis, in oleo coctorum, & loca dolentia illinunt. Auicenna istiusmodi vlcera cum saccharo, & camphora tantum sanat. Satius tamen esset vt in pueris hoc malum cum diætæ, quātum fieri posset, & lactis correptione emēdaretur, siue curaretur.

Morbus tricesimus primus, Ranula in lingua, quam Græci βατραχίον vocāt: atque de linguæ resolutione, & grauitate, puerorumq; balbutie.

Descriptio
Batra-
chi.

Batrachus, inquit, Paulus, est tumor cum inflammatione sub lingua, maxime pueros infestans. Hunc morbum Auicen. cum alijs Arabibus Ranulam vocat. Quem quidem adcidere ferunt, quan

Ranula.

quando sub lingua apostema durum accidat, & distendatur, & oppleantur venæ linguae. Adparere siquidem instar ranæ exceptis eiusdem extremitatibus.

Causam autem huiusmodi mali esse, Causæ.
humiditatem viscosam, cuius materia sit pituita. Oriri præterea sub lingua iuxta dentes anteriores in modum carnis, siue tumoris carnei: quo fieri, ut lingua adaper-
ta quasi alteram adparere linguam. Proinde ob immensum eius loci dolorem, & tumorem, qui in gula contingat, febrem sepius suboriri, Gulielmus Placentinus tradit: hinc pueros etiam suffocari, & interdum mori. Porro de linguae resolu-
tione, siue sermonis pronuntiatione tarda, & titubante, Avicennæ iudicium est Linguae resolutio.
eiusmodi impedimenta euenire ex humiditatibus in nervis, & musculis in substantia linguae retentis.

Ranula præterea notas esse, G. Placentinus Notæ.
tinus

Notæ.

tinus prodit, quum ab vtraque parte ligamenti linguae quaedam prominētia sphaerica instar ciceris, vel fabae conspiciatur, quæ alias duas ad inuicem cōtinuet. Linguae verò resolutæ, & grauedinis in ea eiusmodi sunt indicia, vt paralysis vniuersalis: & fluxio humiditatis inuoluntaria ab ore, vt rectè effari, siue proloqui, seu pronunciare nequeat.

Prognostica.

Atqui paralysis chronicam, & balbuciem innatam nunquam curari exactè autores cōfirmant, nisi in pueris nonnunquam adolescentiam cōtingentibus corrigi interdum concedant. Haud secus & linguae grauedinem ab ortu per aliquot annos perdurantem difficillimè, vel nunquam abditurā, autores adfirmant: præcipuè vbi cum surditate adciderit: præterquam in pueris licet per vnum, atque alterum hoc malo durante, annum, interdum in processu curari.

Curatio.

Curam istiusmodi mali celeritatem
requi

requirere, G. Placentinus iudicat, propter communionem quam cū canna pulmonis habeat. In cuius quidem curatione adhibentur perfrictiones, quæ sunt cum origano, persico, & malorum punicorum cortice, & sale. Sunt qui pueri linguā tarde effutientis multum cum sale, & melle perfricent. Puer quoque ut linguam suā moueat sepius admonendus atque ad effandum est indefinenter instigandus. Perfrictio linguæ quotidiana cum salvia multum commendatur.

Perfrictio
nes.

Morbus tricesimus secundus
Cancris in ore puerorū, qui
à Græcis καρκίνοι & καρκ
κινώματα dicuntur.

IN omnibus & singulis corporis par-
tibus cancos oriri posse Aegineta te-
statur: siquidem non oculis modo, verum
& mulierum locellis, tum alijs corporis
partibus, & quidem permultis, præci-
pue tamen & sepius in fæminarum
mam

Morbi de-
scriptio.

mammis sese insinuare: quippe raritate sua laxæ & fungosæ hæ partes, crassissimam atræ bilis materiam (nam inde hoc malū gignitur) quàm promptissimè admittere, & sponte quasi sua excipere.

Autorum
circa pue-
rorum can-
eros disce-
ptatio.

Infantium
tempera-
mentum.

An verò huiuscemodi malum puerorum corporibus ingruat, apud autores super hac re nonnihil ambigentes disceptatum est. Equidem Avicennæ est sententia, Fen. 1. lib. 1. Doct. 3. capi. 3. solorum infantium ab ipsa infantili ætate temperamentum in calore ferè esse temperatum, in humiditate verò nonnihil excedens: quare difficillimè fieri, ut eiusmodi corpus, hoc malo melancholico corripiatur. Ad hoc ob temperamenti istiusmodi in pueris imbecillitatem difficulter hoc malum in ipsis pueris evenire posse, nonnulli rati sunt. Nā citius eos ab eiusmodi morbo interimi, quàm aliquo modo adfici. Rarissimè tamen id, esto contingat interdum fieri.

ob

Ob quam rem non operaprecium esse
visum est, hinc circa istiusmodi mali indi-
cationem, siue curationem multum immo-
rari, præcipue quum rarenter in pueris
eueniat: atque quod ubi semel irrepserit,
grauissima, & incurabilis (teste Aegi-
neta) curationis existat, ob humoris cras-
situdinẽ, qui neque extrudi, neque auel-
li, neque discuti possit. Ad hæc quod neq̃
purgationi totius corporis (quod in pueris
nequaquam admittitur) cedat, sed admo-
dum malitiosa natura sit, ut mitiora re-
media floccifaciat, asserioribus verò into-
lerabilius incitetur. Præterea posse quidẽ
hoc malum primum emergens, quò mi-
nus inaugeatur, impediri, melancholici
humoris directione, prius tamen facien-
dum hoc esse, antequam radices in mem-
bro adfecto egerit.

Dicitur porro hoc malum καρκίνος Cancer
vel καρκινώμα, vel quod Venæ cir- unde sic dicitur,
ca eos plena, & extenta instar ani-

m.

Cancris &
carcinoma-
tis differen-
tia.

Carcino-
mata latē-
tia.

Carcino-
ma quid
sit.

causa.

Cancer ex
ulceratū,
& nōdum
exulcera-
tum.

malis cancri sint: vel quòd adeò pertina-
citer inhereant loco quem adprehende-
rint, ut animal cancer. Sunt qui cancrum
à carcinomate seiungāt, illum ab his quæ
extrinsecus accidunt oriri, dicentes: Hoc
verò in corrupta aliqua interiori parte in-
nasci. At carcinomata latentia Marcel-
lus vocat, non quòd in occulto constituta
sint, sed quia nondum exulcerata iuxta
Græcorum medicorum auctoritatem, &
præcipuè Hippocratis in Aphorismorum
libro. Esse præterea carcinoma, inæquale,
glomerosum, liuescentem, aspectu tetrum,
& cum dolore tumorem, omnes humani
corporis partes obsidentem. Constat autem
ex superioribus Aegineta dictis, ex
crassissima nigra bilis materia hoc malū
suboriri. Nanque cum ex huiusmodi hu-
more referbuerit carcinoma subinde sub-
nascitur, eamq; ob causam nigro liuescit
colore. Estq; cum exulceratum, & cum
nondum exulceratū, quod κρυπτός Hip-
pocra

pocrates vocat.

Iuxta cuius præceptū in curatione eius ^{Curatio.}
hoc potissimum observandum, ut ante
eius exulcerationem, quantum fieri po-
test, eius exulceratio, & incrementum
differatur. Occultos præterea omnes me-
lius esse, ut non curentur: curati enim ci-
tius pereant: non curati verò longius per-
durent. Quum autem incertum adhuc sit
(nam Medici certant, & adhuc sub iu-
dice lis est) an pueris, ut superius per-
strinximus, hoc malum contingat, plura
adhuc alia, quæ hîc aliâs recitanda essent,
omittamus: tantum aliquot in curatione
istiusmodi mali, in puerorum reperti, an-
tidota, à nonnullis, ut creditur, expe-
rientia cognita inferemus. Ferunt enim
Crystallum tritum & ori cancro adfecto ^{Crystallus.}
impositum, quo ad dies decem perfrictum os
infallibiliter curare. Idem idem de cornu cer- ^{Cornu cere-}
uino, & mali punici cortice contritis, & ^{uinum.}
ori inspersis, siue proiectis differunt. Ad

N

Mali puni
ei cortex.
Solani suc-
cus.

*hac solani succum, linteolo molli, & dupli-
cato in ipso irrigato, & canceri impositum
Aegineta plurimum commendat. Foris
etiam ipsam lanam mollem in ipso cremo-
re madefactam idē tradit autor, inijciē-
dam esse, prospiciendumq; ne exarescat,
succo scilicet perpetim infuso.*

Morbus tricesimustertius Angis-
na, cuius genera Græci ponunt qua-
tuor, vt *Σωδύχη, Παράουγαχί, κωδύχη*
Παρακωδύχη. Eadem & Tonsillæ à
nonnullis dicitur, quam Barbas-
ri Squinantiam has-
ctenus vocis
tauere.

Morbi de-
scriptio.

Preceptum hoc malum esse, & circa col-
lum, Galenus in suis tradit diffini-
tionibus, strangulationeq; mortem fa-
cere, inflammationesq; esse Anginas,
quæ in nonnullis forinsecus tamen, &
in collo cum tumore contingant: aliqui-
bus

bus Verò intra tonsillas, tum respiratio-
 nis instrumenta adfici, quibus adfectis
 spiritum postea angi. Porro idem in alio ^{Diuisio.}
 loco inculcat autor, anginas esse inflamma-
 tiones circa collū, quæ si interiori parte
 eueniant, citissimè tunc, & precipiti stran-
 gulatione perimere. In parte Verò exte-
 ri vbi contingant, minus tunc periculosas
 esse, minusq; strangulare. Quæ quidem <sup>Angine ge-
 nera ex
 Paulo.</sup>
 Paulus Aegineta cuncta anginarū gene-
 ra, cum partibus in quibus eueniāt, etiam
 certis adpellationibus distinguit. Nā lib. 3
 De arte medendi cap. 27. recitat, inflam-
 matum faucium interioribus musculis,
 eam oris adfectionem fieri, quæ Græcis
 οὐνάρχη, Romanis angina dicatur. Exte-
 rioribus autem phlegmone infestis, ea <sup>Synanche.
 Angina.
 Paracynan-
 che.</sup>
 quæ παρὰ οὐνάρχη vocetur. Et hæc prima
 anginarum diuisio, atq; ex loco in quo con-
 tingat indicatio est. Altera Verò quam
 idē subiungit autor, est vbi eodē modo, &
 in gutture, cuius interiores musculi inflā-

mentur, cynanchen fieri: exteriores autem
 Cynanche. paracynanchen: quæ quidem apud Græcas
 voces, vel in nullo aut exiguo discrimine
 aliquando misceantur, quum ab re neque
 penitus differant: quia omnium ferè ea-
 dem euenta, sint, nec admodum dissimilis
 omnino curatio. Hoc etenim vniuersum
 mali genus in respirationis instrumēto fie-
 ri, nisi quod aut foris, aut intus, summis ve
 aut inferioribus eius instrumēti partibus,
 mali ea vis ingruat, sicq; diuersas à Græ-
 cis adpellationes inueniri. Quū autē omnium
 vnus, idēq; in strangulando euentus, sit, ex
 eodem verbo, vt Marcellus recitat, ἀγγίχον
 Anginam
 Græci
 ἀγγίχον
 adpellunt.
 omnes adpellārint, quod Latini anginam
 ab angendo nominent. Parischmia, &
 eorum inflammationes, à nonnullis vt ab
 Tonsillæ. Hippocrate, & Celso Tonsillæ nominātur.
 Ille enim Aph. lib. 3. Apho. 26. tertiam
 puerulorum etatem huiusmodi passiōi-
 bus capi scribit, quarum primas tonsillas
 vocat: quas locorum ad isthmum attinen-
 tium

tium inflammationes Galenus interpreta-
 tur. Esse autem Isthmū partem illam quæ
 os & gulam interiaceat. Istiusmodi verò
 tonsillas esse nonnunquam solius tunice
 ventri, ac gulæ & faucibus, totiꝫ ori cō-
 munes inflammationes: interdum etiam
 & subiectorum ipsi musculorum, quando
 & vertebra quæ sit in occipite, fiant ad
 interiora motiones. Torqueri autem huius
 modi cynanche pusiones non rarēter Ae-
 gineta testatur, quum vertebra colli do-
 leant quā sint rarissimæ. Hippocrates au-
 tem non in recens natis puerulis hoc malū
 accidere intelligit, sed de ijs qui mediam
 habeant ætatem, inter illos scilicet qui den-
 tes ediderint, & qui pubertati sint proxi-
 mi, minimè ignorans & istis nihilomi-
 nus cerebrum humidum, & plenum su-
 perfluitatibus (quæ certissimæ huiusmodi
 mali sunt causæ) inesse, adeò etiam quòd
 subiectis partibus demittant fluxiones.
 Attamen istos hac ætate existentes prius

Isthmus.

Pusiones
 cynanche
 frequenter
 corripion-
 tur.
 Hippocra-
 tis senten-
 tia.

Causæ.

emori, subintellexit, quàm subiecti fau-
cibus musculi (vt Gal. indicat) vnà cum
neruis fortem subeant inflammationem.

Notæ.
Orthop-
noëa.

Dyspnoëa.

Cum enim porro eadem euenta esse Ae-
gineta dicit, videlicet non nisi recta cer-
uice spiratio, quæ ὀρθόπνοια dicitur: & do-
lor cum difficultate respiratio, quam δύ-
σπνοια Græci nuncupant: in nonnullis
etiam febris, ruborq; cū vultus, tum colli,
atq; tumor quoq; in quibusdā, tum sanè os
perpetuò hians atq; diductū, & deglutiē-
di difficultas. Celsus interdū neq; ruborem
neq; tumorem adparere vllum adserit, sed
corpus esse aridum, spiritumq; vix trahi,
membra solui. Interdum verò linguā, fau-
cesq; cum rubore intumescere, vocem nihil
significare, oculos verti, faciem pallere, sin-
gultumq; adesse. Cōmunia verò illa huic
malo inesse, ægrum cibum non deuorare,
neque potionem spiritumq; eius includi.

Prognō-
stica.

Lenius tamē esse vbi tumor tantummo-
do & rubor insit. In febre præterea forti

anginam esse periculosam, autores decernunt, & saepius mortis causam ob vehementem respirandi necessitatem. Ad hac strangulatus fortis, & vehemens perniciosum est malum quia in gargareone, vel epiglottide evidens nocumentum esse portendit, respirandi, inspirandiq; facultatis impedimentū. Interitus etiā presentissimū esse indicium Hippo. prognosticatur: quādo colli color rubeus ad lividum, fuscum, albūq; inuarietur, & sudor sub axillis, vel inguinibus suboriatur: nam in secūdo plerūq; die internecionē adesse. Spiritus enim introrsum ferūtur, & vapores qui respirādo exeri nō possunt, per aliam viā magna cū difficultate propulsantur. Porro strangulatos ac dissolutos, nōdum verò mortuos minimè referri Hippo. adserit, quibus spuma circa os fuerit. Ab angina autem habito si tumor fiat in collo bonum, foras enim morbum deduci.

Deploratis itaq; & incurabilibus ne- Curatio.

quaquam, autoritate Pauli manus auxi-
 lij causa admouenda. Adultis enim vena
 cubitus adaperienda, aliusq; eorum clyf-
 mate ducenda, quod in infantibus nequa-
 quam admoliendū, sed balanis, siue glan-
 dibus ex melle & sale, cum modico colo-
 cynthidos proritanda est, quò humores ad
 inferna deducantur, vaporumq; copia ne
 sursum ascendat, locumq; dolentem adfi-
 ciat, impediatur. Deinde verò simplici
 diamoro medicandum erit, quod & ab
 initio statim exhibendum esset. Nobi-
 lius autem fieri, quod ex syluestribus mo-
 ris concinnatum sit. Diamoron Aegineta
 adfirmat: Dioscor. etiam mororum suc-
 cum expressum in vase æneo decoctum,
 aut insolatum decoctū, adstringēdi vim,
 & naturam acquirere, cōvincit: additoq;
 illi exiguo melle, ad destillationes facere
 & tonsillarum inflammationes. Quare
 in morbi initio, nostrates de immaturis
 moris succum commendant: quasi magis
 ad

Diamoron
 simplex.
 Diamoron
 ex moris
 syluestri-
 bus nobile.

adstringentem, & locum adfectum corro-
borantem, humoresq; adfluentes impellen-
tem. Morbo vero in summo vigente, tum
de maturioribus succum cōpetere: nēpe ca-
liditate & humiditate suis humores ma-
turare & discutere. Ob quam rem diamo-
ron cū melle rosarū administramus. Haud
dissimiliter & hirundinum cinerē (sylue
striū dicit Aegyneta) hīc conferre cōpertū
est. Vulgus vero sacculū milio, & sale onu-
stum atq; torrefactū capiti ad exiccandum
tum discutiendum humiditates gutturi
incumbentes adplicat. Lanis autem succi-
dis collum vtiliter protegimus, siue irri-
gationibus olei oliuarum, aut chamomeli
no, ad dolorem sedandum, atterendum, fo-
uemus. Paulus cum hordeacea polenta ca-
taplasma imponendum esse, præcipit, plu-
rimum enim expedire. Mulierculæ autem
nonnullæ sericeum filum collo adpo-
nunt retortum, forsan ex Auenzoaris
testimonio hinc persuasæ, qui filum seri-

Hirundinū
syluestriū
cinis.

ceum cum quo vipera sit strangulata, demum collo adpensum, ab angina liberare docet. Nos communiter collo cataplasma ex oleo chamomelino, & lana succida ad ministramus. Ad hoc diamorō cum aqua tepida osculo imponimus.

Morbus trigesimusquartus, Tussis, & Coriza.

Descriptio **C**ommunē quidem Coryza catarrhi, Craucedinis, tussisq̃, excrementosum, à capite humoris in partes subiectas descensum Aegineta testatur lib. 3. de arte medendi cap. 28. quem ait, in nares destillando ingruentem, & easdem adgrauantem **Coryzam** nomine dici: per palatum verò in fauces influentem **catarrhum** simpliciter adpellari: eūdem verò in guttur, asperamq̃ arteriam delatum, interioremq̃ eius membranam salebrosam reddentem, voce rauca concomitante, **branchum**, siue malum arteriacum nominari

nari. Nec tamen hoc modo, est capite sci ^{Malum aut}
 licet cadere catharro, raucedinem proue- ^{teriacum}
 nire, sed etiam ex vehementiore & al-
 tiore vociferationis conatu, & frigidi
 aëris, sine spiritus ingressu pariter sen-
 tiri cum inflammatione. Quo malo diu-
 tius perseverante, fluxuq; hoc in pectus,
 pulmonesq; descendente, molestias tunc,
 ac periculosas subsequi tusses. Istiusmodi
 tussicula & destillationes pueris euenire
Avicen lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. Idem
& Razes Libro de puerorum adfectibus,
capi. 35. & in prima eorum contingere
etate conuincunt. Quorum quidem senten-
tijs etiam Hippocrates in Aphor. lib. 3.
Aphorif. 24. alludit. In etatibus autem
 inquit, talia contingunt, paruis, & nuper
 natis puerulis, oris vlcera (quæ aphtha vo-
 cantur) vomitus, tusses, vigilie, pa-
 uores, umbilici inflammationes, au-
 rium humiditates. Qualis autem, Ga-
 lenus, inquit, per vomitiones in ven-
 trico

triculo expultricis facultatis est actio, eius-
 modi etiam per tusses, & in pectore, &
 in pulmonibus. Nam si causa quæpiam mo-
 lestiam adferens, siue ventriculi osculum,
 siue respirationis meatum obsideat, proti-
 nus animal vel vomitione, vel tussi vex-
 tur. Veluti enim inter pariendum uterus,
 ita inter vomendū verò ventriculus mo-
 ueatur. In tussi verò multo aliā rationem
 esse, pulmones enim non posse tā vehemēti
 concitari motu, ut id explodant, quod mo-
 lestum sit. Quare naturā auxilium adin-
 uenisse: inspirato enim in asperas arterias
 aëre externo, quū ipsæ sint cartilagineæ,
 ac duræ, neq; cōtrahi possint, circa id quod
 in ipsis contineatur: faberrimè machina-
 tam esse vehementem hanc spiritus ad
 exteriora motionem, quam tussim nomi-
 nent. Itaq; tusses vehementer pulmonibus
 incumbere, ut multam, eandemq; con-
 fertam excitent inflationem. Quicquid
 enim spiritum intercipiat, id semper tussi
 rei

Tussis.

reijci oportere, siue id fuerit humor è capite defluens, vt in destillationibus, siue aliquid in asperis arterijs coaceruetur, vt in peripneumonia, pleuritide, & in conuexarum iocinoris partium phlegmone, aut in gutturi ipsius asperitate.

Huiusmodi enim causis tussim sepius Causæ.
siue fieri constat: in pueris autem plerumq; ex importuna lactis ingurgitatione ad asperam arteriam descendantis, siue quòd capita habeant omnino humida, è quibus humiditates ad pectora defluant, tussim proritantes. Nulli enim dubium est, ex vdis cerebellis, atq; plenis, nonnullas superfluitates ad guttur, pectusq; procidere, destillationesq; ciere, è quibus tusses excitentur. Ad hæc quòd pueruli in vtero materno aeris calidi assuesacti, deumum in lucem prodeuntes, gelidi aeris impatientes, tussiant. Sæpius autem ex distemperamento tussis incitatur, quandoq; videlicet, calidiore, vt in febribus, interdum frigidiore,

vt

ut in flatibus aquilonijs, quæ aridior plerunq; est.

Nota.

Cuius scilicet, & aliarum omnium tussium, per se satis innotescunt notæ.

Prognostica.

Inter eiusmodi tamen nonnullæ mali cuiusdā portenta esse, autores adserunt: ut si diu perseveret tussis, inueterataq; fiet, & vehemens, siue fortis tunc ad phthisim, hecticā, & ad herniam, venæ pectoris, siue inguinis provenire. Et si tussis cum destillatione perduravit, exitiosa erit. Sic omnis materia per tussim commota, exitusq; difficillimi, aut nullius contumaciter deprehensa, virtute imbecilla mortem portendit, hoc est suffocationem.

Curatio.

Præsidia verò quæ hîc competunt adhibenda esse Razes docet, quæ in forma cibi & medicinae administrentur. Fortia enim siue acria omnibus modis hîc intermittenda esse medicamenta. Quñ autē hæc duo mala, coryza scilicet & tussis, infantis lo ob distemperamentū calore naturæ modum

dum plus iusto exuperans potissimum eue-
niat, ut in commentarijs super Aeginetæ
lib. 1. ostensum est, ubi etiam diligenter
commoniti eadē adhibere auxilia, quæ ca-
put dolentibus eadem occasione competāt:
nempe lauacra, & capitis permultæ cali-
dæq; conspersiones, quasi caput temperatè,
sua tantū virtute infrigident, humectet,
aliaq; commoda ibidem recitata adferāt.

Post quæ alimenta tunc quadrare, quæ sor-
beri cōmodissimè queant, ob quod sorbitio
nes vocari, in adultis quidē: in pueris au-
tem eclegmatis ex melle utendum esse.

Sorbitio-
nes
Eclegma.

Caput præterea magna mellis copia per-
ungendum. Lingua porro molliter compri-
menda, mirum enim dictū esse, quantam
pituitæ vim ea ratione euomet.

Nos verò autore Raze, amygdalas ex
aqua fœniculi concinnatas, & coctas serò,
& manē puero exhibemus. In eclegma-
te enim amygdalas nucis auellanae magni-
tudine additis melle & lacte, iocinorosis,
tussien

Razis cu-
ratio.

Dioproz.

tussientibus, & maioris intestini, quod colon dicatur. Inflationibus opitulari, Dioscor. lib. 1. ca. 144. tradit. Aut aquam feniculi cum lacte administramus. Aliqui camphoram cum lacte miscendam volūt.

Tussis
asperæ sic-
caq; cura-
tio.

In tussi autē aspera & sicca, accipimus cotoneorū semen, & in aqua calida irrigamus, & totū hoc cum fasce passo excipimus, apud ignem decoquimus additis saccharo penidio, & oleo amygdalarum atq; administramus. Mali autē punici succum adijcimus quādo cū calore tussis fuerit. In quo quidem casu vulgare hoc exhibemus

Medicamē
vulgare.

medicamen. Papaveris enim tragacathæ, æquē drach. dimidiata, seminū cucurbitæ drachma vna, irrigatur cum dedocto my

Myxaria
sebesten.

xariorum, quæ vulgò vocantur sebesten.

Aut vias accipimus passas in vase ferreo coctas, & ab igne depositas, cum totidem

Tussis geli-
dæ curatio:
etiam cum
pectore ple-
thorico.

penidiarū, & puello manē, tū vesperti, in pondere nucis propinamus. Gelidæ autem tussi, myrrhā cū melle, et oleo amygdala-

runt

rum ordinamus. Quòd si pectus fuerit ple-
thoricum tragacanthæ & galbani sin-
gulorum grana duo, luteo oui affato indi-
mus, pueroq; exhibemus.

In anhelitus autem difficultate semē
lini cum melle concinnatum administra-
mus. Itidem & bombicis semen cum lu-
teo oui affati confectum.

Tussis cū
difficulta-
te anhel-
itus cura-
tio.

Vbi verò cum tussi diaria proflueret,
Syrupus myrrhæ cum lacte coctus dandus
est. Aut dactyli cum farina filiginis in
lacte concinnati, offerendi. Hæc Razes.

Tussis cū
diaria cu-
ratio.

Auicenna autē lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3.

Tussis curationem ex Aegineta quasi
prescripto admolitur: nā multam aquam
calidam super pueri caput proyiciendum
esse, inculcat. Eiusmodi enim aqua mul-
tum concoquit, quædam ad melius alte-
rat, & quædam discutendo, atque eua-
cuando noxia, ad sanitatem perducit, au-
toritate Hippocr. Apho. lib. 5. Aphor. 25.
Calidum ex ijs quæ ad caput attinent eius

Auicennæ
curandi mo-
dus in tuf-
si.

Canon hic
obseruan-
dus.

soluunt gravitatem, hoc est, morbi mate-
riam concoquit. Perpetuò tamē hīc obser-
uandum, ut post capitis lotionem, ipsum
adcuratissime extergatur, & exiccetur,
ne aqua ipsi capiti imposita refrigescat,
& denuo pristinam frigiditatem impor-
tet, quæ recens destillationem proritet.
Linguam præterea etiam ex melle multū
perlinendam esse idem adhortatur, quod
detergat, leniat, tum palati, tum gutturis
meatus mundet. Admonet subinde gum-
mi arabici, tragacanthæ, seminum coto-
neorum, succi glycyrrhiæ, & sacchari
penidij, parum ex ijs omni die pusioni cū
lacte recens multo propinandum.

Possimus istorum singulorum sumere
drachmam vnā, quibus tritis, & in se
commistis condere conditū, de quo in fa-
bæ magnitudine puero communicaretur,
prius tamen hoc in lactis recens mulsi ab-
a. legmata. Vbere nutricis latice, imbuto. Recentiores
ex amygdalis dulcibus, & vuis passis,
&

Et malis punicis dulcibus cum melle
 eclegmata componunt. Succus glycyrrhi- ^{Dyatragā}
 zæ & saccharum penidium, & dyatra- ^{then frigi-}
 ganthen gelidum potissimū hīc commen- ^{dum.}
 dantur.

Morbus trigesimus quintus, Dys-
 spnoëa, Asthma, id est, anhelas-
 tio, quod Auic. oregmon
 vocare videtur, or-
 thopnoëa.

Triplex spiritus & animæ difficul- ^{Morbi de-}
 tas, autore Celso, reperitur: diuersa ^{scriptio.}
 tamen apud Græcos adpellatio inuenitur,
 prout se hoc malum intenderit, vniuer-
 sum tamen hoc inspirandi difficultate po-
 situm. Nanque cum modica ea est, neque
 ex toto strangulat dyspnoëa, quando au- ^{Dyspnoëa.}
 tem vehementior, ita quod ager sine so- ^{Asthma.}
 no spirare non queat, asthma: quum au-
 tem adcesserit id quoque, vt non nisi
 recta ceruice spiritus trahatur, ortho- ^{Orthopno-}
 pnoëam adpellari. Quare his malis ^{ëa, Anha-}
 N.

Asthmati-
ci.
Spiriofi.
Orthopno-
ici.

laborantes anhelos, asthmaticos, suspi-
riosos, orthopnoicos promiscuè adpella-
mus. Huiusmodi malorum priorum
in pueris euenientium Auicenna lib.1.
Fen.3. Doct.1. capi.3. mentionem fecit. Itē
Hippocrat. Aphoris. lib.3. Aphoris. 26.
Pueris cum magis adoleuerint cerebros
accidere anhelitus indicat, quos Græci
Asthmata vocent.

Causæ.

Oritur autem eiusmodi adfectio, sine
angustia in pueris, viscere repleto ab ijs,
quæ de super veniunt fluxionibus.

Prognos-
tica.

Fiunt autem istiusmodi, teste Galeno,
fluxiones, plures quidem in recens natis
puerulis. Demum citò ipsos interficiunt,
quum & aliter malè se habeant. Nāque
ex vtero ad aërem ambientem transitus,
tum alimenti mutatio, & si aliqua ad-
fuerit inflammatio ab initio quidem lo-
corum ad vmbilicum attinētium, postea
verò ob dentium generationē, ex ijs omni-
bus fiunt imbecilliori, ad hæc etiam flu-
xio

xio

xiones accesserint, possint sustinere, Vbi
ad pulmonem decubuerint. Hæc Galenus.

Porro suspiriosorum medendi ratio, ^{Curatio.}
tam ex Rāzīs quam Auicennæ colligi- ^{Razis.}
tur decretis. Ille enim semen lini cū mel-
le concinnatum, & puero datum maxi-
mè cōmendat: proculdubio Dioscor. testi-
monio, qui hoc in eclegmate cum melle
sumptū, pectus excreatione purgare, atte-
statur, tuſsimq; lenire. Idem de bomicis
in luteo oui assati administratū adprobat.

Auicenna autem alijs medijs curatio- ^{Auicennæ.}
nis summam perstringit. Primū, vt au-
rium & linguae radix ex oleo inungun-
tur oliuarū. Per istiusmodi enim vñctio-
nem coqui, & exteri superfluitates ade-
nibus aurium incumbentes: quare & de-
stillationes intercipientur. Per hanc autē
vomitus citari, quibus pectora allenietur.
Linguam præterea molliter cōprimendā
esse, insinuat, atque os infantis aqua cali-
da irrorandū, quod lauet, abstergat, tam

Linctus.
Eclegma.

linguam, quàm vuluam, atque totius colli quasi regionem. Postremo autem cum semine lini, & melle linctum, siue eclegma preparandum esse, quod in hunc concinnetur modum. Adcipiatur seminis lini semuncia, mellis crudi vncia vna, quibus simul commistis fiat eclegma, de quo in fabæ pondere puero porrigatur. Sunt qui non tantum aures, imò & collum perlinendum esse doceant, atque succum fœniculi tepidum administrandum. Circumlinationibus præterea vtendum in pectore, quando ex flatibus proueniat, vt ex oleo costino, laurino, de castoreo.

Oregmon. Postremo infanti quum dormitet addidere Oregmon Auicen. prodit, hoc est, sonitum pectoris, quem maximè prouenire autores tradunt in asthmate, peripneumonia, & morientibus.

Istiusmodi mali remediū esse in pueris Auicen. dicit semen lini cum melle in eclegmatis forma sumpti. Quod quidem

no

noſtri in hunc diſpenſant modū. Recipien-
 tes ſeminis lini vnciam vnā, mellis Eclegma.
 vncias treis, quibus optimè tritis in lin-
 etus componunt formam: demum in aqua
 mellis, vel ptifanæ tepidæ adminiſtrant.
 Cæterum & cyminiū tritum, & cū mel- Cyminiū.
 le infarctū, in hoc caſu admittit, eo quòd
 humores incīdat craſſos, & viſcidos,
 multumq; Aſthmaticis conferat, autori-
 tate etiam Dioſcor. lib. 3. capi. 61. referen-
 tis, dari in ſpiritus difficultate, non niſi
 etia cervice ſpirantibus cum poſca.

Morbus trigefimū ſextus, Stoma-
 chus fractus, ſiue imbecillus.

Stomachum fractum, ſiue debile pue- Morbi de-
 ris cōtingere Auicē. narrat, ob quod ſcriptio.
 functionem ſuam in coquendo minimè
 obire potentem. Cui quidem incommo- Curatio.
 do iſtiusmodi modis occurrendum eſſe
 tradit, quòd ſtomachus infantium ex mu-
 ſco cum aqua roſacea, vel myrti perlina-
 tur. Hoc enim aroma ſuauiſſimum cor-

Cotoneo-
rum succi.

roborat ventriculum, atque latices admi-
sti nonnihil adstringunt. Deinde verò
cotoneorum succum cu parua gariophilo-
rum dosi, & saccharo dari præcipit. Coto-
neorum succi adcipimus nos clari, & de-
purati semilibrā, sacchari vnciam vnā,
quibus vnā coctis, & ab igne sepositis,
gariophilorum in puluerem redactorum
grana sex cum lineo panno infundimus,
nonnihilq; cōprimimus, pueroq; de huiusce
modi succo manè trium paruorū cochlea-
rium quantitatem porrigimus, sigillatim
tamen, & in Eclegmatis forma. Succus
enim ille cum aromate huiusmodi ven-
triculum roborat, & saccharum hoc sua-
uius, delectabiliusq; reddit aut Gallie
muscatæ dictæ, grana 22. myrrhæ gra-
na. 3. sumantur, & conterantur & cum
vncia vna aquæ rosacæ incorporentur.
Itidem cotoneorū succi in potu pueris dati
præstabunt. Gallia enim muscata ratione
Myrrha. aromatum stomachū confortabit: myrrha

an

autem ventriculū laxat, mollemq; cōfir-
mat. Quæ autem foris adhibetur, videli-
cet ventriculo cum musco, & aqua rosa-
cea plurimum hīc quadrabunt.

Morbus trigesimusseptimus,
Vomitus.

Nausea, vomitionisq; causas ex sto-
macho provenire P. Aeginetæ au-
toritate lib. 1. liquet, inquit enim, ubi si-
nuosum crenosumq; ventriculi loculamētū
vitiosi humores infartietes superfluxerint
vomitu eyci. Verū in tunicis hostioli ven-
tris cōtentos humores inani, nequicquam
ad vomitiones Nausea, vellicare. Nausea
itaque & vomitionis differentiā hīc ex-
plicauimus. Non enim Nauseam vom-
itione conuerti: sed præcedere Nauseā, se-
qui vero vomitionē oportere ibidē osten-
ditur. Quum nausea ad vomitionem co-
natus sit, & stomachi impetus, quos vo-
mitiones sequantur. Cōstat itaque ex vi-
tiosis humoribus ventriculū impleri, atq;

Vomitus.
Nausea.
Nausea
vomitionisq;
differentiæ.

Nausea
quid sit.

in eius concavitate natate, postremo vomitu eijci sic Hippo. Puerulis noviter natis fieri, vomitus edocet Aph. lib. 3. Aphor. 24. Itidē Avicen. lib. 1. Fen. 3. capi. 3.

Causam aut huius mali Gale. aperit lactis esse quod adsumunt multitudinem. Cuius quidem sententiæ Razis etiā adstipulatur, addens ob lactis corruptionē evenire posse, potissimum verò in pueris humidis, ventriculū imbecillum habētibus.

Notæ.

Prognostica.

Vomitio syncerior deterior.

Vomitio porracea humida nigra perniciofa.

Nota sunt evidentes, vomitionē verò utilissimā esse, Hip. prognost. lib. 2. cap. 7.

Prognost. 38. pronūciat, quando pituita, ac bile permista quā maxime sit, si non multa, atque crassa sit. Synceriores enim deteriores esse. Vult itaque Hip. interprete Galeno, neutrum humorē syncerū apparere, sed eos inter se quodammodo permisceri. Quod biliosus symerus, caloris copiam: pituitosus frigoris indicet. Ad hæc prognostico, 39. subiungit, si vomitio fuerit porracea, aut humida, aut nigra: quicunque

cunque

cunque ex his fuerit color, malū esse, censendum. Constat enim ex Gal. interpretatione bilem porraceam præter naturam sæpenumero in Ventriculo gigni, propter quorundā cruditatē esculentorū, aut olerum, qualis beta, cepa, brassica, sunt. Interdum etiā talibus nequaquam ingestis, ratione agrotationis in Veris gigni, ac tum decumbere, siue in Ventre superiore, aut inferiorem, calorē tunc in corpore indicare præter naturam atque excrementi proprietatem talis temperamento, qualis prædictorum olerum succus sit. Porro

Auicē. lib. 3. Fen. 13. Tract. 5. capi. 8. Vomitionem continuam maximè facultatem, siue Virtutem debilitare indicat. Idem in lib. 1. Fen. 4. capi. 14. Vomitum superfluum obesse stomacho ostendit: quòd ipsum valde debilitet, extenuet, materiæq; aliunde suscipiendæ habilem reddat, pectori noceat, visum obtundat, dentes infringat, & capitis doloribus inue-

tera

Vomitio
nis conti-
nuæ incō-
moda.

Vomitio
humoris
foetidi ma-
la.

Vomitio
sanguino-
lenta.

teratis, nisi ex Ventriculi saturitate eue-
nientibus, molestus sit. Breuiter omnem
vomitionem humoris foetidi malā esse in
dubio non sit, eo quod putredinē aliquam
portendat. Simili modo sanguinē euomen-
tes, si sine febre quidē salutare: si verò cū
febre, malum, autore Hippoc. Aph. lib. 7.
Aph. 37. Curari autem acerbis, & refri-
gerantibus. Qui enim febre vacant, Gal.
exponit, liquet adesse nullā inflammatio-
nem in loco vnde emittatur sanguis. Qua-
re vel alicuius vasis ore adaperto fieri
sanguinis vomitum, vel cū vlcere quidē
scilicet sine inflammatione. Curari itaque
quæ absque inflammatione vlcera facile
acerbis. Quæ verò cum inflammatione, ac
febribus, nedum curari posse, neque in ea-
dem magnitudine permanere posse, sed
enim maiora, & maligniora fieri. Quam
autoritatē Auicē. in lib. 3. Fen. 13. Tract. 5.
capi. 15. sectatus adserit, vomitionē san-
guinolentam cum febre esse malam: sine
febre

febre tamen interdum non esse malam.

Atqui curationem vomitus in pueris, siue infantibus, suborti, Razis in lib. Curatio.

De puerorum adfectibus in huc prosequitur modum. In primis autē lactis copiā a nutrice præbendi interdicit: atque si fieri posset, in vomitu præcipuè dispiciendum esse, an odor ex eo acidus percipiatur, siue humores egesti candidi adpareant. Tunc enim eiusmodi remediū adponendū esse:

Libani videlicet, hoc est, thuris drachmæ
vnius partē sextam, rutæ aridæ drachmæ
vnius partem vnā, quæ redacta in pulue-
rem cū syrupo rosarum administrantur.

Ad hæc nutricem cymini parū cū modicorhus, hoc est, sumac cōmaſticare iubet, Rhus, hoc
est sumac.

Et osculo pueri imponere. Syrupum prætereā malorum punicorum cum menta, eodem modo exhibendum esse, persuadet.

Aut puero ante lactis administrationem istiusmodi medicamentum sapissimè ab eo expertum, porrigendum esse, admonet.

Medicamē
toties à Ra-
ze exper-
tum.

Cataplas-
ma.

Pastilli.
Trochisci.
Orbiculi.

net. Receperat enim ligni aloës, mastice
singulorum semidrachmā, gallæ drach-
mæ vnius partem sextā, quibus tritis, &
cum syrupo rosarum confectis, atque cum
modico galliæ, muscatæ, demū puero ex-
hibuerat. Postea verò cataplasma eiusce-
modi ventriculo pueri admouebat, reci-
piendo mastice, aloës, acatiæ, gallæ, liba-
ni, panis vsti simul partes æquales cum
oleo, & syrupo rosarum confectas. Ad
puerorum enim vomitum, tum saliuam
eorum coercendum, efficax esse experi-
mentum, adfirmat.

Quòd si verò vomitionis odor nō ace-
scat, sed aliàs asper, & acutus sit, & in
colore paleseat, tunc puero agrestæ succū,
vel è malis cotoneis consistentē præbendū
esse. Sine de istiusmodi pastillis, quos Græ-
ci ab efformationis figura τροχίσκος id
est, orbiculis adpellāt, puerorum vomitus
cōpetentibus. Recipiatur itaque rosarum,
spody æquè drachmæ tres, gallæ drach-
mas

mas duas, sem: portulacæ, lapacy singu-
lorum drachma vna, concinnentur cum
aqua malorum punicorū ad pondus dra-
chmæ vnius, cum dimidia, ex quibus
orbiculis vnus videlicet cum syrupo ro-
sarum puero detur. Proinde ventriculo
eius istiusmodi adponatur emplastrum.

Non tantum enim vomitum, imò &
Dyariam placabit. Recipiatur farine ^{Emplastrū}
hordeacæ, viridis rubi, corticum malo-
rum punicorum simul partes æquales, quæ
cum aqua rosacea conficiantur, & sto-
macho adplicentur. Auicenna hoc Ga-
ryophylorum commendat vsum, quasi in <sup>Garyophy-
lorum in
vomitione
vsus.</sup>
omni puerorum vomitione competen-
tium. Nisi quòd in ea quæ ex rubeæ
bilis ad ventriculum effusione eueniat,
nequaquam conferant: similiter neque
in illa quæ lactis corruptione contingat,
quum admodum calidi sint tempera-
menti: sed in ea vomitione potissimum
à pituitæ redundantia eueniente: siue à
lactis

lactis superuacanea copia cum concoctricis facultatis ex frigidityte, imbecillitate. Nutrix autem gariophilos mastice, & infantis ori deceter immittat, quia ventriculum corroborēt, & iecur, atque nauſea, vomituiq; conferant. Hoc idem &

Cinnamū. Cinnamomum præſtare, autores decernunt.

Auicennæ
curatio.

Ceterum Ventriculo infantium cum emplaſtris, ſiue cerotis ſuccurendum eſſe, Auicenna præcipit, cum medicamentis etiam imbecilliter adſtringētibus, veluti in vomitu à cauſa calida prouenienti. Recipiēda enim eſſe oleorum cotoneorum, myrti, roſarum, ex oleo oliuarum immaturarum confectorū vnciam vnam, ceræ albæ in aqua plantaginis elotæ vncias tres, ad ignem optimè cōmiſcenda in formamq; ceroti redigenda. Quibus addere libeat pulueris roſarum exiccatarum, ſiue ſandalorum rubeorū, vel granorum myrti, omnibus legitimè compaētis, demum
cero

ceroti modo Ventriculo adponatur.

Si verò à gelidis humoribus vomitio sub-
orta sit, aut à concoctione infirma, recipi-
tur olei masticis, vel de spica vel de ab-
synthio vncia .i. ceræ vncias tres, iux-
ta ignem commistis, atq; si lubeat, addita
drach. .i. vel gariophilorū vel cinnamomi
vel spicæ nardi, vel masticis, vel maceris,
vel nucum cupressi.

Vomitio-
nis ex frigi-
dis humo-
ribus cura-
tio.

Sunt præterea qui sola inuentione ex oleis
aliquot iam enumeratis puerorū vomitū
compescant: puluerum iam recitatorum
nonnihil inspergentes. Aut tantummodo
Ventriculos eorum cum vino styptico ex
decocto medicamentorum prædictorum ir-
rigant, & lauant. Neoterici autem Gario-
philos cum modico cotoneorū administrant
atq; Ventriculos cum menta, gariophilis,
absynthio emplastri modo fouent. Anti-
quiores medullam panis triticeï sumebāt,
prius in aceto infusi, et more cataplasma-
tis adponebāt. Itidē ex luteo ouorum assa-

Curatio-
nes singu-
lares in vo-
mitione
puerorum.

torum, mastiche, thure, gummi Arabico,
osculo ventriculi imponebant. Proinde pa-
nis crustam in aceto positi iuxta nares po-
nebant.

Morbus trigessimus octauus,
Singultus.

Morbi de-
scriptio.

Singultus ventriculi commotio est, quæ
veluti conuulsio, scilicet non absoluta,
autore Galeno, conuulsio est. Hæc enim quæ
solis musculis inesse soleat, atqui neq; ven-
triculus, neq; ipsius hostiolum musculus es-
se, censeatur. Esse verò utrisq; potètijs sym-
ptoma quoddam commune, quod veluti
conuulsio quædam attribuitur. Retentrici
quidem quòd ventriculus per singultum
grauem, & non secundum naturam cibos
amplectantur. Expultrici autè quòd præ-
cipuè ad eam pertineat deprauatus ille
motus, dum ea quæ molesta sint expellere
conetur. Ex quibus manifestum est vo-

men

mentibus, & ijs qui singultu vexen-
tur, ut non eundem esse motum, ita ne-
que eundem adfectum. Per vomitiones
enim ea quæ in spacio continetur. Per sin-
gultum verò ea quæ ventriculi corpus
imbuerunt, id quod cruciat, exprimere
tentant. Ob quam rem singultus qui-
dem primum est expultricis potentia mo-
tus quidam, deinde verò retentricis quo-
que, quam amplexatricem vocare, etiam
Galenus admittit.

Retentrix
potentia,
etiam Am-
plexatrix
a Galeno
dicitur.

Singultum porrò alium repletionem, Diuisio.
alium ex inanitione, alium eroso ab acro-
ribus humoribus stomacho provenire, Ae-
gineta libri 2. De arte medicandi prodit,
quibus vomentibus sedari.

Nam quibus ventriculi obriguerint, Causæ
eos huiusmodi symptomata experiri Gal.
tradit. Aut qui piper adfatim deuorent,
aut calidum aliquod pharmacum, deinde
calidam potionem, superbibant. Quippe si-
ue calida, siue frigida sint, si in ventri-

culi corpus penetrauerint, singultum exci-
tent. A repletionem enim qui subortus fue-
rit, partim ex ventriculi hostioli lesione
contingit, siue ea ex calido, vel frigido
aliquo euenit, vt in febrium horri-
bus, & in aëre gelido, & ex humori-
bus infrigidantibus, aut à gelu ipso in
ventriculi temperamento confirmato, iam
adstringente, & conuellente, quotidie
& in ipsis pueris experimur. Partim ve-
rò ab eroso acriorum humorum stomacho
etiam in pueris singultus concitatur, vt
à lacte corrupto, quod potissimum eue-
nire solet: itidem ex bilis rubæ in ven-
triculi hostiolum eluione. Ille autem qui
ab exinanitione prouenit singultus, febres
ardentes plerumq; concomitari solet, fa-
memq; prolixam, & fluxionem diutur-
nam, qui interitus est præcursor. Postre-
mò singultus ex plenitudine iugiter
fieri Gal. Aph. lib. comment. 13. adserit.
Exinanitione autem rariore esse: quòd au-
tem

tem ex plenitudine singultus iugiter fiat, pueros indicare, crebro singultientes cum sint repleti. Proinde singultum pueris accidere, *Auicenn. libr. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3. conuincit.*

Singultus autem à repletionem suborti nota sunt, quòd subito, insperatoq; præter adfectum aliquem diuturniorem accidat, & quòd singultiens post vomitionem, & alui deiectionem melius se habeat: atq; ante comestionem, alleviationem: post cibum verò grauedinem sentiat. E diuerso se habent singultus ab exinanitione cõcitati, nota: quia post diuturnam alui solutionem, aut dysenteriam, aut cum febricula, vel absq; ea adflictionem, non euestigiò, sed sensim suborientis. Ab erosi stomachi ex humoribus acrioribus nota sunt, quòd istiusmodi post concoctionem suscitetur singultus rei calidæ, vt piperis, synapis, cui vinum superbibatur. Siue post vomitionem biliosorum humorum,

Notæ.

Ut rubea, viridis, atraq; bilis, quod frequenter in febribus tertianis, continuis, ex simplici, siue commista bili contingit: itidem & in quartanis febribus. Proinde à flatibus quoq; nonnunquam singultus oriuntur, qui post saturitatem nauseabundam concitantur. Qui verò in pueris plerūq; post copiosam lactationem contingit: praesertim verò in ijs quorum matres sunt humidae, & plethoricae, ciborum plus iusto adpetentiores, viniq; immodicae ingurgatrices.

Prognostica.

Ex quibus iam recitatis nonnulla ab autoribus colliguntur Prognostica: ut si quando singultus post multam exinanitionem eueniat, malum esse, ut Hippoc. ap. lib. 5. Aph. 3. & 4. adfert, ubi sanguis plurimus fluxerit, singultus, aut conuulsio superueniens malum. Itē ex superflua purgatione conuulsio, aut singultus superueniens malum. Itidem lib. 7. Aphor. 3. & vomitu singultus, & oculorum

lorum ruborum, malum. Quibus Avicenna adsentiens autoritatibus, singultum in ægritudinibus acutis, præcipuè verò post superfluam purgationem malum esse, adfirmat: quia ab exinanitione fieri significari. Idem in singultu punctionem vomitionem, convulsionem, delirium, interitum portendere, asseuerat.

Quanquam vomitio satis adcommo-
Curatio.
dum sit præsidium ijs (testibus Aegineta & Avicenna) qui singultu propter stomachi saburram, vel erosionem, torqueantur. Haud absimiliratione Hippocr. Aph. lib. 6. Aphor. 13. protulit. Et singultu habitum sternutatio superueniens liberare, quòd in huiusmodi à plenitudine euenienti, vt Gal. interpretatur, violento opus sit motu, vt veluti conclusæ ipsum efficientes humiditates diffilentur, atque euacuentur: hoc autem facere sternutationem, Avicenna in puerorum singultu ex lacte scilicet corrupto, vel biliosa

Nux Indi-
ca cum sac-
charo con-
dita.

*quadam materia erodente, nucis Indica
cum saccharo Vsum maximè cōmendat.
Hanc enim boni esse nutrimentū dicitur, sed
stomacho grauem, ad inferna cōprimētē
quæcunq; ponē Ventriculi hostiolum offen-
dantur. Platearius ex India hanc effer-
ri, testatur, nucem, magnamq; esse, medi-
camentoq; vice administrari eius inte-
riora, cortice abiecto, atq; per decennium
durabilem fore.*

Singultus
à plenitate
curatio.

*Postremò in omni puerorum singultu à
plenitate suborto, in primis enitendum,
vt vomitione puer subleuetur, linguam
eius molliter comprimendo, siue digito,
aut penna, prouocandoq; quò materia de-
linquens proyiciatur.*

A frigidi-
tate.

*In eo autē qui ex frigidityte, siue mate-
ria gelida euenerit singultus, diuotiones,
perfriktiones cum stomachi, tum extremo-
rum membrorum competunt, atq; spiri-
tus nōnulla detentio, tum somnus prolixus
& Ventriculi inuentiones cum oleis de
anc*

anetho, camomilla, spica, castoreo.

*Si verò ex lacte corrupto singultierit pu-
sio, vel humore aliquo prauo erodente,
post vomitionem aquæ hordei potiones
conueniunt cum aqua malorum punico-
rum, siue dulcium, siue austerorum.*

*A lacte cor-
rupto.*

*Singultientes verò ab exinanitione pue-
ri in aqua dulci tepida, vel in lacte bal-
neandi sunt: eorumq; ventriculi cum vio-
larum oleo perungendi: cum ptisana verò
potandi, vel melonis, vel cucurbitæ aquis.*

*Ab exina-
nitione.*

Morbus trigessimus nonus, Ventris tormina, & inflationes.

I*nfanti adcidit dolor ventris, & tor-
quetur. & flet, inquit Auicenna lib. I.
Fen. 3. Doct. 1. cap. 3. Contorqueri enim pu-
siones hoc est, tormina, doloresq; pati in
ventre, intestinisq; manifestè cernimus,
ut hinc inde se torqueant, & miserrimè
plorent.*

*Morbi de-
scriptio.*

Cuius quidem mali causam in pueris

Causæ.

Lac bifaria
alteratur.

Notæ.

esse vnam, lac scilicet, adseritur: hoc enim in visceribus flatu progignit: ob quam quidem causam, & Hippoc. lac dare quibus ilia suspensa murmurant esse malū docet, quia facile alteretur lac. Galenus exponit: & quod duplicem habeat alterationem vnam quando pluri adhæreat calori, statim euaporet, alteram quando paucō, acescat. Deinde pro secunda in numero causa ponuntur vermes intestina pungentes, & stimulantes. Tertia autem causa balnei est frigiditas, siue aëris ad viscera introeuntis vis, aut impetus: quarum quidem notæ, ex causis diligenter obseruatis, quā facillimè nobis cognitæ erunt. Simili modo flatuum in ventre prouentum, siue generationem eorum fieri Aegineta ostendit, ex humoribus, vel alimentis in vapores præ tepida quadam caliditate resolutis, frigiditatē siquidem, eò quod sua natura nequeat attenuare, atq; discutere, nullos producere spiritus, sed

sed vehemens, acriorq; caliditas non solum extenuans, sed etiam penitus dissiciens flatus conspirationem prohibere. Minorem autem caliditatem, alimentum in stomacho liquefacere, ac dissicere quidem, & permutare etiam, sed remissius, idq; minori efficacia, in flatus excitatione omnem procreari. Attenuare igitur ipsos medicamentis calorificis competere.

Nos vero puerorum ventribus, *Auicena* ^{Curatio.} *na* autoritate, aquam calidam, & oleum valde calidum cum modico cere superponimus. Constat enim aquam calidam ^{Aquæ calidæ vires.} poros reserare, flatus dissipare, & viscerum frigus, si adfuerit, propulsare. Adponimus autem huiusmodi aquam, vel in balnei modum, vel cum spongia, aut lane inuolucro. Atqui oleum ex ^{Oleum peruetus, ex oleis maturis.} oleis maturis, & peruetus potissimum hic erit adaptandum quod: scilicet sit calidius, eoq; magis exterat quod etiam commodum, & ceram additam prestare

stare fertur. Itidem & olea chamomillina, & anethina hîc competere haud dubiè traditur.

Dolor ex
vermibus.

De Ventris autem ex Vermibus dolore, in processu speciatim verba facienda sunt.

Ventris
inflatio cû
capitis magnitudine.

At Razes in libro de puerorum adfectibus cap. 4. Infantibus multoties addere Ventris inflationem cum capitis magnitudine conuincit. Cuius equidem mali causam, similiter lactis esse malitiam, aut nutrimenti multitudinem, autores aliquot exponunt. Cui malo Aloën præcipuè in pueris conferre, ab Auic. libr. 3. Fen. 13. Tract. 5. ca. 3. traditur, quòd istiusmodi in Ventriculo multum materiae lubricosæ contineât, quam Aloë, Serapione autore, facile dissoluat. Razes enim myrrhâ, crocum, & Aloën cum aqua fabacea confici iubet, atq; inflato loco superponi, insinuat. Proinde olea de lilijs, chamomellinaq; hîc maximè cōducūt. Tenuè prætereà

victus
ratio.

hîc

*hic victum tam in puero, quàm in nutrice
observandum à quibusdam inculcatur: cum
ventris etiam perfrictione sub dño, dñe ta-
men existente calido, atque cum olei non-
nulla ex pipere longo cōfecti perunctione.*

**Morbus quadragesimus, Aluus
humida, siue ventris perturba-
tio, aut alui fluor.**

FRequenter pueris, siue infantibus alui
fluorem accidere *RaZ. in lib. de pue-* Morbi de-
scriptio.
rorum adfectibus contendit. Itidem *Alui.*
agit, sed plerunq; in puerorū euenire den-
titione adiūgit. Sciendum tamen omnem Alui fluor.
alui fluorem, quem schola medicorū, ven- Ventriculi
fluxus.
tris fluxum adpellat, per anum esse deie-
ctionem superuacaneam, vel illegitimā,
eorum scilicet quæ iuxta naturæ instin-
ctum excerni minimè deberent, à facul-
tate tamen expultrice promotam, ut cor-
pus à delinquentibus humoribus euacuet,
exinaniatq;. Istiusmodi quidam commu-
ni adpellatione, Diarrhæam adpellitant, Diarrhæa.
quam

quam Hippoc. in Aphor. lib. 1. Aphor. 2.

Ventris
perturba-
tio.

Ventris perturbationem nominat.

Fluorum
alui modi
diuersi.

Comperimus itaq³ vsu quotidiano alui

fluores multis contingere modis. Ali-

quando enim fit repentina ciborum per

Vomitio.

superiores parteis excretio, quam vom-

itionem nuncupamus: interdum vero per

inferna loca eodem contingit modo, cuius

adpellationem in sequentibus habebi-

mus. Nonnūquam vero immoderata ven-

tris perturbatio adcidit, cum multo bilis

fluxu, tum alui deiectione, tum vomitu,

Cholera.
Cholirica
passio.

quam Choleram nos nostra Scholæ Cho-

liricam passionem minus, tamen latinè

adpellant. Hanc autem cuius pridem men-

tionem fecimus, quæ cibos æquè ac sum-

Lienteria.

pti sunt deturbat. Lienteriam Græci

adpellant, Latini vero Intestinorum le-

Intestino-
rum leui-
tas.

uorem dicunt. Quando enim celeriter

ea quæ comeduntur, deijciuntur, rectè

intestinorum leuitatem adpellari Galen.

Aphor. lib. 4. Apho. 12. astipulatus est.

Ex

Ex infirmitate enim, langoreq; virium,
 que alimēta in stomacho distineant, pro-
 venire, Aegineta cū Galen. Vnanimi sen-
 su comprobant. Vbi verò copiosi alui fluo-
 res, sine tamen inflammatione, exulceratio-
 neq; extiterint, hos Diarrhœas adpellari Diarrhœas
 autores decernunt. Si autem huiusmodi
 cum intestinorum exulceratione, inflam-
 mationeq; fluores eruperint, in quibus cruē-
 ta, faci ve similia excernantur, torquea-
 turq; dolore aluus, & intestina, quod in
 ceteris intestinorum, & alui malis non
 adeò contingit, Dysenteriam vocamus, Dysente-
 quam Hippo. intestinorū difficultatem no- ria intesti-
 minat. Crebrā porro & inanem egerendi norum dif-
 voluntatem, & impetum Tenesmum di- ficultas.
 cimus. Atqui non operæ precium est hīc de Tenes-
 omnibus alui florum speciebus agere spe- mus.
 ciatim, sed tantummodo de istiusmodi
 diarrhœ, siue alui fluore, quo potissi-
 mū infantes infestari, soleāt. Cuius scilicet
 causas Razes ponit innumeras, videlicet Causas
 ob do

ob dolorem in eorum dentitione suboriente: siue propter frigiditatem aliquando, quando à nutricibus contrectentur, superuenientem: aut propter materiã aliquam in pueris salsugine conspersam, cum lacte nutricis ingestam, biliosi, siue pituitosi humoris participem. Cuius equidem pedibus iuit sententiam Auicenna. pro causa istiusmodi mali adserens redundantiã aliquam in puerorum gingiuis salsam, & saniosam existentem ex lactis succu euenientem, ex qua proculdubio illæ prurigines oriuntur, quarum Hippo. in progressu iam dentire incipientium puerorum meminit Aphor. lib. 3. Aphor. 25. Prurigo autem, pruritus est quidam qui cum paucis fit dolore, teste Galeno, loco iam citato, qui naturam aliõ pertrahit, ipsamq; concoquendi muneris obliuisci facit, quæ deinde hanc alui cõturbationem importat. Quam ob rem ex necessitate ventris profluvia consequi idem testatur autor: quoniam
ali

Prurigo.
Pruritus.

alimentum non bene coquatur, neque
 distribuatur. Ad hæc aluum plusquam
 modo conueniat fieri humidiorẽ, in Aph.
 lib. 2. Aphor. 20. indicat, quando cibus in
 chylum conuersus, in ipsa parcius distri-
 buatur. Sicciorẽ verò rursus, omni hu-
 more in ipsa contẽto ad hepar relato. Cau-
 sa verò ob quam parcius distribuatur esse,
 quia plus cibi aliquando homo adsumat,
 quam hepar indigeat. Contingere autem
 vt citius deijciatur, quia cum cibus malũ
 excedat, eius superfluum derelinquatur,
 vbi hepar tantum ad se attrahat, quanto
 indigeat. Quum verò ad exeundum pro-
 peret, nõ præuenire hepar tantum attra-
 here, quantum ipsi sit necessarium. Proin-
 de etiam citius festinare ad exitum id
 quod excernatur: nonnunquã propter
 bilis multitudinem ad aluum defluentis,
 quæ irritet ad excretionẽ. Nonnunquã
 verò ipsa alui potentia retentiu facta
 debiliori, hoc idẽ euenire: expulsua verò

eius atque intestinorum forti existente.

Nota.

Humorum autē in pueris delitescen-
tium, atque fluorem aliquē proritantium,
nota sunt istiusmodi: quod ex bili deiectio
spicea, biliosaq; cum acore quodā, & sine
omni mora excernatur. Ex frigidityte
verō, siue pituita alba, pituitosaq; cū tor-
mine, etiam absque mora, nisi pituita te-
nax, contumaxq; extiterit, deiectio spe-
ctabitur.

Prognos-
tica.

Quum autem huiusmodi malū fre-
quens sit, & fermē nulla domus siue fa-
milia sit, quod nō quotannis quasi hūc ex-
periat morbum, collibuit prognostica
ex certis autoribus haud incerta cōnecte-
re. Hippoc. enim in Aphor. lib. 6. Apho-
ris. 1. In longis intestinorum leuitatibus, si

Ructus aci-
dus.

ructus acidus fiat, qui prius non erat, si-
gnum bonū esse indicat, quia cibos ventri-
culum amplecti, atque circa eos se circum-
stringere, certoq; tempore retinere, &
rursus ad inferiora, non tamē omnino in-
coctos

coctos deijcere. Sunt qui intelligant ex hoc
 calorē se non nihil recepisse, ructumq̃ tum
 talem edere, & sic bonū esse indicium. Cæ-
 terum in eodē libro idem autor, Aph. 17.
 Lippientem alui profluvio corripī bonum
 esse, cōtendit: quia humorū abundantia si-
 mul, autore Galeno, euacuetur, atq̃ ad in-
 feriora retrahatur. Haud dissimili modo
 in Aph. 48. Lienosis difficultatē intesti-
 norum supervenientē, bonū esse, idē protu-
 lit. Simili modo Avicē. diarrhœam late-
 ris curare apostema ostendit lib. 1. Fen. 2.
 Doct. 1. cap. 8. In libro autē. 3. Fen. 16. Tra-
 cta. 1. cap. 2. dicit omnia Ventris profluvia
 post ægritudines acutas, symptomata esse
 mortalia, quia corruptionē repentinā por-
 tendere. Hippocrates autē, deiectiones ni-
 gras, qualis sit sanguis niger, sponte ve-
 nientes siue cū febre, siue sine febre, peſsi-
 mas esse adfirmat: & quāto colores ma-
 gis pravi fuerint plures, peius. In summa
 diarrhœa omnis ex tēperamenti malicia

profecta, cū virtute debili, mortis est indicium. Atque illa in qua percussus arteriæ vermicularis, & formicans adparuerit qui nō ex cibi, vel medicamēti administratione corroboretur. Adiectione porro sincera difficultatem intestinorū esse malum Hippoc. Aph. lib. 7. Aph. 23. innuit. Nihil enim mirū esse Gal. interprete, si in talibus deiectionibus aliquod intestinum excedatur.

Curatio.

Communiter tamē hīc observandū est alui fluore in principio æquo, bonoq; non nihil sufferendū esse animo, quo verò in-erescente, facultatumq; vireis atterente, haud incunctāter reluctandū esse, enitendumq; quo tandem supprimatur. Quare Auic. lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. Fluorem infantium nō fortē, neque nimis copiosum censet esse ferendū: maximē verò cū sine bili atque cruore demittatur. Eiuscemodi enim medicamento vice esse, à plerisque autumetur quod in eo quod corruptū vitia

Auicennæ
medicamē-
torum au-
xilia tria.

tiatum q̄ sit, proyiciatur. Huic autem magis scilicet, magis q̄ irrepenti, & iustum limitem excedenti tribus medicamento- rum auxilijs succurrendū esse. Primum est

Primum.

Ut embrochis aluus cōpescatur, quæ fiant

Embrochē.

ex aqua calida cum decocto seminis rosarum, aut cymini, aut anisi, aut apij. Sequutus in hoc Aeginetæ consilium, qui in alui fluore puerum infestāte epithematis sistendum esse, docet, quæ cōprimendi facultate prædita sint, lanæ inspergendo vel cyminiū, vel anethum vel apiū. Prodesse ad hæc semen rosarum inserere, & vniuersum simul feruefactum arefacere: de quibus in lib. 1. auctoris, commentariolo

primo, mentionem fecimus. Secundū auxiliorum est malagma, siue cataplasma, quod emplastrum vulgò dicitur, ex cymino, rosis in aceto infusis, donec istiusmodi remollescant, postea tritis, & calefactis, & cataplasmatibus modo ita adpositis. Aut speltam in aceto coctam, malagma-

Secundum
malagma-
ta.

Tertium
potiones.

Coagulum
lac in ven-
tre coagu-
latū dissol-
uit.

Nux.

tis modo adplicandam esse. Tertium est,
Vbi predicta non inuerint, in potu admi-
nistrare coaguli hædi genera decem, vel
paulo plus. Quum autem lac in ventre
coagulatum dissoluat coagulum, hoc ne-
quaquam cum lacte propinandum, sed
eius loco luteum oui, vel panis micam in
aqua coctam, aut triticum fractum, &
in aqua coctum in forma pulmenti præ-
bendum est. Nucem præterea decorticatā,
& tritam, cū saccharo frixam, & aqua
frigida, in quantitate auellane vnus,
in hoc casu puerorum, idem autor maxi-
mè commendat, Can. 3. Fen. 16. Tract. 1.
capi 1. Post hoc aliud idem medicamen-
tum infert, in profluvio puerorum ex den-
titione prouenienti profuturum, videli-
cet, papaueris, & granorum myrti, liba-
ni, siue thuris masculi, cyperi singulorum
semi drachma, quibus tritis, & in lacte
dissolutis, puero, vt ex hoc sugat, siue bi-
bat propinandum. Hæc Auicenna.

Eland

Haud fermè diſſimili curandi modo,
ſcilicet triplici, puerorum aluum *Razes* *ma*
conſtringere docet. Quorum primus eſt, *di tres au-*
qui *xiliorum.* *Avicen.* *poſtremus, ut ori puerorum*
medicamenta adminiſtrentur, ut ſi à bi-
li fluor profluxerit, ſyrupus roſarum, vel
è malis macianis, punicis ſive granatis,
cum menta. Itidem de ſpodio in aqua in-
fuſo adciſiat ad ſorbendum. Aut ſemen
lapathi, apud vulgus lappatij dicti, cum
oui luteo adſati præbendum eſſe. Lapathi *Lapathum*
enim ſemen manifeſtam quandam ad- *Lappatiū.*
ſtrictionem obtinere Gal. ſcribit lib. 7. de
ſimplici. medicam. facultate: ut & dy-
ſenterias, & diarrhœas, ſive profluvia
ſanet, & maximè oxylapathi, hoc eſt, *Oxylapa-*
lappatij acuti vulgò dicti. Quare Gale- *thum.*
nus ex iſtiusmodi ſemine, & vuarum
paſſarum acinis adſſatis, vel ambuſtis
ſemi vnciam, & glandium, atque ſem.
papaveris albi ſingulo. drachmas duas,
tum croci aureos quatuor, ſingulis tritis,

Medicame-
tum exper-
tum.

Glandes.
Supposito-
ria.

cum succo cotoneorum, siue syr. rosarum
medicamentum concinnat, experimento
insignitum, notatumq³. Porro si à pituita,
vel frigore profluuiū euenerit, tunc Gal-
liæ cum succo cotoneorū drachmæ. i. par-
tem vnam, vel libani totidem admini-
strare, docet. Deinde verò malagmata
ventriculis eorum adplicāda esse, ex de-
cocto sumat, cum hordei, & milij farinis
confecta, quæ cataplasmatibus modo adposi-
ta actutum fluorem repressura. Siue crocū,
myrrham, & cerā cum mero conficien-
da esse, & simili modo adplicanda. Ter-
tium verò auxiliorum sunt glādes, apud
vulgares, suppositoria. Fluor enim, inquit,
si per prædicta compescatur, bonum qui-
dem, sin minus, adcipe acaciæ, cerussæ
ana. drach. i. opij drachmæ vnius partē
septimam, & in balani formā redigito,
quo alui osculo intruse, profluuium sine mo-
ra arcebitur. Neoterici autem nostri in
fluoris alui puerorum compressu, imprimis
hoc

hoc student, quò nutritrix legitima fruatur
 dieta: quemadmodum sunt oryza, lentes,
 vinum nō admodū tenue, caseus sine sa-
 le, oua dura, quæ ephtha à Grecis dicun-
 tur, lac caprinū in quo lapides igniti ex-
 tincti sint. Laudantur quoque ab his bal-
 nea ex aquis adstringēdi vim habenti-
 bus instructa, vt ex plantaginis, sumac,
 balaustia, alysq; id genus comparata. In-
 ter istiusmodi autem Gulielmus Placen-
 tinus minimè contemnendus, Manardo
 teste, medicus, in puerorū profluvio aluū
 adstringere, persuadet cum puluere myr-
 ti, & sanguinis draconis cum lacte pro-
 pinato.

Oua dura
 Grecis eph-
 tha.

G. Placen-
 tinus me-
 dicus infi-
 gnis.

Conducere postremo hīc apud aliquos
 reperitur, quædam adstringentia epithe-
 matis loco administrata, vt sunt hordei
 farina, cum succo plātaginis, vel conyza,
 hoc est, pulicaria, & modico aceti, atque
 oui albo, quibus commistis, pulueres hu-
 iusmodi addendi, vt rosarū, thuris, glebæ

Epithema
 ta.

armenia, quam hodie bolum armenium
vocant, sanguinis draconis, absynthij, ba-
laustiarum, & id genus similia. Vlti-
mo coquatur rosa in aqua, in qua decum-
bens sedeat tibiae, pedesq; cū hac foveat.

Morbus quadragesimus primus,
Aluus sicca, dura, adstricta.

Aluum adstringi in pueris Avicen.
lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capitu. 3. ostendit.
Causa. Cuius causam esse adserunt, vel quod bi-
lis parum adfluat ad aluum, siue quod ve-
nae plus iusto ad se attrahant, vel quod
calor sit supernuacaneus hepatis, & renū,
excrementa exiccans, aut ob somnum pro-
lixum, aut quod potentia sensibilis nonnihil
sit sopita, ex multarū humiditatum, ex-
timationem non sentientium, redun-
dantia. Atqui siccioris alui causas ponit
istiusmodi Galen. Aphoris. lib. 2. Apho-
ris. 20. Primam scilicet cibi minorem ad-
sumptionē, quā hepatum potentiā con-
gruat. Alteram quod bilis parum cōfluat
ad

ad aluum. Tertiam propter potentiæ re-
tentricis robur excrementa exiccans. Si-
gna per se satis sunt nota.

Curationem Razes præscribit talem, Notæ.
Curatio.
Ut nutrici parum cucumeris syluestris
præbeatur, deinde altero die puerum la-
clet. Aut excrementorum murium su-
mat scrup. & cum pinguedine renū hir-
ci in balani formam redigat, quo aluus
clementer irritabitur. Enemata hic etiā Enemata.
ab eodem admittuntur Raze. At Avi-
cenna murium stercus in tritum granorū
poundere administrandum in vno coclea-
ri aquæ contendit: quod tamen securius,
& minori abominatione in glandiū for-
ma vsurpabitur. Itidē & mellis in glan-
dis formam redacti præstabit vsus. Atq;
radicula maluæ, siue betæ huiusmodi
modo administrata. Hoc idē mētastro in-
esse, idē Auic. tradit. Similiter & in iri-
dis radícula. Mellis præterea nōnihil pue-
ro degustandū esse, insinuat, quod vētricu-
lum,

Iridis radi-
cula.
Mel.

lum, & intestina exterat, abluatq̃. Non minus hoc in casu competere, idē adnuit, & terebinthinæ resinam ciceris magnitudine Ventriculo vacuo ingestam. Proculdubio in hoc Aeginetæ sententiam sequutus, qui lib. 1. cap. 6. scribat: Si infantis aluus durior, & adstrictior sit, melle cibo adiecto nutriendus sit. Quod si ne tum oletum quidem fecerit, ægerrimeq̃ cunierit, resinā tūcterebinthinæ adijciendam esse. Constat enim hanc non solum aluum citra noxam solvere posse, verum etiam viscera omnia, iecur, lienē, renes, pulmonemq̃ abstergere. Ad hæc pueri Ventrem cū oleo olinarum tepido clementer comprimendū, atque illiendū esse, præcipit. Porro & Vaccinum fel femori, seu coxæ, aut Umbilico superpositum ab eodē adprobatur autore. Cuius sententiā Dioscor. lib. 2. cap. 70. confirmat, quum omne fel deijciendæ alui cupiditatem proritare, conuincat: præsertimq̃ in pueris, si quis

con

Terebinthinæ resinæ vires.

Fel vaccinum.

Fel.

concerptas stuppas eo madentes sedi im-
posuerit. Sunt qui huiusmodi saltē vmbi-
lico adligatas eadem præstare, certo ad-
firment certius. Nonnunquam etiā ex eo-
rum tantummodo lotionē eiuscemodi ex-
pectanda esse cōmoda. Præterea cyclami-
ni radicem emplastri modo adpositam,
aluum ciere, perhibet, quod idē Dioscor.
lib. 2. capi. 153. confirmat, hanc enim sedi
adducenda excrementa in lana adplica-
ri, profert, atque vmbilico, pectini, coxen-
dici, idem succus eius ille illitus, aluum
mollire. Nonnulli mel crudum pāno lineo
inuolutum glandis forma sedi imponunt.
Alij nucis testam butyro infarciunt, &
vmbilico adponunt. Cæteri cū felle bouis
hoc efficiunt, atque cum felle ventrē vni-
uersum perlinūt. G. Placentinus cū melle,
& sale, balanum cōficere docet, siue mel-
le, & stercore murium. Venti subinde
stuppam in decocto absynthy, alōēs, & pu-
legij infusam imponunt. Postremo cattī
inte

Cyclami
nis radix.

intestina, ventri calidissime adposita, plurimum censerre, in antiquissimo deprehensum est Enchiridio.

Morbus quadragesimussecundus, Lumbrici, tæniæ, ascarides.

Mali descriptiones.

Lumbricorum differentiarum tres. Teretes & rotundi, latissimi.

Ascarides.

Lumbricorum differentiarum ex Galeno.

IN ventre infantis vermes nasci Avicenna lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. innuit. Cuius rei Hippocrates Aphor. lib. 3. Aphor. 26. mentionem facit, cum iam adolescentibus, inter cetera quæ enumerat mala, lumbricos rotundos, & ascarides euenire, recitet. Sunt autem in summa tres lumbricorum differentiarum, iuxta Aegineta etiam sententiam. Una quidem quæ tereti, & rotunda forma est secundum crassitudinem. Altera verò, quos lumbricos latos nunciant. Tertia, quos Græci ascarides nunciant.

Istiusmodi quoque vermium Galenus differentiam aperuit in Aphor. Comment. 26. lib. 3. in hunc modum: Ascarides, inquit, sunt tenues quidam lumbrici, qui

in

in parte maximè inferiore crassi intesti-
ni gignuntur. Hinc in lib. Epidemi. 2. ita
scripsit, αἱ ἀσκαρίδες δὲ ἐν αὐτοῖς. hoc est, ascari-
des in occasu, quanquam locus ille secus à
nonnullis, sed perperā interpretetur. Hu-
iuscemodi adparent plurimi in iumentis
malè coquentibus, quorum malam coctio-
nem fautor indicat excrementorū. Aliud
verò genus lumbricorum & rotundo-
rum, qui in superioribus magis intestinis
generantur: adeò quòd ad ipsum quan-
doque ventriculū adscendant. Multo ve-
rò plures hos quàm ascari-
des gigni in pueris, idem adiungit autor. Tertium la-
torum est genus lumbricorū, qui & lon-
gissimi sunt, & per tota extenduntur in-
testina, de quibus nullam fecit Hippocra-
tes mentionem: quoniam non eius erat
propositum, de singulis agere passionibus,
quæ mortalibus accidunt, sed de illis tan-
tum quæ singulis ætatibus accidunt. Idem
verò Galenus in Isagoge sua Ventris,
& in

Ascarides
in occasu.

Rotundi.

Rotundo-
rum multò
plures quàm
ascaridum
in pueris
gignuntur.
Lati.

Animaliū,
in ventre
tria gene-
ra ex Gal.
ifagoge.
Teres, &
rotundum.

Ascarides.

Lumbrici
lati.

& intestinorum, tria esse genera anima-
lium protulit. Primum quod tereti, &
rotunda sit forma, longitudine palmari:
aliquando verò maius, & vsque ad sto-
machum progrediens. Aegineta autem
hoc amplius reddit copiosum scilicet esse,
& hoc genus abundare, atque in gracili-
bus intestinis plerunque consistere, supe-
rioremq; ventriculum subire, quare per
os sæpenumero reijci: fuisseq; præterea qui-
bus per nares etiam hæc reiecta anima-
lia fuerint, esseq; hoc genus infantibus
peculiare, & quotidianum. Secundū ve-
rò genus facere idem attestatur. Galenus
quas Græci ascaridas adpellant, quæ in
extremo longanone plerunque inuenian-
tur, & post pubertatem fiant. Eiusmodi
genus Aegineta vermibus simile esse
dicit, & ubi primū se claudat intestinū
illud, non longè ab ano inueniri, grauesq;
illic pruritus excitare. Tertium verò quos
latos lumbricos vocant, adeoq; longos in-
ter

terdum, ut totius intestini longitudinem
 aequent: à quibusdam vero fascias, pro- Fasciæ.
Taniæ.
 pterea quod his similes sint, vocari pa-
 riter & taniæ. Paulus hic addit, hoc ge-
 nus nil aliud esse, quam mutationē adna-
 ta in interiore intestino mēbranae, in ma-
 teriam animalis modo mobilem, quæ
 sæpenumero tota reddatur longitudine in-
 credibili, aliquando autem pars eius ali-
 qua. Hinc V. Marcellus ratus est Plinium Tineæ ven-
tris.
Ventris a-
nimalia.
 dixisse, triginta cubitorum tineas ventris
 aliquando visas. Lumbricos autem Pli-
 nius sæpe ventris animalia, nonnunquam
 tineas ventris vocitat. Vult autem Mar- Tinearum
interpreta-
tio apud
Marcellū.
 cellus tinearum adpellationem secundo illi
 generi ascaridum competere, ob similitu-
 dinem, quas, quod hæreant, motuq; ca-
 reant, Græcos sic appellasse. Ad hæc ad-
 monitum esse vult lectorem Plinij, ut si
 quando tineæ, lumbrici legantur, teniæ Tineæ pro-
teneis le-
gendæ.
 legi posse, fortè ex lapsu scriptorum, aut
 castigatorū græcorū medicinæ parum pe-

R

ritorum eueniente. *Vulgus medicorum primum horum genus, Vermibus in aceto generatorum equiparat. Secundum verò seminibus cucurbitæ, quod in crassis intestini procreetur. Tertium serpentibus, in gracilioribus intestinis exortum. Celsus tantum duo genera lumbricorum in suis agnoscit scriptis, rotundos, & latos: tertij illius scilicet ascaridum, nullam mentionem faciens.*

Causæ. Omnium verò eiusmodi ventris animalium species, & causa, & origo, inquit *Aegineta*, est cruda & crassa, pituitosaq; materia, & putrefactio huic functioni est idonea cuiusmodi in pueris colligitur, & in alijs pariter ætatibus, his scilicet qui ultra satietatē auidē se ingurgitāt. Verū nunquam à calida & acris, vel melancholica materia: nam hæc nutricadi naturam supergressa ad lumbricorū constituendā originem inepta est, & prorsus inaccommoda: imò verò etiam contraria: corrumpunt

punt enim hos biliosa praesertim excrementa. Hæc Aegineta sunt verba.

Eadem fermè & Galenus de causis lumbricorum Aphor. lib. 3. Aph. 26. recitat, lumbrici ait, atq; ascarides videntur alijs animalibus proportionaliter gigni, quæ non ex seminibus, sed ex putredine habet generationem. Sola enim putredo hæc non est ad generandum sufficiens, sed & calore plurimo indiget. Cibus autem plerumque corrumpitur in vêtre, & præcipuè in inferiore paerulis. Verum caliditas in valde tenellis nondum materiam obtinet: in adultioribus autem & materia idonea est, ad animalium talium generationem, & præterea caliditas adest. Hæc Galen.

Accidere porro plerumq; cunctis lumbricos tereteis habetibus, vellicatio intestinorum, Paulus indicat, & ventris, & tusses non magnæ, aridæ, irritantes: quibusdã verò etiã singultus, somniq; cū tremore, & irrationalibus, stultisq; ex somno resurrectio

Notæ, im-
primis lon-
gorum &
latorum.

nibus. Nonnullos verò cum vociferatione
exurgere, & prosilire, sed rursus deijci,
& in soporem prosterni. Pulsus autē esse
inordinatos, & febres augeri nullo ordine
pererrātes, cum magno articulorū algore,
quæ per tertiā, vel quartā diei noctis ve
partum hominē temerē inuadāt. Puerulis
verò & grādiōribus natu cū prominente
lingua exhausta, stridorē fieri dentiū, ocu
los cōniungere, silentiū amare, & excitanti
bus indignari, stomachari, oculosq; appa
rere, & malas suffundi rubore, atq; rur
sus mutato colore liuescere. Breui verò
hæc & ex interuallis fieri, quorundam
verò stomachum petentes, nausearum &
vellicationum autores esse, cibum ad
hæc laborantes auersari: coactos. verò nau
seantes vix deglutire, oblatumq; ac
sumptum cibum euomere. Non paucis
etiam ventrem deijci, cum esculentorum
corruptione, eundemq; instar tympani
inflari. Reliquum autem corpus præ
ter

ter rationem liquefieri, & tabescere, neque ulla fame præscripta, aut euacuatione immoderata admissa. Caterum non omnibus idem persequitur autor, prædicta singulatim esse inquirenda inditia, sed tantummodo ea quæ principatum obtineant: aliquando verò plurima. Solent præterea ex huiusmodi animalculis sese in intestinis circūuoluentibus, cum rotantibus, tum mordentibus, cum febrili ardore vapores ad cerebrum ferri, prauis, ex coaceruato in ventre putrido humore nati: quorum tum utrinque, siue sigillatim, in curatione administranda, rationem esse adhibendam admonet.

Proinde longorum, siue latorum lumbricorum notas Guliel. Placent. eiusmodi esse notat, oculorum videlicet croceum, vel pallidum colorem, famis tolerandæ impatientiam erosionem vehementem, syncope ventris dolorem, præcipuè sub famis tempore: aquam ex ore progredientem,

Teniarum
notæ ex
Paulo.

vel supernè, vel infernè, præcipuè cum labor, aut febris ardua laborantem infestet, narium frictione perennem: oculos cauos, anhelitum fætidum. Teniarũ porro ventris indicia P. inducit istiusmodi, quòd febricitantibus quoque per diuturnas agitudines adcidant, vellicationes adiacetes stomachi inferetes, & à cibis auersionem adpetitus inducentes, alimentiq; incontinentiam, viuificatũ enim in intestinis animal, nutrimentum rapere, & assumptum cõsumere, ita vt cõfestim altero opus habeat: quod si sumere quis supersedeat, intestina lancinare. Adcedere autem his, & cen vmbra comitari, corpus strigosum, & malè habitum, imbecillitatemq; cum turba corporis. Infallibile autẽ, accertissimũ indicium esse, si cum stercoribus quædã semini cucurbitæ similia excernantur.

Ascaridũ.
Notæ.

Ascarides autem quum plerunque in extremo languore consistere soleant, & quàmprimum secludat intestinum illud,
prope

prope anum conspiciantur, graues in his partibus pruritus excitant.

Ceterum quia vermium genus infantibus, quam alijs etatibus peculiarius, Prognostica. magisq; quotidianum, teste Paulo, Vermium genus infantibus magis, quam alijs etatibus peculiare. magna quidem ex parte cum febre est. Sunt autem ex recentioribus qui vermes cum febribus, à natura sui, semper mali alicuius esse portentum autument: quia Lumbricorum in febribus ortorum rationes ex Paulo. particula alicuius oblesionem, tum materia corruptionem, atque delictum aliquod portedere. Cuius rei ambiguitatem Paulus in hunc soluit modum: Vermes inquit, si circa febrium principia prouenerint, substantiam ex discrimine subiecto obtinere. Circa summos vero vigores, ex malitioso, putridoq; morbo. Circa autem relaxationem febrium lumbricos scaturire rotundos ex omnium in melius mutatione. Adserit nanque Hippocrat. bonum esse, ac utile lumbricos etiam rotundos incuntis egrimonie indicatorium pro-

gredi, sed hos ocysimè perire.

Medicorū
recentium
prognosti-
cationes.

Neotericorum autem mense est circa fe-
brium exordia, vermes aut viuos, aut
mortuos excerni: illos autem mali indicij

Febris infe-
quens ver-
mes, sem-
per malū.

esse, quia corruptionem magnam hos effu-
gere, vt in peste: hos autem melioris esse
notæ, quia mundificationem indicare. Cir-
ca morbi autem statum ambos malum

quoddam portendere: fortè quòd febris
insequens vermes semper malum sit,
quia lumbricorum nutrimentum absu-
mat, & putredinem adaugeat lumbrico-
rum alimentum: & lumbrici ex febre
inflammentur, & calecant, tum tor-
queantur, moueanturq̃, vt eò magis lum-
bricosum molestent, adficientq̃. Iuxta
finem autē febrīū viuos adhuc boni quid-
piam representare, videlicet mundifica-
tionis argumētū. Mortuos autē mali nūcios
esse, quia ex materia malitiosa prouenire.

Prognosti-
con Razis

Aliud addunt prognosticon Razis
& Auicenna adnuentes vermium exi-
tum

tum absq³ febre, cum sanguinis autem & Auicennæ.
 profluvio, malum esse, quia in corpore,
 & intestinis innocumentum inesse, in-
 terpretes nonnulli referunt. Sanguinis
 autem fluorem lesionem aliquam ex ver-
 mium erosionem illatam indicare.

Proinde ex recentioribus quidam Ioan- Prognosti-
 nes Matthæi cognomēto de Gradi dictus, cum Ioan-
 Alzarauij fortē autoritate persuasus, nis Mat-
 Ascaridibus abundantes breuioris vitæ thæi.
 fore, dyjudicauit.

Postremo lumbricorū curādi præcipuam Curatio.
 esse intentionem Paulus expulsionem es-
 se ostendit. Prorsus enim expelli ventris
 animalia conuenire, siquidem plerosq³
 quoniam hoc neglexerint, ab ijsdē corrosos
 euulsosq³, & extinctos fuisse. Neque etiam
 deesse, qui adserant se vidisse per in-
 guina languentis lumbricos prorepsis-
 se. Præstare igitur ipsos expellere, ex-
 pelli autem si prius enecentur: enecari au-
 tē medicaminibus maximè amaris. Mi- Mixaria.

R 5

xaria igitur decocta sic habentibus, vel
potui, vel esui offerenda.

Razis cu-
ratio prio-
ri nonihil
diuersa.

Cui nonihil reluctari sententia Razis in
lib. de puerorum adfectibus videtur ne-
quaquam concessurus ut medicamenta po-
tui, scilicet tantum forinsecus puerulis offe-
renda esse. Ex quibus seligit medicamini-
bus hoc primum lumbricos quasi deturba-
turum. Adripere enim iubet cymini cum
felle tauri recenti mistum: & ventri em-
plastri modo adplicatum. Hoc ego medica-

Historia.

meto puerum curavi lumbricosum, ex cuius
adpositu & vermes ab intestinis prolicie-
batur, & per umbilicum incomparabilis mul-
titudinis, aqua, saniesque profluebat. Ad
Razem vero redeamus, qui et lupinorum
agrestium drachmam unam accipere do-
cet, & cum Psyllio, & baccis lauri, atque
bile laurina concinnare. Quotidie etiam
lumbricis adfectos bibere, vult ex decocto
sebesten: aut oleo oliuarum, siue de amygd-
lis dulcibus, siue amaris, ut aliqui intelli-

gunt

gunt Auicen. aquam de santonico (quod nos herbam lumbricorum nominamus) Sautonicū.
Herba lum-
bricorum.
 puerulo cum lacte tribuendum statuit. Se- Santonici
semē apud
nos vulga-
re.
 minis eius apud nos vsus est familiaris: cuius etiam odorē vermes fugere, atq; infe-
 riora petere intestina traditur. Cuius &
 in locum surrogamus origanum. Plenio- Origanū.
 rem si quis de lumbricorum curatione de-
 sideret notionem, & precipuē neoteri-
 corum, Michaëlis Saphanorolæ Medici
 celeberrimi, de Vermibus legat librum,
 omnia satis abundē hīc necessaria disse-
 rentis. Vniuersa enim vel singula in præ-
 sentiarum velle recensere, nostri, neq; ab
 initio, neque nunc, erat instituti.

Morbus quadagesimustertius,
 Umbilici inflammatio, vel eius aus-
 gmentum Auicennæ, ἰχόμφαλον apud
 Græcos dictum, vmbilicus pro-
 minens Celso, prociduus
 Plinio, quid
 sit.

Pa

Morbi de-
scriptio.

Vmbilici
inflamma-
tio.

Vmbilici
apostema.
Vmbilici
prominen-
tia.

Vmbilici
augmentū.

Vmbilicus
prociduus.

PArvis, et nuper natis puerulis Vmbilici inflammationem contingere Hip. Aph. libr. 3. Aphorif. 24. adnuit. Cuius verba Galen. interpres eius corroborat, Vmbilicorum enim inflammationes, non multò antea præcisorum, non sine ratione nouiter natis puerulis adcidere, non secus ac si alia pars foret Vlcerata. Ob quam etiam rem Auic. lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. cap. 3. adserit, infanti adcidere apostema, propriissimè tamen quando Vmbilicus incidatur. Itidem Razis in libro de puerorum adfectionibus capite 2. Vmbilici prominentiam pueris adcidere, quando plangant, vel vociferent, aut tussi concitantur magna adprobat. Hic verò obseruandum Vmbilici interdum augmentum, autoritate Auicen. prouenire, quòd Celsus prominentem vocitet Vmbilicum, Plinius verò prociduum, adfectum scilicet non sub inflammationis, siue apostematis genere contentum, sed in ramicis, siue her

herniæ, aut rupturæ specie comprehensum, de quibus in processu singularis sermo faciendus.

Constat idcirco ex Galeni verbis istius- Causæ.

modi inflammationis causam nonnullam obuenire ex præcisionis umbilici incômodo. Aut ex eiusdem aliquo dolore, aut ligatura perperam facta: ex quibus deinde humores facillimè ad locum adfectum confluant. Rarior hic planctus vultusq; vociferationes, aut tussiculas immoderatas: item casus, percussionesq; pro causarum origine ponit. Sunt qui umbilicum tumere, nonnunquam velint propter materiam aquosam, siue ociosum aliquem humorem delapsam, ex ligatura, & præcisione istic detentam. Natura enim quæ prius materiam huc deferebat, istiusmodi operis nondum oblita, fœtum adhuc in utero existente, nunc verò ob impedimenta modo dicta, id præstare non potest, quare locum illum nonnihil tumescere, in confesso

Umbilici
tumor.

fesso esse omnium fertur.

Nota.

Idcirco mali huiusmodi nota nulli non sunt obuia, exactius etiam rem ipsam perpendenti, tum eius procatarticas res consideranti.

Curatio.

Remediū
Auicennae
Singulare.

Contra malum hoc Auicenna vnum singulare excogitauit remedium, quo communiter vti liceat. Recipitur enim Nardiceltica semuncia, qua contrita, & cum terebinthina resina in vncijs 3. comista, deinde cū oleo sisamino, siue amygdalarum dulciū, aut in forma Epithematis, siue vnguenti administratur. Nos possemus stuppam eiusmodi rebus infusam vmbilico doleti adponere. Sūt qui in priori forma adplicari doceant, aut emplastri, vel epithematum vice cōposita, cerussam lotā, & lithargyrū, cū oleo sisamino, & terebinthina resina. Razes autē lapinos amaros, et pecias panni linei, comburi, docet, deinde verò cum vino perfundi, atq; stuppa iniecta vmbilico imponi. Vult præterea flexilem

Vms

Umbilicum iuxta oras eius cauterio curan-
dum esse, minimè tamen hoc in loco flexi-
li attentandum esse, ob nimiam cutis eius
teneritatem.

Morbus quadragessimus quartus
Λιθιασμος, calculus.

INter reliqua quæ iam pueris cum ma-
gis adoleuerint eueniant mala, Hip-
pocr. Aphor. lib. 3. cap. 26. Calculos enu-
merat, quos, propriam puerorum esse
passionem Galenus super eodem loco com-
monstrat. Quem quidem sanè Aegineta
sectatus in 3. De arte medend. libr. capi.
45. Calculorum in Vesica concretio-
nem puerilem vexare ætatem plerunq;
ostendit. Quorum sententiã Arabes imi-
tati, ut Auicenna & Razes, qui plurimum
in infantibus calculos fieri in Vesica in pro-
uectioribus verò in renibus adstruunt. Cau-
sas verò istiusmodi calculorũ in pueris eue-
nientium Gal. esse edacitatẽ aperit, nõ pau-
cos

Descriptio
morbi.

Calculus
puerorum
passio pro-
pria.
Causæ.

Causæ

cos crudos humores coaceruantem, ex quibus pars crassior vna cum vrinis ad vesicam perueniat, lapidum generationis materiam efficiens. Adcedere vero alteram causam, scilicet caliditatis vehementiam. Et senes quoque aceruare humorem crudum non paucum, non propter edacitatem ut pueri, sed propter potentiae concoquentis imbecillitatem, quum tamen colorem fortem non habeant, qui ex materia crassa vaporem resoluens lapidem generet. Eadem & in Epidemiorum Hippocratis lib. 6. ab utrisque inculcantur autoribus. Pueris videlicet magis vesicae quam renum calculos adcidere: nam & si crassa materia quae lapidis generationi sit adcommoda in pueris ad renes perueniat, tamen quia calor innatus his ipsis multus insit, virtusque naturalis robusta, ideo crassitatem dissolui illam, deorsumque pelli, ac in vesicam reponi, minime in renibus permanere. Vesica autem quum sit frigida:

gida, nervosa, & exanguis, amplamq;
habeat capacitatem, fieri, ut illic concre-
scat, coagmenteturq;, ac in lapidem cras-
sities illa transformetur. Contra vero cū
senescentibus euenire, quibus renum cal-
culus magis accidat, quod calor eorū, vir-
tusq; imbecillis sit humores crassos ex re-
nibus deorsum pellere non potens, qui cū
illic remaneant facile, tunc in lapidis du-
riciem transire. Num itaque Hippocrates
ait, Concretio puerulis post Vrinam ma-
gis, quia calidiores? Ex quibus liquet pue-
rorum caliditatem esse cōcausam, ut ve-
sicae lapis procreetur, at glutinosam cras-
siciem, quæ proculdubio ex Vrinae cras-
sicie proueniat, quæ caliditatis humo-
rum est concretio, veram causam esse,
constabit. Hinc Paulus materiātam in
calculis gignendis occasionem esse, cras-
sum, & humosum, terrestrē de hu-
more innuit. Effectricem vero, fla-
grantem renum ardorem, siue Vesicae.

S

Nonnulli autem exponūt in pueris omnes
 potentias esse robustiores, tum ipsos cali-
 diores etiā existere, quare humorū cras-
 scies ad renes descendat liquida, & re-
 soluta, quæ deinde facile ad vesicam de-
 pellatur, receptaculum scilicet frigidum,
 nerueum, ex æqueq; in quo meatuum am-
 plitudo prohibeatur, propter ostioli in ve-
 sica arctitudinē, longitudinemq;, quò fa-
 cile illic materia humorum supernuacanea
 inflammetur, atque in crassiciem denuo
 immutetur.

Nota.

Istiusmodi tunc mali notæ ex eiusmodi
 iuxta Paulum arguuntur indicijs, quòd
 lotium edatur crudū, & subalbidū conti-
 nuè, cum sabuloso sedimine: pueri quoque
 subinde cōtrecent verēda, atque intēdāt:
 identidemq; in lotiū, vrgantur, & vri-
 strāguria: na stranguletur, quod mali genus sparrā-
 glap Græci nominent. Haud absimili mo-
 do Razes huiusmodi significari notis in
 vesica calculum, arguit. Stranguria scili-
 cet,

cet, & dolore immodico, vrinæ tenuitate,
virgæ pruritu, eiusq; perenni surrectione.

Paulus circa curationem istiusmodi ^{Curatio.}
admonet, in vesicis puerorum calculos ef-
ficacioribus, & vehementioribus admi-
niculis superandos esse. Nos vero iuxta
communem vsum, calculosos pueros, etiã
Razis autoritate, quotidie balneamus, cū
maluarum, altheæ, sem. lini, siue parita-
riæ, & id genus aliorum decocto. Puden-
da præterea eius frequenter cum oleo
perungimus. Aquam insuper ex moris
bacci lacti infriatam in potu præbemus.
Ad hæc sanguinis hirci, & puluerẽ scor-
pionis vsti, cum oleo scorpionis, siue lilio-
rum alborum commiscemus, verendisq;
adponimus. Admonet porro Aegineta,
quod si supra modum calculus creuerit,
& ceruix vesicæ obturata sit, per quassa-
tiones ~~καὶ~~ ^{καὶ} ~~θεοῦ~~ ^{θεοῦ}, vel lithotomia, vten-
dum esse, quemadmodum in volumine de
Chirurgia demonstratur.

Morbus quadragessimusquin-
tus de meientibus intro,
ex Paulo.

Morbi de-
scriptio

Vrina in-
trorsum
reddita.

Curatio.

Frigiditas
resolutio-
nis vim ha-
bet.

L Angorē, depressionēve muscu-
li vesicae circa collum, eam adfectio-
nem facere, Aegineta lib. 3. de arte me-
dendi capi. 45. prodit, qua adfecti intror-
sum Urinam reddere solcant, quapropter
pueris praecipue accidere, consuenisse. Pro-
inde ijs communiter quae robur inserant,
quam maxime utendum esse, puta anelaeo
calido, atque consimilibus, cauentes quae
valde refrigerēt, fouentes verò undique
magis, quantum fieri possit, calidis: frigi-
ditas enim, tanquam resolutionis, quam
paralysim dicunt, vim habet. Tum si phy-
sicè perpetrare volueris, Galli adcipias
gutture crematum, aqua tepida ieiuno po-
tui exhibeto. Siue leucanthemi flores, mo-
do non absimili. Aut erinacei testiculum
in vino fragranti bene friatum porrige.
Nepetham item, atque myrrham sub
som

*Somnum, aut ruta sylvestris semen frictu
per triduum propinato. Pudenda denique
eo malo tentati creta cimolia cum succo
perdicialis circumlinito. Hæc ex Paulo.*

Morbus quadragessimus sextus, In-
guinis ramex, quem Græci βοβω
Item intestinorum
ramex, quem ὑστερονιάς
vocant.

Rupturam, siue herniam, aut tumo- Morbi de-
scriptio.
*rem, vel inflationem in puerorum in-
guine provenire Avic. lib. 1. Fen. 3. Doc. 1.
capi. 3. tradit. Hoc autem mali ab Aegi-
neta ita describitur fieri, quum disrupto
quidem peritoneo intestina delabentur,
tunc nimium sanè curatu difficile esse: si
autem extenso peritoneo laxum redda-
tur intestinum, sanabilius reddi. Pueru-
lis verò magis tanquam humidis adci-
dere, & plerunque absque manu medi-
ca impositu medicamentorum, & ad-
commoda ligatione curari. Huiusmodi*

præterea adfectiones, alioquin cognatas,
attamen loco dissidentes; diuersam sortiri
adpellationem. Nā si in inguine subsideat
hoc malum (de quo in præsentiarum fit
Βαβωνοκη *mentio*) Βουβωνοκηδὴ appellari: si autem in
ακ. scrotum iam descendat ἐντεροκηδὴ, id est,
ἐντεροκηδ. - intestinorum ramex dici. Sunt autem &
ακ. alia testium mala, quæ hîc prætereunda
sunt, quum hîc de inguinis ramice tan-
tummodo sit agendum.

Causæ.

Enterocelis autem causas esse autores
volunt, fletus, eiulatusq; frequentiam pe-
ritoneon distendentem, ex diaphragma-
tis motu inferiora comprimantis. Hîc ve-
rò notatu dignum interdum laxata scro-
ti cute, interioribus in sua sede manenti-
bus sceditatē fieri, quam Auicenna mol-
lificationem vocet, Paulus verò ὀξεία ῥα-
κωσις. Ramicis præterea in pueris causam
esse aliqui volunt, repletionem immode-
ratam, & fortem in egerendo expres-
sionem, & flatuum aliquorum plus iusto
irre

Mollifica-
tio rhaco-
sis.

irrepentium superabundantiam, quū eorū
peritonaeon sit tenue, siue tenerum, facile
rupturæ obnoxium.

Ex tumore autem, siue inguinum in- Notæ.
flatione huiusmodi mali notæ satis sunt
apertæ.

Curabitur autem *Ami.* autore, duobus Curatio.
potiss. remedijs, scilicet, *Ameos*, tum lupi-
ni amari administratione. *Ameos* enim
cum oui albo conspergendum esse, atque
panno subtili inuoluendum, demum ra-
mici superponendum. *Ammi* quidem, Ammi.
quod *Ameos* vulgares vocant, calfacit, Ameos.
& siccatur, naturæ feruida, atq; plusquam
cuminum extenuat, ad hoc adaperit, tum
detergit, flatusq; ita inguinis, siue aquosi-
tates dissipat, cum oui album restrin-
gat. Galenus hoc semen *Ami* nomi- Ami.
nat, & maximè vtile, facultatis excal-
factoriæ, & desiccatoriæ, tenuiumq; par-
tium: in calfaciendo, exiccandoq; tertij
ordinis esse intensi. Lupini autem adsa-

Lupinus
amarus.

Myrrha.

Empla-
strum.

ti cum myrrha friati, & cum vino cocti,
sub equali pondere, denuo cum panno
emplastri modo inguini vtiliter adponi-
tur. Lupinus enim amarus, teste Galeno
exterendi, digerendiq; vim obtinet, qua-
re flatus, siue aquei humores, si qui illic
fuerint, facile tollit. Myrrha autem exte-
rit, siccatur, & adstringit. Enumerat præ-
terea alia nonnulla medicamenta, idem
autor, huic adfectui congruentia, scilicet
calida, & adstringentia, ut sunt myr-
rha, cortices cupressi, eiusq; nuces: aloë,
acacia, & id genus alia. E quibus recen-
tiores Medici eiusmodi cōcinnant, in em-
plastri forma, medicamentum composi-
tū. Recipiuntur enim myrrha, cor. cupres-
si, eiusq; nucum, aloës, acacia, æquè drach-
mæ duæ, quibus optimè tritis, & cū pis-
cium glutino incorporatis cum aceto dis-
solutis, inguini adfecto adponitur. Aliud
verò puerorum herniam consolidans ab
Avicenna conscriptum. Recipit enim cor-

ti. granatorum drachmas decem, gallarum immaturarum drachmas quinque: & cum vino adstrictorio concoquit exactissimè, intestinis verò prius ad interiora detrusis, atque cum aqua frigida locus adfectus ablutus, denuo emplastrum hoc adplicatur: neque deponitur, nisi vnius hebdomadæ, aut decem dierum ad minus spacio elapso. Aliud, & satis efficax Aliud. quod prioris in locum surrogetur. Recipitur enim mastichis, cor. thuris, nucum cupressi, myrrhæ, collæ, siue glutini piscium, sarcocollæ omnium partes æquales, & glutino cum aceto soluto, facito emplastrum.

Razes autè in puerorum hernia eius- Razis cura-
cemodi conficit emplastrum. Adcipit au- ratio.
tem aluminis aureos viginti, gallarum au- Empla-
reos duos, quibus tritis, & cum vino co- strum.
ctis, donec ad crassitudinem redigantur,
loco dolenti adponit. Hoc idem cū spongia
aceto, & aquæ infusam admolitur.

Recentiores verò nasturcium agreste
 Recentio- torrent, atque cū lacte cocto præbent. Dein
 rum curan-
 di modus. Verò herniacos balneant ex decocto corti-
 cis mali punici, balaustiarū, acaciae, myr-
 ti, sumac: postea verò emplastrum huius-
 Empla-
 strum.
 Refina zo
 pissa. cernodi administrant. Accipiunt picis ex
 nauigijs deraſæ (quam & resinā Zopis-
 sam dicūt) aloës singulorum drach. 3. ma-
 stichis, thuris, æque drach. 2. terræ arme-
 niæ, sanguinis draconis æquis portionibus
 drachmas septem, lithargyri, resinæ li-
 quidæ, aliàs colophonie, armeniæ, gal-
 bani, singulorum drachm. 2. gallæ, visci
 quercini vniuscuiusque vnciā vnā, ari-
 stolochiæ vtriusque singularū drachmas
 tres, myrrhæ, resinæ terebinthinæ, lapidis
 hæmatitum æquis portionibus drach. 2.
 balaustiarum, cor. mali granati in æqua
 portione drachmā vnā, sepi hircini librā
 vnā cū dimidia, consolidantiū herbarū
 singularum drach. 2. gallæ, sanguinis hu-
 mani recentis, cuiuslibet libram vnā,
 omni

omnibus in aqua maceratis, in qua pellis arietina cum lana sua tota sit madefacta per decoctionem, additis etiam pilis leporis in bona copia, deinde singulis legitimè compositis cum oleo rosarum & myrstorū cōficiatur emplastrum, quod loco hernia- co adplicetur.

Morbus quadragesimusseptis-
mus, Anus procidens.

Infanti accidere quod eius intestinum Mali de-
scriptio.
egrediat *Avice. lib. 1. Fen. 3. Doct. 1.*
cap. 3. colligit. Per intestinum nos intelli- Intestinū
rectum.
gimus id quod Græci (interprete Marcel-
lo) à rectitudine ἀπευθυσμένον, Latini re-
ctum adpellāt: quodque Pollux in secūdo
sui Onomastici crassiori intestino, quod
Græci κῶλον dicant subesse, excipere q̃
illud, & in sedem, & anum desinere.

Causam verò istiusmodi mali esse, in- Causa.
terpretantur autores, continuam ventris
lubricitatem cum immodica humiditate,
atque musculorū duorum ano suppositorū,

in

in longanoniis interioribus imbecillitatē,
quorum munia sunt anum subleuare, in
egerendo se deprimentem: porro & ob
musculorum anum recludētium infirmi-
tatem. Sunt qui scribant hoc ex muscoli
anum constringentis, ad superna redu-
centis vehementem mollificationem pro-
uenire, quare anus procidat, forinsecusq;
promineat, quod musculus corrugari non
queat, ut ipsum supernè reuehat. Eiusmo-
di verò mollificationem siue ab interna,
siue ab externa accidere causa: videlicet
infrigidante, atque humectante. Inter-
dum etiam ob apostemata in ano exi-
stentia euenire, ut anus procidat. Non-
nunquam etiam musculus adeò relaxe-
tur, ut foras promineat. Fieri præterea
ut anus aliquando procidat in magnitu-
dine palmæ, quia eum recti intestini con-
comitetur extremum. Plerunque tamen
id mali pueris adcidit, propter ipsorū hu-
miditatem, nervos, musculosq; remollien-
tem,

tem, & laxantē. Senibus verò id euenit
ob neruorū, musculorumq; ariditatē iam
quasi inueteratam, nō tam facile, esto pi-
tuitosa in dies hīc materia adcumuletur,
relaxatorum. Notarum indicationes sunt Notæ.
manifestæ.

In curatione verò præsentis incōmodi Curatio.
decoctum, quod Græci ἀποζέμα vocāt, con- Apozema,
siue deco-
ctio.
ducibile esse Auicē. docet. Hoc autē inter-
pretes eius fieri persuadent, ex corticibus
malipunici, & myrto recenti, & glan-
dium cupulis rosarum floribus aridarum,
cornu cerui ambusti, alumine scissili, vn-
gula caprina, balaustijs, gallis omnibus
sub æquali pōdere: nempe semuncia, sum-
ptis, & in vino austerō coctis, apozema
concinnetur, cui puer vmbilico tenus insi-
deat, prius tamen ano legitimè intromis-
so. Adstringentia enim nequaquā sunt
adplicanda, ni prius anus intrusus sit. Qui
si huic conatui reluctaretur, cū digitis, aut
lana enitendū erit, vt quā molliter re-
pona

ponatur. Vel puer prius in decocto maluarum, vel liliorum bulbis balneetur, quò anus lubricior nonnihil reddatur. Postremo autē ex astringentibus nonnulla auxilijs, quadam vel in forma pulueris, aut ex oleis, vt mastichino, myrtino, cotonearum exhibeantur. Nonnulli in casu presenti eiusmodi commendant pulverem, adicientes gallarum, myrrhae, aloës, mastichi, sumac, quinque balaustiarum, in pulverem redactis, qui ano superaspergatur, siue intromittatur. Ex recentioribus sunt qui suadeant primum in aqua, vel vino decocti ex costo, fabis, hypocistide, cor. mali punici, balaustiarum, pillul. arboris cupressi, puerum balneandum esse: dein verò intestinum rectum cum oleo laurino perungendū. Postea verò pulverem istū superaspergendū. Recipiunt autem myrrhae mumiæ, nucū cupressi, mastichis, thuris, gallarum, sumac, omnibus in pulverem redactis, quē superaspergūt, siue

Pulvis.

siue intromittunt. Primò autem anus pro- Canones
hic obser-
uandi.
cidens ex decoctis, fouendus est: postea inun-
gendus, postremò puluere inspergendus.
Sunt qui velint primò anum cū oleo &
succo malua perungendum: deinde pul-
ueres ex pice, sanguinis draconis, & id
genus alijs superaspergi. Aut ex adstrin-
gentibus sufficiendum, vt sunt galle, ba-
laustia, & alia, cū decocto ex vino, vel
aqua pluuiali concinnato. Bdely suffitus
hic maximè cōmendatur. Lotiū postremò
languentis adhuc calidū, cōpersum, praci-
dētia sedis opitulari, P. Aegineta tradit.

Morbus quadragesimus octas-
uus, Tenesmus, siue tentio.

Circa intestinum, inquit Galenus Morbi des-
criptio.
quod rectum nominatur, tentio fit,
eandem habens causam ac dispositionem,
quam in difficultatibus intestinorum su-
scipiūt illa quæ superius iacent intestina.
Hanc præterea passionem nomē adcepis-
se (vt inquit) ab illa quæ fit in ea inten-
tia

tione, ob quam cum cacare vehementer adpetant, continuè exurgant. Hæc Gale. Aphor. lib. 7. Apho. 27. in quo ostenditur mulieri utero gerenti, si tentio superueniat, facere abortū. Aegineta multum desidendi impetum & cupiditatem, hoc malum esse dicit, paucis admodū sequentibus excrementis (quæ τρυφεύουσιν Græci vocent) quādoque etiā intestinorum tormina præcedere. Esse præterea hunc morbum crebrū, & implacabilē ad deiciendum impetum, ac desiderium, aliud nihil præter exigua cruenta quædā, vel mucosa agens, quæ tantum nō totius mali causam constituent: facta q̄ in longanone tumidam inflammationē, hærentium illic excrementorum opinionē, & excernendi ea cupiditatem inducere.

Causæ.

Tentionis porro causæ quāmuīs sint innumera, potissimum tamen à frigiditate provenire ab autoribus proditur: ut siue ex pituita crassa illuc sua grauedine incli

clinante, quare plerunq³ calorificis reme-
dijs curari.

Ex istiusmodi adfectu dolor vsque ad Notæ.
Vmbilicum protruditur, siue distenditur,
atq³ post cibi ingestionem sanguinolenta-
rum guttarum excretionem. Si verò ex apo-
stematē hoc malum euenerit intollerabilis
ex eo consequatur dolor. Identidem cum
eo ex vlceribus orto eueniet. Ex hæmor-
rhoidibus verò nato, tumor, & inflatio, et
cruciatu, iuxta ani parteis comites erunt.
Plerunq³ tamen hoc fieri Aegineta osten-
dit, propter tenuis intestini statum stercore
obducto, quod ex tarda & infrequenti
exurrectione dignoscatur. Ex tentione ve- Prognos-
tica.
rò diutius immorante, colica, ileon, vigi-
lia, virium imbecillitates, capitis adfe-
ctiones, syncopa, proueniunt: omnia huius-
modi ex cruciatu illius mali euenientia.

Sæpenumero hoc ipsum per se ortum, ali- Curatio.
quaxulumq³ progressum, cōquiescere Ae-
gineta testatur. Auicenna vero ex frigi-

T.

ditate proueniēti congruere adserit semen
 nasturtij, & cumini in puluerem reda-
 ctum, et cū aqua gelida, tū butyro vaccino
 veteri conspersum, ebibitū. Istiusmodi et-
 enim semina calefacere, extenuare, cras-
 sos humores incidere, interpretes produnt:
 quorum etiam acumen butyrum & aqua
 gelida infringant. Cuiuslibet autem semi-
 nis drachmas duas pro dosi vna sumendas
 ijde tradūt. Consultius tamē esse perhibent
 praesertim q̄ in pueris, vt foris, infernē q̄
 eiusmodi administrētur auxilia, veluti
 etiā, autore Auicē. sunt suffitus, enema-
 ta calida, surfuris circa lumbos, & pecten
 adpositio: item milij & salis cum ligamē-
 to, siue spongia calefactorum, iuxta sedem
 adplicatio. Adhac asperginū, quā iulio-
 xal dicantur ex spongia cum aqua calida,
 vel sicca tantummodo calefacta vsus. O-
 leorum praeterea calidorum hīc maximē
 comprobatur administratio: tum loci adfe-
 ctū calefactio, quā cum vini, aut olei per-
 mistio

Aspergi-
 nes

Embrochæ

mistione admoliamur. Dolores porrò mi-
 tigari, & distentiones enchatismatis quæ <sup>Enchatif-
mata.</sup>
 è fœnograeco, aut malua, aut lini semine
 fiant, Aegineta tradit. Sessionem verò
 super terram calidam iuuare Auicen. ad-
 firmat. Recentiores medici anisum, nastur-
 tium, & cuminum torrent, atq; in pulue-
 ris modum contundunt, demum in lacte
 tribuunt. Sunt qui scarabeos, siue vermi-
 culos sub vrceolis inuentos, cum sepo hirci-
 no misceant, atq; emplastri modo loco ad-
 fecto insinuent.

Morbus quadragesimus nonus, In-
 tertrigines femorum, quas Græci
 παρατρίμματα, Latini nunc at-
 trita, nunc cōfricata mem-
 bra adpellent, Exco-
 riationem in coxa
 Auicenna.

INtertriginis leuissimum mali genus est <sup>Morbi des-
criptio.</sup>
 Ise in Paulo Aegineta super lib. 1. Com- ^{Membra}
 mentarijs exposuimus, quod Plinius nunc ^{attrita, con-}
 attrita, nunc confricata adpellet mem- ^{fricata.}
 bra: qualia angusti calcei atterentes, &

vrentes in pedibus efficiant: aut qualia
confricatis longa equi vectione, in interio-
ribus feminibus, hoc est, fœmoribus, aut
alijs partibus, ex alijsq; causis accidunt.

Excoriatio
in coxa in-
fantium ex
vfu comē-
datur.

Auicenna hoc malum excoriationem in-
fanti in coxa euenientem nominat.

Ex inflammatione autem, siue punctio-
ne, aut forti excrementorū, siue vrinae de-
tersione in infantis inuolucris ex nutri-
cis incuria relictorum euenire, autores de-
cernunt. Egestis equidem nonnulla biliosa
materia admisceri, salsugine, atq; ama-
rulentia quadam conspersa, quibus facile
membra deinde atterantur. Ex lotij verò
acrimonia potissimum hoc prouenire Ra-
zis est sententia.

Curatio.

Itaq; in primis pueros contritos esse bal-
neandos cum decocto violarum aridarum,
hordei decorticati, altee, & id genus
alijs, idem admonet autor. Deinde verò
myrtum, rosas, hordei farinam, & alia
commode membris attritis, sub pulueris
for

forma inspergi. Haud secus Aegineta ad-
uersus intertrigines feminū, myrtum sic-
cam, & cyperum, & rosas magno valere
commodo tradidit. Quorū omnium loco supe-
rius ostenso, satis liberalem fecimus men-
tionem. Auicenna autem istiusmodi re-
media, in presenti casu competentia, sex
numero, & quasi præcipua esse, contendit.

Remedia
sex.

Primum est myrtus : adstringit enim &
indurat, ob quam quidem causam, his quæ
inducendis cicatricibus conficiuntur, vtili-
ter (teste Dioscor.) immiscetur, facitq; ad
ambusta capitis manantia vlcera, fursu-
res, pustularū eruptiones, intertrigines, ri-
mas, condylomata, & laxatos articulos.

Primum.

Secundum est iridis radix, quæ etiam
fistulas, & sinus carne explet. Terium est
rosæ, quæ siccata, eademq; trita, fæmorum
intertrigini vtiliter inspergi Dioscorides
tradit. Infrigidant enim, exiccant, & cor-
roborant, tum cuticulam restaurāt. Quar-
tum cyperus, quia pariter excalescit, &

Secundum.

Iridis ra-
dix.Tertium,
rosæ.

Quartum.

desiccat sine tamen mordacitate, quare & vlceribus præ nimia humiditate cicatricē difficulter admittentibus mirè cōducit, auctore Galeno lib. 7. de Simplici. medic. facultatibus.

Quintum.
Sextum.
Hordeacea
farina.
Lentes.

Quintum & Sextum sunt hordei, atq; lentium farina. Hordeacea enim exiccādo refrigerat, nōnihilq; abstersionis habet, quum lentes valenter adstringant, mediū caliditatis, & frigiditatis obtinētes. Auctorum interpretes ambas simul equali pondere sumendas præcipiunt, atq; intertriginibus inspergendas, atq; magno sic commodo profuturas, quòd mundet, siccet, attritionem resarciant sine omni mordacitate. Quos quidem nonnulli imitantes myrti, hordei, fabarum, lentium simul recipiunt pulueres, quos cum oleo rosaceo concinnant, atq; cum his loca contrita perungunt. Sunt postremo aliqui qui tantūmodo puluerē hordeaceæ farinae cū tragacathæ recipiāt, supra modum huic adfectui cōducibile medicamentū fore, dijudicantes.

Mor

Morbus quinquagesimus, Exanthemata, id est, pustularū eruptiones quæ variolæ, & morbilli ab Auicena dicuntur: à Raze exanthemata, & eulogium: Algidra verò, & alhasba ab Alsaharauio: à Plinio papulæ, & pituitæ eruptiones.

Accidere præter magnos quosdam tumores, in corporis superficie non infrequentius, paruas quasdam vel eminentias, vel maculas, Ioannes Manardus epist. lib. 7. epistola 2. prodidit: illas autem pustulas, vel bothor, has verò cutis defædationes vocari. Quæ licet inter se, & ab alijs differant tumoribus ab eisdem tamen humoribus fieri, à quibus & magni existant tumores, maioris tātū minoris de ratione distantes. Quarum equidem pustularum nonnullas à sermonis consequentia, & vocum similitudine tracti nonnumquam enumerārit, sicut lepram, scabiem, impetiginem, alphon, leucen. Maiorem

Exanthe-
mata.
Eulogiū.
Algidra.
Alhasba.

Variolæ.
Morbilli.

tamen habere ambiguitatem nonnullas,
præcipuè apud antiquos, sub quonam no-
mine de illis loquendum sit, ut sunt va-
riolæ, & morbilli, ab Auicenna: à Raze
exanthemata, & eulogiū nūcupatas: quas
Alsaharaius algidra, & alhasba no-
minet. Qua quidem in re, ut idē opinatōr
autor, non multū laborādum esse. Si enim
variolæ (ut Auicenna velit) sint pustu-
læ sanguineæ, & morbilli ex bilis, san-
guinisq; fiant mistione, nihil certè addere
supra cōmunem pustularū eruptionem, si-
ue rationem, nisi quòd per modum crisis,
hoc est, cuiusdā veluti indicij, in malignis
quibusdam febribus cōtingant, & epide-
mialium, contagiosarumq; ægritudinum
more, & pluribus eodem tempore acci-
dant, & de vno in alterum vagādo per-
transeant. Supra earundem præterea pu-
stularum curationem nihil, nisi quòd repel-
lenda non sint, sed potius opere veluti na-
turæ genitæ, morbi materiam in ignobi-
lio

liores parteis expellentis, iuuāda omni ingenio, et prouocāda. Quare de nomine earum frustra eum sollicitari, qui hoc nouerit quū eandem curationem, quocunq; vocentur nomine, desiderent. Attamē de eis sub qua voce Gal. scripserit in libro 5. capi. 11. Artis curatiuæ apertissimè cognosci, vbi exanthemata vocentur. Namq; pustulas in Exanthemata. quadam pestilentia in asperarum arteriarū interiore tunica, totaq; extima corporis parte contingentes nō alio quā exanthematū nomine adpellauit. Aliud verò nomen, si quis inquirat Hip. li. 3. Epidemiarū perlegat, in pestilēti cōstitutione aduenisse inter alios morbos dicentem, magna ecchy Ecchymata magna. mata, hoc est, interprete Galeno, tumores sponte in cute florentes, à crassis humoribus genitos. Tenuēs enim humores exulcerationē potius gignere quā tumore: crassos autem in tumorem cutem extollere. Ex quibus verbis certè colligendum, nō solum quo nomine, eiusmodi morbi ab antiquis

Variolarū
& morbil-
lorū mate-
rię scopuli.
Herpetes
multi, ma-
gni.

vocati sint, sed etiam quónam modo in-
ter se differant. Variolas enim à mate-
ria fieri crassiori, morbillos à tenuiore. Et
illos quidem ecchymata magna, scopu-
los lingua Italica, minora variolas. Por-
rò & morbillos herpetes nominari, quos
Hippocr. eodem in loco, herpetes multos,
magnos vocet. Magnos videlicet, Gale-
no interprete, vel quòd magnum occupent
locum: vel quia cum magna contingāt ero-
sione. Vidisse præterea se morbillos quan-
doq; altero tantum, quandoq; utroq; modo
magnos. Latinum verò nomen si quis
horum morborum scire desideret, à Pli-
nio papularum, & interdum pituitæ eru-
ptiones dici.

Papularū
pituitę eru-
ptiones,
Exanthe-
matis no-
men patet
latius.

Postremò hîc minimè silendum exan-
thematis nomen nonnihil latius patere,
quorum nonnulla capitis propria, altera to-
to corpore proueniētia, quædam subrubras,
& asperas exulcerationes perficere, quæ
à tenuioribus proueniāt humoribus: non-
nulla

nulla verò exiguas perferre pustulas, quales ex urtica vel sudore fiant, quia ex crassioribus proueniant humoribus: quare Pauli, Celsi q̃ exanthema nonnihil discrepare euidenter innotescat.

Recentiores autem medici eiusmodi esse pustulas scribunt, quasi exiles vesiculas ad modum granorum ficuum subortas. Alij verò apostemata siue paruas esse pustulas, supra totam cutem adparentia & de genere infectionum, & corruptionum sanguinis, atque humorum: nisi quòd variola magis de sanguine, morbilli verò de bili generentur. Razes verò dicit in pueri corpore accidere diuersa vulnera, siue vesicas vel pustulas, ex quibus nonnullæ sint candidæ, quædam verò rubæ, quædam atræ doloris immensi, quædam verò minimè. Quarum quidem pustularum differentiæ vel à subiecti diuersitate, quæ à materia originem ducit, eruntur: ut si qua sit sanguinea, variolæ con-

Pustularū
differentiæ.

tin

Effere.
Saire.

Epinycti-
des.
Sudamina.
Desudatio-
nes.

tingant. Si verò bilis rubea pura, tunc vl-
cuscula parua, lata, instar vesicæ, subru-
bra, pruriginosa, eueniant: ab Auicenna,
Effere, ab Haliab, Saire dicta, quæ Pau-
lus instar bullæ exeuntia, subrubra, &
ἐπινυκτίδας nominat. In quorum nu-
mero sunt & Græcorum ὑδρῶδες Latino-
rum verò sudamina, siue desudationes,
Ex quibus liquido constat, huiusmodi ad-
fectiones, puerulis, atq; iuuenibus, et præ-
cipuè his qui biliosi natura sint, atq; æstus
tempore communes esse, adeoq; facilis cu-
rationis, vt per se, sine vlllo præsidio, al-
bicantibus quibusdam squamulis dimis-
sis sanescant.

Vluusculo
rū aliæ dif-
ferentiæ.

Sunt porro alia vlcuscula pituitosa, alia
melancholica, quædam verò ex eiusmodi
mixta, vt sunt morbilli, formicæ, scabies,
& id genus alia. Nonnulla autem aquosa
instar bullæ, alia flatuosa. Proinde vluscu-
lorū nonnulla sunt lata, vel stricta vel acu-
ta, vel rotunda. Quædam verò in capite,
quæ

quædam in facie, quædam in membris superioribus, quædam in inferioribus subnascentia. Quædam ad hæc spissa, siue densa quædam rara, siue dispersa, alia bicipitia, alia uno tantum apice, interdum in membrorum margine, aliquando verò intrinsecus, & magis profundè, nunc copiosa, nunc pauca in numero prominent. In terminatione verò, siue medela sine eiusmodi dissaria reperiuntur. Eorum enim quædam exteruntur, quædam suppurantur, alia indurantur, alia delitescunt, & per halitum quasi digeruntur, & permutantur, aliqua verò in vlcera rediguntur, & illa pruriunt, illa verò minimè, iuxta Hipp. Aphor. lib. 6. Aphor. 9. dictum, Latas pustulas non admodum prurire, adserenti, fortè quòd materia ipsarum minus sit acuta, minus quàm vnita, sed potius dispersa. Diffuari enim in latitudinem extenta, & facientem ipsas humorem minus acrem habere Galen. interpretatur.

Est

Planta
noctis.

Pustularū
differentie
penes Ga-
lenum.

Causæ.
Causarum
genera

Est porro istiusmodi pustularum & alia in adparitionis earum hora, differentia: nam quedam noctu subnascuntur, quas plantam noctis Avicenn, adpellavit, quam esse Græcorum ἐπὶ νυκτὶ δα nonnulli autumant: nonnullæ autem subito, aliæ verò paulatim: quedam cum prurigine præeunte, quedam verò non: aliæ autem symptomatico, aliæ critico modo. Huiusmodi pustularum Galenus Aphori. lib. 6. Aphori. 9. duplicem esse differentiam ostendit: quum quedam tendant in acumen, & altum petant, quedam ad maiorem extēdantur locum, non tamen in altum attollantur, sic pustularum nonnullas esse sublimes, nonnullas autem latas fieri. Sublimiores autem pustulas, atq; etiam tubercula à calidiore generari materia, humidiores autem à frigidiorē.

Corpori itaque puerorum istiusmodi accidere pustulas, quas Variolas, & morbil

billos esse diximus, *Auicenn. libr. 1. Fen.* ^{quatuor iuxta Neoterices.}
 3. Docto. 1. capitu. 3. attestatur. *Quarum*
 quidem causis esse potissimum eius in-
 terpretes volunt, ebullitionem sangui-
 ni superuenientem per modum putrefactio-
 nis, vel ex nutrimenti menstrualis reli-
 quijs, siue ex prauo lacte, siue dispositio-
 ne aeris putredini obnoxia. *Ra*ces cor-
 ruptionem lactis in ventriculo pueri pro
 causa ponit.

Neoterici autem causarum huiusmodi
 genera incertam digerunt summam. *Pri* ^{Primum.}
 mo enim ex mensium sanguine in poris
 membrorum foetus retento, huiusmodi ad-
 fectiones generari adferunt: quem natura
 demum robustior facta expellat, corpusque
 mundificet, vel in infantia, aut in pueritia,
 aut adolescentia, rarerentem autem hoc in
 iuuentute rarissime vero senectute eueni-
 re. *Secundo* ^{Secundum.} eiusmodi adfectus nonnunquam
 contingere volunt, ex foetus subfluxionis
 mensium tempore, conceptu, quare natos
 dein

Tertium. deinde malum lepræ rarissimè effugere, posse. Tertio, ex nutricis praua diæta itidem accidere, putant, ut si cibus putredini obnoxys utatur, veluti sunt lac, pisces, in eodem prandio sumptis: ad hæc calidorum tum humidorum usu, nulla interdum incisione venarum adhibita.

Quartum. Quarto istiusmodi mala nonnunquam epidemiali sub tempore oriri: aut post malas ex sanguine crises in corpore sequi.

Notæ. Quorum malorum notæ ab externis facile deprehenduntur. Ab internis autem, ut si à sanguine profisciscantur, per colorem rubeum, cum pruritu, calore, & dolore discernitur. Si verò à bili, tunc per spicuum colorem cum punctura, & acumine dignoscitur. A pituita autem per albedinem & squamas. A bili atra per liuorem cum nigredine, & punctura.

Sunt præterea qui pruritum narium ignium coruscationem veluti adparentem metum in somno, rubedinem in facie, punctiorem totius

totius corporis vehementem, pro euiden-
tioribus variolarum, tum morbillorum
præcurrentibus indicijs ponant.

Adparent autem plerunque in mo- Violarum
descriptio
secundum
neotericos.
dum capitum (ex recentiorum descriptio-
ne) acuum, siue grani milij, aut capiti for-
micæ, deinde verò increscunt, & multi-
plicantur, postea crustum, & saniem
gignunt, porrò exiccantur, & decidunt.
Rubescunt autem ubi à sanguine ortum
habuerint: à bile rubea flauescunt, à pitui-
ta albescunt: ab atra bili nonnihil ni-
grescunt.

Solent etiam plerunque eiusmodi
mala, hæc concomitari symptomata, ve-
luti sunt febris immensi ardoris, dolor
dorsi, narium pruritus, in somno timor,
capitis grauedo, oculorum rubedo, tem-
porum & frontis percussus, totiusq; cor-
poris punctura. His addunt nonnulli com-
munem corporis grauedinem, cum faciei,
& oculorum rubedine, & lacrymis,

Variolarū
morbillo -
rumq; sym
ptomata.

inflammationeq; & pandiculationum
frequentia, anhelitus difficultate, vocis
raucedine, sputi crassicie, capitis dolore,
cordis palpitatione, oris exiccatione, an-
gustia, gutturis dolore, tum pectoris, pe-
dumq; tremore. In morbillis autem hu-
iuscemodi symptomata multum gravio-
ra, periculosioraq; fieri, quàm in Variolis,
Guliel. Placentinus prodit.

Nota mor-
billorū, va-
riolarūq;
vicinae, &
quasi con-
generes.

Sunt autem morbillorum indicia &
Variolarum vicina, & quasi congene-
ra, nisi quod in illis lacrymae nonnihil
sint copiosiores, dorsi verò dolor mitior,
quum causa Variolarum ex sanguinis
redundantia proueniat, Venam dorsi di-
stendente. In Variolis equidem sangui-
nis multi, & corrupti: in morbillis au-
tem maliciosi, scilicet paucioris de-
prehenditur. Quare morbilli cuestigio
erumpunt, Variola verò paulatim, &
sensim.

Circa notarum autem significationes,
iuxta

iuxta autorum placita, observanda sunt prognostica illa, quod *Ulcuscula* omnia si ^{Prognostica.} negligantur, neque debito modo mundificentur actutum in scabiem transitura.

Aut si à causa calidiori provenierint, in serpiginem, & impetiginem, tum alia eiusmodi symptomata abitura. Post scabiem verò si à pituita scaturierit malum in fistulam vertitur. Ab atra autem bili orientia mala semper cōtumacioris inveniuntur curationis, qua neglecta, cancer suboritur. Ob quam quidē rem Avicē. pustulas nigras, & ulcerosas in infante adparentes mortales esse, pronuntiavit etiam si solum in ore huiusmodi adparuerint, quas superius *alcolis* esse ostendimus. ^{Alcolis.} Has enim maliciosam sanguinis exassationem, & quasi cancrosam portendere. Itidem & virides, tum violarum colorem referentes esse malas: nigriores verò deterrimas. Cādida autem *Ulcuscula* salubriora esse, itidē & rubea.

interdum commoditatis non parum allatura. Albidiores enim potissimum salubriores esse, præcipuè quum earum non sint admodum multæ, magnæ tamē in quantitate faciliter erumpentes, præter angustias, & sine febricula ardenti, magis tamen, magisq; decrescente. Necessum est enim instar musci recens collecti, & modo ebullientis, ut vinum, ita & sanguineam massam eiusmodi pustularum feruore secerni, & digeri, quò purum ab impuriori sequestretur. Atras autem pustulas, febre comite, exitiales esse Razes prognosticatus est. Quæcunque autem variolæ citius eruperint, & apparuerint,ocyusq; maturæ fuerint, salubriores erunt: virides, verò duræ, & violacei coloris prauæ. Tardiusculè autē maturantes cum syncopa perenni, atque angustia perniciose. Identidem se iterum tam subito recondentes malæ sunt, syncopam proritantes. Anhelitus præterea difficultas in
istiu

istiusmodi adfectibus pessimum est indicium.

Exitia proinde signa haud dubie sunt in variolis, febris acuta, angor im- mensus, sitis intolerabilis, vires imbecillae, anhelitus coarctitudo, siue constrictio: huiusmodi enim symptomatibus adfecti ocysimè morientur: pauci enim reualescunt, quum plerique horum ex praedictis malis suffocentur. Lotium praeterea viride, siue atrum, excrementa quoque viridia, pessima sunt, & lethalia. Sic Diarrhoea in variolarum malo adfectis semper mala, & infauusta iudicanda.

signa exitia in variolis.

Porro eiusmodi mala quae scilicet Curatio. circa summam pusionis, ut Aegineta tradit, cutem florescunt, principio quidem equi boni quoque facienda sunt. Sed ubi bene deflo- ruerunt, tum lauacris, adiecto myrto, lentisco, rosis quoque medendum. Quem Auic. modum imitatus, puerorum corpora pustulis infecta lauanda esse, aqua scilicet ex decocto

medicamentorum subtilium, exiccantiũ,
veluti sunt rosa, myrti folia, lentiscus: itẽ
tamarisci folia, atque olea rosacea, itemq;
lentiscina, autoritate etiam Aegineta.

Notiones. Obseruandũ tamen hĩc ne huiusmodi au-
xilia adhibeantur, priusquã vlcuscula
hac bene defloruerint, hoc est, matura ef-
fecta sint, exactiusq; foras sint protrusa,
quod plerunque post septimum contingit
diem. Erupto enim vlcusculo, vel per se,
vel per artem, vt cũ acubus aureis, atque
bene deterso, tantummodo medicamenta
exiccantia competunt: immaturo autem
minimẽ. Quare Auicenn. salitionem hĩc
esse necessariam ostendit, videlicet post
pleniorẽ pustularum eruptionem, atque
maturationem, ne fortẽ ex ea dolor qui-
dam intolerabilis prouocetur. Salitionem
autem iusto saltem tempore, magna cõ-
moditate fieri, præcipuẽ quæ cum aqua
fiet salita, in qua sit myrtus, crocus, aut
rosa, multum conducibiles, & tamarisci,
& len

Salitio a-
pud Aui-
cennã quid
sit.

& lentes. Salitionem præterea cum cam-
 phora, & sandalis peractam optimè in
 presenti casu competere, quia maturet,
 exiccet, & pustularum casum promo-
 ueat. Memori tamen hîc mente tenen-
 dum est, quòd si pustula eiusmodi non sint
 admodum malignæ, neque vlcerosæ, au-
 xilia tunc nequaquam administranda
 esse, donec satis defloruerint: postremò au-
 tem huiusmodi medicamentis utendum
 esse. Solemus autem pueros inuolucris ru-
 beis inuoluere, & eis ex decocto ficuum
 loco potus præbere, quò pustularum ex-
 cretionem suppedient, quod à Gallis di-
 ligenter observari, traditur. Atqui vl-
 ceratis pustulis cerotum cum cerussa con-
 ducit, siue vnguentum in officinis album
 dictum, cum modico camphoræ permi-
 stum. Sunt qui vnguentum de litargyro
 hîc etiam conferre velint. At lotionè pu-
 stularum Auic. maximè commendat, cū
 aqua mellis, & modico nitri adhibitam

Pustularū
 excretionē
 promouen-
 tia.
 Pustulæ ex-
 ulceratæ.
 Pustularū
 lotio.

precipuè tamen quum sanies earum cras-
 sa existat. Mellis enim aqua exterit, vel
 Aqua mel-
 lis. Nitri vis. cum aqua simplici, aut rosacea, & nitru,
 siue sal ab imo etiam euocandi vires ha-
 bet. Spumam autè nitri nonnulli sumunt,
 & vlcerosi puerorū pustulis, crassis cru-
 stis obstitis adponunt, sed tamen aquam
 eius tantummodo sumere possemus cum
 lacte mistum, quo pusio istiusmodi aquæ
 puncturâ queat ferre. Sunt præterea ora
 exulceratarum partium ex decocto myr-
 ti, rosarum, squinanti, lentisciq, fouendæ,
 quo humor ille influens, doloremq, pro-
 gignens propulsetur, caroq, tumida re-
 stringatur, roboretur, & desiccetur. In
 Nutricis
 diata hîc
 imprimis
 obseruan-
 da. primis autem hîc observandum est, quo
 nutrix infantis legitima fruatur diata, à
 recentibus se abstineat fructibus, atque
 aromaticis rebus, salsis, calidis, acribus, ut
 allei, porris, cepis, itemq, vinis fortiori-
 bus, mustis, balneis, animi adfectionibus.
 Solent enim eiusmodi sanguinem in-
 flam

flammare, pustularumq³ generationi materiam subministrare intollerabilem, ob ^{Sanguine inflamm} nimiam alios in pueris existentem re-
tundantiam. ^{tia.}

Razē igitur hīc in primis procedendum esse, vult, vt in lactis corruptione, <sup>Razis cu-
ratio.</sup> veluti in vice simonono puerorum morbo ostensum sit. Demum calefactorijs materiam forinsecus prolificandam esse, verbi causa, vt si puer caldario aquæ calidæ pleno adponeretur. Ad quam quidem operationem non parum iuuare, dactylorum, aut ficuum, cum aqua fœniculi decoctum. Erupta autem foras materia, tunc lauacra omni die, adiectis rosarum folijs, myrti q³ & id genus alijs, administranda esse. Deinde verò iuxta Aeginetæ etiam institutum, rosaceo oleo vtendum: aut violaceo, si quando vlcuscula fuerint arida. Humidis autem cerotum cum cerussa adhibendam, cum cera scilicet, & rosaceo oleo permista.

Vlcusculo
sum cum
pruritu
eruptio.

Inunctio -
nes probæ.

Narcotica.
euitanda.

Symptoma
ta variola-
rū & mor-
billorum.

Quòd si cum pruritu, in puero autem
semestri, eiusmodi vlcuscula proruperint,
ex decocto violarum siccarum, hordei à
cortice denudati, altea, folijs cucurbitæ
abluendos esse pueros idem conuincit au-
tor, minimè autem vnguento alio perun-
gendos. Neque etiam in morbi principio,
neque in inclinatione, olea adplicanda
esse. Illud enim vlcusculorum eruptionem
impediat, hoc verò corrumpat, & vlce-
ra quasi excauet, sinuosaq; reddat. Inun-
ctiones autem quæ cum medulla osium
bouis, vel cerui concinnantur, supra mo-
dum hîc commendantur. Narcotica autē
ceu venenum euitentur. Atqui lentis
decoctum variolarum eruptionē plurimū
adiuuat: nam Dioscorides hoc crustulas
erumpere, & vlcera repurgare, tradit.

Postremò symptomatum in presenti
casu interdum euenientium nō parua ra-
tio est habenda, autore Auicenna, veluti
sunt gutturis, oculorum, narium, hoc est,
par

partium supernarum, pulmonis & intestinorum.

Oculo enim aliquando ex istiusmodi malo euenit aliud malum, quod Auicenna *Albugo*, *Haliab*. Verò albedinem & pannum: Latini Verò cicatrices, & albuginem, aut nebulam: plerunque tamen Græca voce *λευκωμα*. Puerulus itaque ne huiusmodi adficiatur incommodo, à loco pellucido, siue luminoso, atque rerum rubearum intuitu dimouendus: oculi q̄ eius cū collyrio aquæ rosacæ, in qua nonnihil sumac in sit conseruandi. Aut in mali ipsius initio, mox aquæ rosacæ, siue coriadræ, siue myrti, duæ, siue tres guttulæ oculis inspergenda, facie ad oppositum permota, quò vniuersum aqua istiusmodi oculum pertingat. Sit autem aqua hæc in æstate gelida, hyeme Verò tepida.

Guttur præterea ex iam dictis nonnunquam suffocatur, aut ulceribus, siue erosio

Oculorū.
Albedo.
Pannus.
Albugo.
Cicatrices.
Nebula.
Leuconia.

Gutturis.
suffocatio,
exulceratio,
erosio.

Gargarif-
ma.

sione quadam pernicioſa percellitur. Cui
accidenti optimè ſuccurrent malorum pu-
nicorum, ſiue mororum, aut fructuum Ba-
ti, ſiue rubi ſuccus, ſiue ſorbitiuncula, aut
ex ſuccis eorū gargarismi. Ex aqua enim
roſacea in præſenti caſu gargarisma con-
cinnari, Raſes haud vituperat.

Nariū vl-
cera.

Narium porro vlcera, meatum earum
obturantia, inſpirationemq; prohibentia,
aceti odor mirificè proſligabit, Superiores
autem narium partes Epithematis com-
peſcenda ex glaucio, ſandalis, aut aliquot
ſuccis refrigerantibus, adſtringentibus,
& aceto. Cruſtis autem narium poteſt
vnguētum ex oleo roſaceo, cū modico ſaltē
Cadmia, & cera componi, quo nihil con-
ducibilius hīc eſſe, creditum eſt.

Suſpiria.
Anhelatio
nes.

Ceterum ſuſpirijs, ſiue anhelationibus
ex eiſmodi malis accidentibus, phthi-
ſimq; haud dubiè importantibus, ſubue-
nire ſine dubio Eclegma ex lentibus cum
papaveris ſemine, & tragacantho con-
cinnā

Eclegma.

cinnatum, pro certo ducitur.

Intestinorum autem erosionem medicamenta styptica compescunt.

Intestino-
rū erosio.

Varis postremo, hoc est, cicatricibus ex pustulis illis relictis, aquam destillatam ex radice cannæ multum conferre, traditur. Idem & asini pinguedinem illitā, cum oleo rosaceo, liquefactam. Non minus imò potissimum aquam ex ungulis arietinis, caprinisq; in igne exassatis promanantem competere, nonnulli volūt. Idem talem leporis, tum tauri sanguinis, illius enim lentigines, asperamq; & discolore ceu à sole cutem emendare, si calente eo illinantur, huius autem discutere, duritiesq; mollire, cū pollenta illiti Dioscorides sanxit.

Morbus quinquagesimus primus, Lactumen, crusta, lactitium.

I*N capite quoque & facie, fereq; toto corpore, praesertim infantium, vlcuscula*

Morbi des-
criptio.

quæ

Lactumen. quaedam gigni, maiori ex parte crustosa, statim vel paulò post initium, lactumenq; vocari, quoniã lactis impuritatem sequi putabatur Manardus lib. 7. epist. Medici. epistola secunda explicat. Præterea non dubium esse, hæc ad ἀχῆρας, & vel κήγια, vel ὑδραρία, vel ξανθήματα antiquorum pertinere: licet enim eodẽ semper nomine lactuminis à mulieribus appellentur, variare tamen multum, iuxta materiæ à qua gignantur varietatẽ. De hoc morbo idem putat autor, inter recentiores primũ particulatim differuisse Guilielmum de Saliceto, quem & Placentinum superius nominauimus, sub nomine crustæ, vel lacticij. Crustæ quidem, vt arbitratur, quoniã emineant in cute patientium puerorum veluti crustulæ: lacticij verò, quòd ex lactis acredine, salsam pituitam & tenacem in puero subnutrientis generetur.

Causæ.

Motus.

Notas autem adparere, vt si ex lactis

acris

acrimonia hoc malum proueniat, asperitatem in crusta reperiri, cum crusta tenacitate. Illa enim exassatione: hæc verò, materiæ crassitudinem significabit.

Hunc morbum in lactentibus *Ma-* *Curatio.*
nardus non magnopere nititur pellere: præcipuè tamen quando faciem non admodum dehonestet, nec periclitetur, ut oculos obledat, quod nonnullis accidisse, ab eodem compertum est. *Gulielmus* tamen curam docet certam, qua se multos curasse adfirmat, absq; omni periculo, vel timore: quod & idem *Manardus* sine mendacio adprobare posse testatur: nisi quod non eisdem semper usus sit præsidys, sed pro materiæ facientis morbum, reliquarumque rerum, à quibus indicationes curatiuæ sumendæ sint, varietate: itaque remedijs mutatis, vno tamen semper cauendo, ne scilicet rebus nimis adstringetibus, frigidisve materiam introrsum pelleret. Addit præ-

ter

tere à Placētinus: Abluenda esse loca patientia ex aqua florum chamomilla, rosarum, & seminis fœnogræci. Deinde membra ex oleo chamomellino calido, omni die illinenda esse. Ad hæc nutrici præcipiendum vt à salsis, & acutis edulis, itemq; caseo abstineat. Vinum prætereà bibat multū liquefactum, vt idem eisdem verbis recitat autor.

Morbus quinquagesimus secundus, Febris.

INfanti adcidunt febres, iuxta Hippoc. lib. Aph. 3. Aphor. 25. & Auicennæ lib. 1. Fen. 3. Doct. 1. capi. 3. sententias, videlicet in progressu quum iam dentire incipiant pueruli, tūc gingiuarum pruriginibus, febribusq; corripì asserentes. Li- quere autem Galenus cōuincit, quòd perforatis gingiuis à dentibus prodeuntibus, huiusmodi casus eueniat, quēadmodum vbi stimulus infigatur carni, & sanè plus dentes affligant quàm stimuli. Hos
equi

equidem semel firmatos, in membro quiescere, cui ab initio infixi sint, dentes verò semper procedere, & tantum, quantum augeantur.

Febricitare autem hac ætate puerulos, *Causas.*
 & propter ætates, & vigilias, & inflammationes. Ex dolore siquidem, & cruciatu pruriginis gingivarum naturam commoueri, & humores ipsos, tum spiritus nonnihil subagitari, unde & febres Ephæmeræ dictæ concomitentur. Dolore siquidem auctiori reddito, vehementioremq; inde inflammationem proritari.

Cuius equidem notæ ex caloris extranei dignotione facillimè percipiuntur. *Notæ.*

In curatione autem huiusmodi inflammationis, hoc imprimis statuendum, ut nutritrix iusta utatur diæta, cibus videlicet competentioribus, ad frigiditatem, humiditatemq; vergentibus, sanguinem, & lac nutricis emendatibus, veluti sunt pa- *Curatio.*

nis albi micæ in aqua fontana iterum, atque iterum lotæ. Hic etiam conferunt aquæ pullorum alterantes, cum lactucis, acetosa, hordeo decorticato, lacte amygdalino, malis persicis, & arancijs, potu ptisanæ, aqua saccharo conspersa, syrupo rosarum, violarum, endiviæ, acetosa, oxysacchara simplici. Dein verò ex Auicennæ persuasum nonnihil infanti propinandum, ut est succus mali punici, citri cum oxymelle simplici: aut cui sacchari nonnihil adiectum sit. Recentiores verò succos hic præbent refrigerantes cum camphoræ minimo, & saccharo. Item Iuleb, & Syrupos violarum, tum rosarum, tum oxysaccharum. Sunt qui in sudoris prouocatione hic nonnihil admoliantur, videlicet ex radice canna recenti compressa, succoque eius partim infantis capiti superposito, partim verò pedibus supposito, ocysimè enim istiusmodi modo sudorem prouocatum iri.

Ex

Experimentatores (vt vocant) aliqui febricitantibus puerulis huiusmodi concinnant cataplasma, atque iuxta pectoris furculam applicant. Recipientes hordeum à cortice depuratum, cum viola aliquantisper contritum, deinde cum sacco absinthij, maluæ, plantaginis, Umbilici Veneris, cotyledonis etiam dicti incorporatum, atque ita emplastri modo impositum.

Morbus quinquagesimus tertius, ^{ἰσχυρὸς} Paulo, inflatio Auicennæ.

Inflationes accidere secundum duos modos Auicenn. lib. 4. Fen. 3. Tract. 1. cap. 11. insinuat. Aut propter aquositatem quæ propulsetur ex feruore, siue ebullitione in humoribus, ex qua materia subleuetur ad illud quod sit sub cute, & cutem tunc offendat densiorem, quàm id quod sub ea sit, vnde non permeet, immo impedita remaneat inflatio istiusmodi aquosa. Aut loco aquositatis sanguis insit,

quare plus de subtus fiat.

Causæ.
Emphyse-
ma.
Inflatio.

Huiusmodi autem malum Paulus emphysema vocet, quod Latinorum quidam inflationem nominent: gigni verò à spiritu flatuoso, sub cute quidem aliquando, interdum verò sub circūossalibus membranis coaceruato, & collecto: quandoq; in medio horum, & peritonæi congregato. Dirimi tamen à reliquis Oëdematis quòd digito cedat, non tantam relinquens foveam, quemadmodum illa dum preman- tur, & strepat instar tympani. Adiuuare autem cutis densitatem, quæ spiritu non tam facile perfletur, cumq; hac si cras- sarum partium sit spiritus: vnde curatio- nis scopum esse, corpori raritatem indu- cere. Liquet itaque impræsentiarum in- flationem sumi, quæ ex aquositate densa, vel flatu ad cuticulam vi naturæ trans- missis eueniat. Euidentem deinceps cau- sam esse nutrimenti scilicet in quantita- te, vel qualitate sumptam: ex qua vide- licet

licet redundantia crassa & aquosa, vel calore imbecilli existente, flatus generetur, quæ cuti detrusa, exin in toto corpore, vel aliqua eius parte inflationem proliciat.

In istiusmodi mali curationem, ple-
rūq; comæ, siue summitates (vt vulgò
dicitur) sambuci, & ebuli decerpuntur,
atque in vino albo coquuntur, ex quo decocto cum pannis calidis puer fouetur, vel cum vniuerso corpusculo, vel cum partibus aliquot eius seorsim adfectis. Radicem
æscopillarum in vino decoctam, subeuntibus cutem aquis auxiliari Dioscor. conuincit. Curatio.

Morbus quinquagesimus quartus,
Macilentia.

Atenuato nonnunquàm, atque plus
iusto macilento puero, eiusmodi
administramus balneum. Accipientes
caput arietis, & pedes eius, quibus exa-

Etissimè coctis, donec carnes ab ossibus discernantur, in quo puerulus balneetur, atque post balnei usum huiusmodi illinatur unguento. Recipiuntur enim butyri, oleorum, rosarum, vel violarum, vel communium singulorum vncia vna, pinguedinis crude de carnibus porcinis semuncia, ceræ drachmæ duæ, quo puer omni die illitus immodicè reficietur.

Morborum, siue Symptomatum in infantium, siue puerorum corpusculis deprehensorum finis.

DE INFAN-

TIVM, SIVE PVERO-

rum, tuenda bona valetudine

Aphorismi, ex autoribus

vnde quaq; congesti.

I

Quoniam eius naturam quo nutri-
mur sapimus, bonorum morum nu-
trix, bonaq; eucrasia, ac mediocris ætatis
semper est eligenda. II.

Bono cibo nutrices si nutriantur, boni
chymi lac generant, quod crescendo dat
bonos ipsi nutriti succos.

III.

Solo lacte pascendus est infans, usque
quo dentes anteriores producat.

IIII.

Quum ex eodem simus, & nutriamur,
lac maternum sanguinis consueti, atq; co-
gniti alimonia genitum, lactibus cæteris
natura infantis conformius existit.

X 4

V.

Vt hedi lacte ouino nutriti, pilum gignunt teneriorē: & agni lacte caprarum aliti, lanam ferunt duriores: sic nati matribus alienis educati, à proprijs matrum naturis multum discrepant.

VI.

Qui suos partus deserunt, ablegantq; à sese, & alijs nutriendos dedunt, vinculum, coagulumq; animi, atq; amoris, quo parentes cum filijs natura consociat, intercidunt, atq; diluunt.

VII.

Infantis aliorum dati, facta est ex oculis eius amolitio: vigor enim ille maternæ flagrantiae, sensim atque paulatim extinguuntur, ipsiusq; affectio animi atque amoris, in ea sola vnde alitur, occupatur, & matris quæ genuit neque sensum vllum, neque desiderium capit.

VIII.

Mo

Moderatus fletus ante pueri lactationem ad membra spiritalia dilatanda ceteraq; confortada, & ad caput purgandum conuenit.

I X.

Pueri mense septimo dentire incipiunt: dentiunt vero citius, qui lac calidius sugunt.

X.

Quum ignem igni addere non liceat, eucratus puer ad plurimum vsque, aut eius nutrix, nequaquam vinum gustare debet: quoniam sufficienter calefacit corpus, caputq; vaporibus replet, atq; in his furiam quandoq; & maniam irritat.

XI.

Puer à septem annis, ad quatuordecim vsq;, nec multis, nec violentie prouocandus est gymnasijs, ne eius augmentum talibus impediatur: tunc enim eius animus bonis moribus, & honestis ornandus est disciplinis.

XII.

Animi mores corrumpuntur malis consuetudinibus, ex cibis, ac potibus, & gymnasijs, inspectionibus, auditionibus, & à mala musica.

XIII.

Multi multis annis egrotantes, propter malam animi consuetudinem, contraria motuum ipsius animæ immoderatione curantur.

XIII.

Diligentia multa studendum est, ne vltimum animi immoderatum motum, ad tertium annum vsq; cum corpore paruuli patiantur, ea propter nutrice oportet esse prudentem, & cōsuetudinis pueri expertam.

XV.

Necesse est calere corpus quod adolefcit, & ad vires & incrementum tendit vice uersa, illud supra modum frigere, cum cæperit aboleri, & tanquàm maturum atq; caducum in ruinam præceps festinare.

XVI.

XVI.

Vinum & Cereuisia inimica sunt pueris: nam eorum capita malo vapore replent, & calefaciendo mentem eorum perturbant.

XVII.

Infantium dolores tribus modis leuantur, nutricis papilla ori eorum apposita, motuq; mediocri, & vocis modulamine.

XVIII.

Quibus infantibus aluus siccata est, hanc, quantum est cicer vnum terebinthinae, aut mellis vncia soluit.

XIX.

Rubrus corallus infantium lactentium collo appensus ad os vsq; ventriculi deueniens, lactis vomitum prohibet, roboratq; horum coctionem.

FINIS.

MORBORVM

I V X T A S E R I E M T O -

tius corporis competentem,

Nomenclatura, &

quasi in capita

sectio.

- 1 Primus est Syriasis, quem Latini capitis
ardores vocant. 11
- 2 Secundus, Phlegmon cerebri. 20
- 3 Tertius, Hydrocephalon, hoc est, aqua ex-
tra cranium Auicennæ: apostema ve-
rò intercutaneum Haliabati. 27
- 4 Quartus, Emphysema Paulo: inflatio ca-
pitis Auicennæ. 43
- 5 Quintus, Capitis magnitudo immodica.
48
- 6 Sextus, Capitis Vlcera, quæ Plinius manā
tia, Græci Achores, & Ceria, Auicēna
saphatum, nostri Tineam vocant. 51
- 7 Septimus, quem Razes Fauum: Græci κη-
γιον adpellant 64
- Octa

MORB. NOMENCLAT. 33

- Octauus, Vigilia* 438
- Nonus, Somnia terrifica, Paiores Hippo- 9*
crati, & Galeno. 73
- Decimus, Epilepsia Græcis: morbus comi- 10*
cialis Latinis, mater puerorum vulgo,
regius ac diuinus Aristoteli. 78
- Undecimus, Resolutio neruorū: apud Græ- 11*
cos παρὰ λυσις dicitur. 92
- Duodecimus, Conuulsio, quam Græci σπασ- 12*
μὸν vocant. 94
- Decimus tertius, Rigor iuxta Celsum, quē 13*
Græci τῆτανος, nostri communi & vna
tantum voce Tetanum: Auic. Cuḏem,
Vel Aluḏem nominat 111
- Decimus quartus, Conuulsio, & Tetanus 14*
ex inanitione. 114
- Decimus quintus, Glaucedo oculi, quam 15*
Græci γλαυκῶμα: & Hypochimata,
hoc est, oculorum suffusiones vocant.
115
- Decimus sextus, Emphysema oculi: quod 16*
Auic. inflationem oculi appellat. 120

De

334 MORB. NOMENCLAT.

- 17 Decimusseptimus, Strabisinus, hoc est aspe-
ctus obliquus: penes Auicennam stra-
bositas. 124
- 18 Decimusoctauus, Lacrymæ, oculi lacry-
mosi & lacrymantes Plinio. 128
- 19 Decimusnonus, Ptilosis: Auicennæ Si-
lac: Haliabati Palpebrarum casus.
130
- 20 Vicesimus, Psorophthalmia iuxta Paulum,
quam Auicenn. scabiem & pruritem,
Haliabas pruriginem vocat. 133
- 21 Vicesimusprimus, Aurium dolor. 139
- 22 Vicesimusecundus, Aurium humidita-
tes, interdum sanguinis instar, aut pu-
ris adparentes: nonnunquam Vermiculi
ex auribus exeuntes, vnde aures ver-
minosæ appellantur. 145
- 23 Vicesimustertius, aurium purulētia, quam
Razes venenum adpellat. 151
- 24 Vicesimusquartus, Sternutamentum,
152

Vi

MORB. NOMENCLAT. 335

Vicesimus quintus, Rima, vel Scissa, vel 25
Fissa, vel Scissura labiorum, quas Græ-
ci ῥαγάδας, Avicenna fissuras nomi-
nat. 161

Vicesimus sextus, Dentitio, siue dentium 26
productio. 165

Vicesimus septimus, Gingivarum, maxil- 27
larum, tendinumq; phlegmones, Paulus
parulides vocat. 169

Vicesimus octauus, et Vicesimus nonus, Gin 28. 29
giuarum pruritus, qui ὀδίαξις μὲν à Dio-
scoride dicitur: & gingivarum caro su-
perflua ἐπερλὶς à Paulo vocata: à Raze au-
tem Vesica. 173

Tricesimus, Aphtha Græcis: Alcola Aui 30
cenna: Calaba Haliabati: oris Vlcus Pli-
nio. 177

Tricesimus primus, Ranula in lingua, 31
quam Græci βάρραρον vocant: atque de
linguæ resolutione, & gravitate, puero-
rumq; balbutie. 186

Tri

36 MORB. NOMENCLAT.

32 Trigesimusseccundus, Cancrī in ore puero-
rum, qui à Græcis Καρκίνος, & καρκι-
νώματα dicuntur. 189

33 Trigesimustertius, Angina, cuius genera
Græci ponunt quatuor, ut Συναγχή, Πα-
ρασυναγχή. Eadem & tonsillæ à non-
nullis vocatur, quam Barbari Squinan-
ciam hætenus vocitauere. 194

34 Trigesimusquartus, Tussis & Coryza.
202.

35 Trigesimusquintus, Dyspnœa, Asthma
id est, Anhelatio, quod Avicen. Oreg-
mon vocare videtur: Orthopnœa.

211

36 Trigesimussextus, Stomachus fractus, siue
imbecillus. 215

37 Trigesimusseptimus, Vomitus. 217

38 Trigesimusoctavus, Singultus. 226

39 Trigesimusnonus, Ventris tormina, &
inflationes. 235

40 Quadragesimus, Aluus humida, siue ven-
tris perturbatio, aut alui fluor. 237

Qua.

MORB. NOMENCLAT. 37

Quadragesimus primus, Alius sicca, du- 41
ra, astricta 250

Quadragesimus secundus, Lumbrici, Ta- 42
nia, Ascarides 254

Quadragesimus tertius, Umbilici, inflam 43
matio, vel eius augmentum Avicēna,
ἐχόμφαλος, apud Græcos dictū, Umbi-
licus prominens, Celso prociduus, Pli-
nio quid sit 267

Quadragesimus quartus, Διθιάσις calcu- 44
lus 271

Quadragesimus quintus, De meientibus 45
intrò ex Paulo 276

Quadragesimus sextus, Inguinis ramex, 46
quem Græci βεβωνοκὴλην: Item intesti-
norum ramex, quem ἐντεροκὴλην vo-
cant 277

Quadragesimus septimus, Anus proci- 47
dens 283

Quadragesimus octavus, Tenesmus, siue 48
tentio 287

Quadragesimus nonus, Intertrigines fe- 49
r

morum, quas Græci παραιμια, Latini nunc attrita, nunc confricata membra appellat. Excoriatio in coxa Avicenna 291

50 Quinquagesimas, Exanthemata, id est, pustularum eruptiones, quæ Variola, & Morbilli ab Avic. dicuntur: à Raze exanthemata & eulogium: Algidra verò & Alhasba ab Alsaharavio: à Plinio papule, & pituitæ eruptiones 295

51 Quinquagesimus primus, Lactumen, Crusta, Lacticium. 317

52 Quinquagesimus secundus, Febris 320

53 Quinquagesimus tertius, εὐφύσκη Paul. inflatio Avicenna 323

54 Quinquagesimus quartus, Macilentia 325

Aphorismorum

Finis.

INDEX CO-

PIOSVS EORVM

*qua in hisce commenta-
rijs habentur.*

A

A rdores capitis	12
Apostema sitibundum	eodem
Aqua extra craneum	27
Apostema intercutaneum	17
Achores	51
Alopecia	60
Atriplex	32
Aetas puerilis morbo comiciali obno- xia	76
Auxilium lene pro pueris paralyticis	94
Algores	97
Aspinitudo	135
AlcuZen	110
Aegilops oculi	138
Aurium dolor	139
Aurium humiditates	145

T 2

INDEX.

<i>Aures verminosa</i>	140. & 146
<i>Auricularia specilla</i>	147
<i>Aurifusoria</i>	148
<i>Absynthij succus cum melle</i>	150
<i>Aurium purulentia</i>	151
<i>Auralis</i>	174
<i>Abulis</i>	ibidem
<i>Aphthæ</i>	177
<i>Alcola</i>	ibidem
<i>Aphthæ caliditatis igneæ nonnihil in se habent</i>	181
<i>Aphthæ non tantum oris, sed etiam alijs corporis partibus attribuuntur</i>	eodem
<i>Aqua mulsa</i>	185
<i>Anginæ inflammationes sunt</i>	194
<i>Angina</i>	195
<i>Anginæ genera ex Paulo</i>	ibidem
<i>Anginam Græci ἀγγίλη, Latini ab angendo appellant</i>	196
<i>Anhelatio</i>	211
<i>Æsthma</i>	ibidem
<i>Anheli</i>	212
	<i>Aqua</i>

INDEX.

<i>Aqua calida vires</i>	235
<i>Aqua conseruata intra caluariam nota</i>	32
<i>Aloë</i>	236
<i>Aluus hmida</i>	237
<i>Alui fluor</i>	ibidem
<i>Aluus sicca, dura, astricta</i>	250
<i>Ascarides</i>	254
<i>Ascarides in occasu, Hippocr.</i>	255
<i>Ascaridibus abundantes breuioris sunt vitæ</i>	256. & seq.
<i>Ammi</i>	279
<i>Ameos</i>	ibidem
<i>Ami</i>	ibidem
<i>Anus procidens</i>	283
<i>ApoZema</i>	285
<i>Aspergines</i>	290
<i>Attrita</i>	291
<i>Algidra</i>	296
<i>Alhasba</i>	ibidem
<i>Albedo oculorum</i>	315
<i>Albugo oculorum</i>	ibidem

INDEX.

Anhelationes 316

B

Batrachus 186
Balbuties puerorum ibidem

Butyrum 168

Branchus 203

C

Collectiones 13
Cucumis 18

Caluariae membranae duae 21

Caustica medicamenta 42

Caustica sensim adhibenda ibidem

Capitis magnitudo immodica 48

Capitis Ulcera 50

Ceria 51

Capitis Ulcera manantia ibidem

Capitis impetigo 52

Cerioni 64

Causa procatartica 57

Cutis color humorem indicat redundantem

INDEX.

tem	59
Conuulsio ex siccitate cum desipientia	70
Comicialis morbus vnde dictus	79
Cochlearis capacitas	85
Cichorij facultas	88
Cardamomum pueris Epilepticis profi- cium	91
Conuulsio	94
Conuulsionis descriptio Arabica	95
Conuulsionis diuisio	ibidem
Conuulsionibus pueri sunt obnoxij	ibidem
Conuulsionis genera tria	96
Conuulsio ex repletione, & inanitione	98
Conuulsio à contrarijs fit causis	99
Caro addita	174
Caro salsa	175
Calaba	177
Corporibus fortioribus medicamenta for- tiora esse administranda	182
Cancris in ore puerorum	189
Cancris pueros affici in dubio est apud au-	

I N D E X.

tores	190
Cancer vnde sic dicatur pag.	191
Cancri, & carcinomatū differentia	19
Carcinomata latentia	ibidem
Carcinoma quid sit	ibidem
Cancri exulcerati, & nondum exulcerati differentia	ibidem
Crystallus	193
Cornu ceruinum	ibidem
Cynanche	196
Cynanche pusiones frequenter corripuntur	197
Coryza	202
Catarrhus	202
Cyminum	215
Cotoneorum succus	206
Cinamomi in vomitione vsus	225
Cholera	238
Cholirica passio	ibidem
Concoctionis deprauatio, & nervosi generis imbecillitas, duæ potissimum causæ convolutionis ex repletione evenietis	99
Con	

INDEX.

Conuulsio pueris promptissimè accidit	100
Conuulsionibus pueri facilius adultiori- bus liberantur	101
Conuulsionis à repletione indicia	102
Conuulsioni febrem superuenire melius quàm econtra fieri	ibidem
Conuulsionis diuisio ad materiam propor- tionata, siue non proportionata	104
Conuulsionis à plenitudine curatio	105
Conuulsionis in vniuerso corpore cura- tio	108
CuZen	110
Conuulsio ex inanitione	114
Colorum oculos euariatiuè causa ex hu- moribus dependent	117
Chamomillæ vires	138
Colocynthis	144
Croci genera	145
Croci vires	148
Circa ocymi in sternutatione administra- tionem, inter Auicennam, & Diosco- ridem controuersia, & disceptatio	158

INDEX.

<i>Cerebrum leporinum</i>	168
<i>Coagulum lac in ventre coagulatum dis-</i> <i>solvit</i>	246
<i>Conyza</i>	249
<i>Cyclaminis radix</i>	253
<i>Calculus</i>	271
<i>Calculus puerorum passio propria ibidem</i>	
<i>Cicatrices oculorum</i>	315
<i>Crusta</i>	317
D	
D <i>Vricies</i>	20
<i>Dactyli</i>	61
<i>Dormire, & Vigilare penes Aristote.</i> <i>quid sit</i>	68
<i>Divisiones</i>	162
<i>Dentitio cita</i>	166
<i>Dentitio</i>	ibidem
<i>Dentitionis symptomata</i>	ibidem
<i>Dentitio tarda, vernalis, hyemalis, æsti-</i> <i>ua</i>	ibidem
<i>Dolori intolerabili ex dentitione</i>	168
<i>Dia moron</i>	200
	<i>Dysp</i>

INDEX.

<i>Dyspnœa</i>	198. & 211
<i>Dyatraganthen frigidum</i>	211
<i>Diarrhœa</i>	237 168
<i>Dysenteria</i>	239
<i>Desudationes</i>	300

E

E <i>Rysipelas</i>	13.20. & 25
<i>Exinanitio quot fiat modis</i>	36
<i>Experimētum à ratione naturali inuen-</i> <i>tum</i>	40
<i>Emphysema</i>	44
<i>Epilepsia</i>	81
<i>Epilepsiam non facile incurrunt puberta-</i> <i>tem egressi, facillimè verò pueri</i>	82
<i>Electuarium Galeni puero spasmo labo-</i> <i>ranti concinnatum</i>	93
<i>Emprostothonos</i>	111
<i>Emplastrum Auic. ad membra conuulsa</i> <i>puerorum</i>	107
<i>Emplastrum</i>	108
<i>Emphysema palpebrarum affectus</i>	121
<i>Elxine</i>	138
<i>Epulis</i>	170

INDEX.

<i>Embrocha descriptio</i>	172
<i>Eclegmata</i>	207. 211
<i>ἰχθυόμαλα</i>	267
<i>Enterocoele</i>	278
<i>Excoriatio in coxa</i>	292
<i>Exanthemata</i>	296
<i>Eulogium</i>	<i>ibidem</i>
<i>Ecthymata magna</i>	297
<i>Exanthematum nomen patet latius</i>	51
<i>Effere</i>	300
<i>Epinyctides</i>	<i>ibidem</i>
<i>Erosio intestinorum</i>	317
<i>Excrementiarum curatio</i>	176
<i>Epylepticus morbus diuturnus</i>	80
<i>Eminentia</i>	52

F

F <i>Latus duplex, curandi duplicem mo- dum administrat</i>	48
<i>Ficus</i>	51
<i>Fauus</i>	64
<i>Fauis & meliceridis differentia</i>	66
<i>Frigora</i>	97
	<i>Fle</i>

INDEX.

<i>Fletus puerorum moderatus & interpo-</i>	
<i>latus, ante esum effusus cōducibilis</i>	129
<i>Ficatio</i>	135
<i>Fissa</i>	161
<i>Fluorum alui modi diuersi</i>	238
<i>Fel vaccinum, & reliqua omnia</i>	252
<i>Fascia</i>	257
<i>Febris insequens vermes semper ma-</i>	
<i>lum</i>	264
<i>Frigiditas resolutionis vim habet</i>	276
<i>Febris</i>	320

G

G <i>Urturis suffocatio, exulceratio</i>	315
<i>Glaucomata</i>	115
<i>Glaucedo viriditas oculi penes Auic.</i>	116
<i>Glaucedo oculorum est debiliū</i>	117
<i>Glaucedo ex sola siccitate iuxta quosdam</i>	
<i>ibidem</i>	
<i>Glaucedo duobus contingit modis</i>	118
<i>Glaucedinis differentia duplex</i>	119
<i>Glancy succus</i>	122
	Gin

INDEX.

<i>Gingivarum phlegmones</i>	169
<i>Gingivarum pruritus</i>	174
<i>Gingivarum caro superflua</i>	176
<i>Glycirrhizæ succus</i>	183
<i>Gallia muscata</i>	216
<i>Gariophilorum in vomitione vsus</i>	223
<i>Gulielmus Placentinus Medicus insignis</i>	249
<i>Gargarisma</i>	316
<i>H</i>	
<i>H Eliotropium</i>	18
<i>H Hydrocephalos</i>	27
<i>Hippocr. dictum aureum</i>	36
<i>Horrores</i>	97
<i>Hypochymata</i>	115
<i>Hypochyma, & Glaucoma quomodo differant</i>	116
<i>Homo ad lacrymas natus</i>	128
<i>Historia ex Ruffo mirabilis</i>	149
<i>Historia experta</i>	266
<i>Herba lumbricorum</i>	267
<i>Hordeacea farina</i>	294
<i>Her</i>	

INDEX.

<i>Herpetes multi, magni</i>	298
<i>Hydroa</i>	300
<i>Hirundinum sylvestrium cinis</i>	201

I

I <i>Nflammationes</i>	13
<i>Ignis sacer</i>	20
<i>Infantis in utero materno positura</i>	29
<i>Incisionum modi varij, & diuersi</i>	39
<i>Inflatio capitis puerorum</i>	43
<i>Imaginationes terribiles in somno</i>	74
<i>Insomnium</i>	75
<i>Inflatio oculi</i>	120
<i>Isthmus</i>	197
<i>Intestinorum leuor, lenitas</i>	238
<i>Intestinorum difficultas</i>	239
<i>Iridis radícula</i>	251. & 293
<i>Intertrigines femorum</i>	292
<i>Intestinorum erosio</i>	317
<i>Inflammatiō</i>	292
<i>Infectio cutis arenosa</i>	133
<i>Inguinis ramex</i>	277
<i>Infantium temperamentum</i>	190

K

INDEX.

Κ

Καρχίνοι	189
Καρχινώματα	<i>ibidem</i>
Κρυπτόν	193

L

Lapis smaragdus	86
Lapis in nidis hirundinum reper-	
tus	87
Lactis proba	180
Lac Asininum	110
Lycium	123
Lacryma	128
Lacrymae voluntariae in pueris, inuolun-	
tariae in senibus	130
Lini semen	143
Lens	144
Lac caninum	168
Lactuca succus	183
Linguae resolutio, & gravitas	187
Linctus	214
Lac bifariam alteratur	134
Lapathum	147
Lappa	

INDEX.

<i>Lappatium</i>	<i>ibidem</i>
<i>Lumbrici</i>	154
<i>Lumbricorum differentia.</i>	<i>ibidem</i>
<i>Lumbricorum in febribus ortorum ratio- nes ex Paulo</i>	263
<i>Λιθιασ</i>	271
<i>Lupinus amarus</i>	208
<i>Leucoma oculorum</i>	315
<i>Lactumen</i>	317
<i>Lacticium</i>	<i>ibid.</i>
<i>Lienteria</i>	238

M

M <i>Orborum causa quatuor, à causa ex- trinseca euenientium</i>	22
<i>Mater dura</i>	28
<i>Manardus medicus insignis</i>	44
<i>Medicamina flatu dissipantia</i>	45
<i>Macula rubea</i>	52
<i>Morbus comitialis</i>	79
<i>Mater puerorum</i>	80
<i>Morbus regius, diuinus</i>	79

Z

INDEX.

<i>Motionis impedimentum, vel defectus in pueris</i>	94
<i>Mellis vsus contra incertos aurium sono- res & dolores</i>	144
<i>Myrrha</i>	ibid.
<i>Mellis vires</i>	148.171
<i>Morituri minimè sternutant</i>	157
<i>Maxillarum phlegmones</i>	169
<i>Mori arboris pomorum immaturorum suc- cus</i>	184
<i>Μελίχρατον</i>	185
<i>Mali punici cortex</i>	194
<i>Malum arteriacum</i>	203
<i>Myxaria</i>	265
<i>Medicamen RaZis in vomitione exper- tum</i>	222
<i>Mollificatio testium</i>	278
<i>Morbilli</i>	296
<i>Membra confricata</i>	291
<i>Mel</i>	251
<i>Meliceris</i>	65
<i>Muscus</i>	217
	Ma

INDEX.

Macilentia

325

N

N Erui optici	15
Notarum differentia inter calidos & frigidos humores	24
Nervorum resolutio	92
Noma	182
Nausea	217
Nux indica condita	232
Nux	246
Nitri vis	312
Nebula oculorum	315
Narium vlcera	316
Nausea, vomitionisq; differentia	217

O

O Edema	20
Odoramentum	39
Ophiasis	60
Oleum sesaminum	85
Opisthotonos	98. & 111
Oleum irinum	106. 21
Oleum chamamelinum, cyprinum keiri-	

Z 2

INDEX.

num, liliorum alborum	107
Olea nervis convulsis conferentia	106
Olea diaphoretica	107
Oleum sicyonium	113
Oculi glauco	115
Oculorum suffusiones	ibid.
Oculi puerorum in primo ortu increfcere iuxta Albertum	116
Oculi senum, & decumbentium quare glaucofcant	119
Oculi lacrymofi, & lacrymantes	128
Origanus	143
Oleum de cannabe fatina	149
Ossa ethmoidea	153
Oleum de falicibus	160
Ὀδὸν ῥοσ	173
Ὀδὸν ῥοσ	ibidem
Oris vlcus	179
Orthopnea	198
Oregmon quid fit, & in quibus morbis eueniat	214
Orbiculi	222
Oleum	

INDEX.

Oleum peruetus ex oleis maturis 235

Oxylapathum 247

Oua dura Græcè Ephtha dicta 249

P

P^Hlegmones 20

P^hlogosis 18

Phrenitidis signa 16

Pepo 18

Psydracia 51

Pustula rubea 52

Phthiria 58

Psilothrum 64

Papauera 72

Pauores 73

Παιδίων νόσος 80

Puerorum morbus ibid.

Pulmentum pro pueris Epilepticis 85

Palpebrarum clausura 121

Ptilosis 130

Palpebrarum casus ibid.

Psorophthalmia cum suis speciebus 133

Pruritus ibidem

INDEX.

<i>Prurigo</i>	<i>ibidem</i>
<i>Psoriasis palpebrarum pruriginosa</i>	134
<i>Palpebra ficosa, & aspera</i>	135
<i>Paritaria</i>	138
<i>Parotides aurium</i>	143
<i>Papaveris succus, opium</i>	150
<i>Parulis</i>	170
<i>Παρυλίδες</i>	<i>ibid. &</i> 173
<i>Pruritus curatio</i>	174
<i>Portulacæ succus</i>	183
<i>Perfrictiones linguæ</i>	189
<i>Parasynanche</i>	194
<i>Parachynanche</i>	195
<i>Pastilli</i>	222
<i>Potentia retentrix, etiam amplexatrix à Galeno dicitur</i>	227
<i>Pruritus</i>	240
<i>Prurigo</i>	<i>ibid.</i>
<i>Pulicaria</i>	249
<i>Παράρρηματα</i>	291
<i>Pustularum eruptiones</i>	298
<i>Papule</i>	295
	<i>Pi</i>

INDEX.

Pituitæ eruptiones *ibid.*

Pustularum, siue Variolarum differentia

299. & 302.

Planta noctis *ibidem*

Pustularum excretionem promouentia

311

Pustulæ exulceratæ *ibid.*

Pannus oculorum 315

R

R *Epulsio materiæ pectoralis interdi-*
cta 26

Resolutio cum quibus fiat medijs 37

Radix Glycyssidis, id est, pæonia 87

Rigor 97

Rigores *ibid.*

Rigor latinè dictus *ibid.*

Rigor in pectus 98

Rigor in scapulas *ibid.*

Resinæ fuligines 138

Rima 161

Rhagades *ibid.*

Rhagades à frangendo Græcis 162

Z 4

INDEX.

<i>Resina</i>	282
<i>Ranula</i>	186
<i>Ructus acidi</i>	242
<i>Rotundorum multò plures quàm Ascaridum in pueris gignuntur</i>	255
<i>Rhacosis</i>	278
<i>Rhus, hoc est, sumac</i>	221
S	
<i>Solaris</i>	18
<i>Solanum</i>	ibidem
<i>Solatrium</i>	18
<i>Scirrhus</i>	20
<i>Sephiros</i>	ibidem
<i>Simile suo simili appositū furiosius ipsum reddit</i>	24
<i>Saphatum</i>	53
<i>Scabies sicca</i>	ibidem
<i>Somnus & Vigilia, modum excedentia malum</i>	69
<i>Somnia terrifica</i>	74
<i>Somnus</i>	75
<i>Somni cum Epilepsia communitas</i>	78
	Stran

INDEX.

<i>Strangulatio spiritus est occlusio</i>	79
<i>Syrupus de cichoreo</i>	88
<i>Strabismus</i>	124
<i>Strabositas</i>	<i>ibidem</i>
<i>Silac</i>	130
<i>Syrosis</i>	135
<i>Suppurationis argumenta plausibilia</i>	141
<i>Sal</i>	143
<i>Saccharum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Sacchar</i>	144
<i>Sanies aurium</i>	149
<i>Stupefacientibus quādo sit Utendum</i>	150
<i>Sternutamentū nobile, & expertum</i>	157
<i>Sternutamentum</i>	152
<i>Sternutamenta validiorem habēt quā tussis spiritus impetum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Sternutamēti ex duplici perforatione ra- tiones</i>	155
<i>Sternutamenta ex cerebri apostemate euenientia ipsum distendunt, insti- mulant q̄</i>	158
<i>Sternutatio quæ noceat, aut profit</i>	159

Z S

INDEX.

Scissa	161
Scissuræ labiorum	ibidem
Scissiones	162
Scissuræ ex mammillarum nutricis duri- cie, vel calore	165
Salsamentum vetus	175
Succidia	ibidem
Squinantia	194
Synanche	195
Sorbitiones	207
Suspiriosi	62
Stomachus fractus, vel imbecillus	215
Singultus	226
Singultus est conuulsio, scilicet non perfe- cta	ibidem
Santonici semen	267
Stranguria	274
Scopuli	298
Saire	300
Sudamina	ibidem
Salitio apud Auicennam quid sit	310
Sanguinem inflammãtia	313
Suspi	

INDEX.

Suspiria

317

T

T <i>Vmorum omnium origo</i>	20
<i>Tumor mollis in capite</i>	28
<i>Tinea</i>	51
<i>Tetanos</i>	111
<i>Tumor pruriginosus</i>	134
<i>Trachoma</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tylosis</i>	135
<i>Tussis</i>	204. 208
<i>Tonsillæ</i>	196
<i>Trochisci</i>	222
<i>Tenesmus</i>	239
<i>Terebinthinæ resina</i>	252
<i>Tania</i>	257
<i>Tinea ventris</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tinearum interpretatio apud Marcel-</i>	
<i>lum</i>	<i>ibidem</i>
<i>Tentio</i>	287
<i>Tactus qualitarum attingēdarum index</i>	
	<i>in</i>

INDEX.

<i>infallibilis</i>	24
<i>Tendinum phlegmones</i>	169
<i>Tarichia</i>	175

V

V <i>Lcera manantia</i>	50
<i>Vnguētum RaZis contra tineā</i>	64
<i>Vigilia</i>	68
<i>Vigiliarum ex passionibus origo ibidem</i>	
<i>Vigiliarum incommoda</i>	69
<i>Vigiliae ex euacuantibus exiccantibus fiunt</i>	70
<i>Vigilystus superueniens, mala ibidem</i>	
<i>Viscum quercinum</i>	87
<i>Victus deprauatus passionem generat</i>	89
<i>Victus puerorum Epilepticorum</i>	90
<i>Viriū in corpore humano genere tres</i>	101
<i>Vermiculi ex auribus</i>	145
<i>Vesica in ore puerorum RaZis</i>	174
<i>Vesicarum in gingiuarum partibus parū acutarum curatio</i>	177
	Vi

INDEX.

<i>Viola sicca trita</i>	182
<i>Vua acerba succus</i>	184
<i>Vomitus</i>	217
<i>Vomitio syncerior, deterior</i>	218
<i>Vomitio porracea, humida, nigra, pernicio- tiosa</i>	<i>ibidem</i>
<i>Vomitionis continua incommoda</i>	219
<i>Vomitio sanguinolenta</i>	220
<i>Ventris tormina, & inflationes</i>	233
<i>Ventris inflatio cum capitis magnitudi- ne</i>	236
<i>Ventris perturbati fluxus</i>	237
<i>Vomitio</i>	238
<i>Ventris animalia</i>	257
<i>Vermium genus infantibus magis, quàm alijs atatibus familiare</i>	263
<i>Umbilici inflāmatio, vel augmentū</i>	267
<i>Umbilicus prominens, prociduus</i>	268
<i>Umbilici tumor</i>	269
<i>Urina introrsum reddita</i>	276
<i>Variola</i>	296
<i>Variolarū, & morbillorū materia</i>	298
	<i>Ulcus</i>

INDEX.

<i>Ulcusculorum differentia</i>	300
<i>Variolarum descriptio iuxta Neoteri-</i>	
<i>cos</i>	305
<i>Variolarum, morbillorumq^{ue} symptoma-</i>	
<i>ta</i>	306

Z

Z <i>opissa</i>	282
------------------------	-----

FINIS.

LVGDVNI,
Excudebant Philibertus Roi
letius, & Bartholomæus
Frænius.





